15. Landschaftsversammlung 2020-2025

LVR
Qualität für Menschen

An die Mitglieder
des Gesundheitsausschusses

Köln, 26.08.2022
Frau Groeters
Fachbereich 81

Gesundheitsausschuss

Freitag, 09.09.2022, 9:30 Uhr

Köln, Horion-Haus, Rhein/Ruhr/Erft

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur **8.** Sitzung lade ich herzlich ein.

Während der Sitzung sind Sie telefonisch zu erreichen unter Tel. Nr.: 0221/809-6011.

Hinweise zum Infektionsschutz zu COVID-19: siehe Anlage

Falls es Ihnen nicht möglich ist, an der Sitzung teilzunehmen, bitte ich, dies umgehend der zuständigen Fraktions-/Gruppengeschäftsstelle mitzuteilen, damit eine Vertretung rechtzeitig benachrichtigt werden kann.

T a g e s o r d n u n g

A: Gesundheitsausschuss

Öffentliche Sitzung		**Beratungsgrundlage**
1.	Anerkennung der Tagesordnung	
2.	Niederschrift über die 7. Sitzung vom 13.05.2022	
3.	Aufnahme des Regelbetriebs des LVR-Beratungskompasses zur dauerhaften Unterstützung Integrierter Beratung Berichterstattung: LVR-Dezernent Janich	**15/988** K **PowerPoint-Präsentation**
4.	Gesamtvorlage der aktualisierten Versorgungskonzepte der gerontopsychiatrischen Abteilungen der LVR-Kliniken Berichterstattung: LVR-Dezernentin Wenzel-Jankowski	**15/1089** K

Beratungsarten: B = Beschluss, E = empfehlender Beschluss, K = Kenntnis

5.	Fachliche Weiterentwicklung, Ausbau und Umsetzung der Versorgungsangebote im Bereich der Psychosomatischen Medizin und Psychotherapie im LVR-Klinikverbund: das Zentrum für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie Viersen-Mönchengladbach Berichterstattung: LVR-Dezernentin Wenzel-Jankowski	**15/1130** K
6.	LVR-Förderprogramm „Unterstützung der Kommunen und Kreise im Rheinland beim Ausbau der Angebots- und Koordinationsstrukturen für Kinder und Jugendliche mit psychisch und/oder suchterkrankten Eltern": Stand der Umsetzung Berichterstattung: ELR Limbach	**15/894** K
7.	Hilfen für vom Hochwasser 2021 betroffene Menschen in den OEG-Traumaambulanzen Berichterstattung: LVR-Dezernentin Prof. Dr. Faber	**15/1118/1** K folgt
8.	Befristete Beschäftigungsverhältnisse 2021 Berichterstattung: ELR Limbach	**15/984** K
9.	Maßregelvollzug	
9.1.	Bericht zum Ausbau forensischer Neubauten in der LVR-Klinik Bedburg-Hau (Campus II) Berichterstattung: LVR-Dezernentin Wenzel-Jankowski	**15/1060** K
9.2.	Erweiterung des forensischen Fachbereiches um eine Abteilung Forensik III Berichterstattung: LVR-Dezernentin Wenzel-Jankowski	**15/1166** K
9.3.	Belegungssituation im Maßregelvollzug Berichterstattung: LVR-Dezernentin Wenzel-Jankowski	
10.	Anträge und Anfragen	
10.1.	Beantwortung der Anfrage 15/31 Die Linke.: Modellprojekt Bio-Lebensmittel in LVR-Kliniken	
10.2.	Beantwortung der Anfrage 15/30 GRÜNE: Ansprechpartner*innen für Gleichstellung in den Kliniken	
10.3.	Stärkung Sorgearbeit	**Anfrage 15/33 AfD** K
10.4.	Beantwortung der Anfrage 15/33 AfD	
10.5.	Optimierung des Berufsbildes in der „Gesundheits- und Krankenpflege"	**Anfrage 15/34 AfD** K
10.6.	Beantwortung der Anfrage 15/34 AfD	
11.	Beschlusskontrolle	
12.	Bericht aus der Verwaltung	
13.	Verschiedenes	

Beratungsarten: B = Beschluss, E = empfehlender Beschluss, K = Kenntnis

B: Gesundheitsausschuss

Nichtöffentliche Sitzung

14.	Niederschrift über die 7. Sitzung vom 13.05.2022	
15.	Personalmaßnahmen	
15.1.	Bestellung zum Ärztlichen Direktor im Klinikvorstand des LVR-Klinikums Essen - Kliniken und Institut der Universität Duisburg-Essen - Berichterstattung: LVR-Dezernentin Wenzel-Jankowski	**15/1202** B
15.2.	Wiederbestellung zur Ärztlichen Direktorin im Klinikvorstand der LVR-Klinik Düren Berichterstattung: LVR-Dezernentin Wenzel-Jankowski	**15/1035** B
15.3.	Wiederbestellung zum Stellvertreter der Pflegedirektion im Klinikvorstand der LVR-Klinik Mönchengladbach Berichterstattung: LVR-Dezernentin Wenzel-Jankowski	**15/1115** B
16.	Einzelfortschreibung der Zielplanung der LVR-Klinik Bonn für das Kinderneurologische Zentrum - Neubau des Sozialpädiatrischen Zentrums Berichterstattung: LVR-Dezernentin Wenzel-Jankowski	**15/1075** B
17.	Zustimmung zu der Änderung des Gesellschaftervertrages der "Gesellschaft für Digitale Gesundheit mbH" zur Aufnahme weiterer Gesellschafter Berichterstattung: LVR-Dezernentin Wenzel-Jankowski	**15/1120** E
18.	Vergabe von Pool-Rahmenverträge über Ad-hoc-Bewachungsleistungen für mehrere LVR-Kliniken Berichterstattung: LVR-Dezernentin Wenzel-Jankowski	**15/1141** B
19.	Investitionsprogramm 2022 für Krankenhäuser des Landes Nordrhein-Westfalen Berichterstattung: LVR-Dezernentin Wenzel-Jankowski	**15/1146** K
20.	Aktueller Bericht aus dem Maßregelvollzug Berichterstattung: LVR-Dezernentin Wenzel-Jankowski	
21.	Anträge und Anfragen	
22.	Beschlusskontrolle	
23.	Bericht aus der Verwaltung	
24.	Verschiedenes	

C: Ausschuss für das LVR-Institut für Forschung und Bildung

Nichtöffentliche Sitzung

25.	Personalmaßnahme: Einstellung einer Beschäftigten bzw. eines Beschäftigten und Bestellung zur Fachlichen Direktion der Sparte Bildung im LVR-Institut für Forschung und Bildung hier: Dringlichkeitsentscheidung Berichterstattung: LVR-Dezernentin Wenzel-Jankowski	**15/1094** K
26.	Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2021 des LVR-Institut für Forschung und Bildung Berichterstattung: Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WRG Audit GmbH	**15/1018** K **PowerPoint-Präsentation**
27.	Lagebericht 2021 des LVR-Institut für Forschung und Bildung Berichterstattung: Vorsitzender des Vorstands LVR-IFuB Thewes	**15/1019** K
28.	II. Quartalsbericht 2022 des Instituts für Forschung und Bildung Berichterstattung: Vorsitzender des Vorstands LVR-IFuB Thewes	**15/1017** K
29.	Verschiedenes	

D: Ausschuss für das LVR-Institut für Forschung und Bildung

Öffentliche Sitzung

30.	Jahresabschluss 2021 des LVR-Institut für Forschung und Bildung Berichterstattung: Vorsitzender des Vorstands LVR-IFuB Thewes	**15/1021** B
31.	Tätigkeitsbericht des LVR-Instituts für Forschung und Bildung - LVR-Institut für Versorgungsforschung - vom 01.01.2021 - 31.12.2021 Berichterstattung: Vorsitzender des Vorstands LVR-IFuB Thewes	**15/1010** K **PowerPoint-Präsentation**
32.	Verschiedenes	

Mit freundlichen Grüßen
Die Vorsitzende

S c h ä f e r

Hinweise zum Infektionsschutz (Stand 20.04.2022 für Sitzungen ab 01.05.2022)

1. Durchführung der Sitzung

Die Sitzung findet als Präsenzveranstaltung statt. Es wird empfohlen, bei Betreten des Gebäudes und des Sitzungsraumes sowie am Sitzplatz eine medizinische Maske oder eine Maske höheren Standards (FFP2) zu tragen und diese nur zum Sprechen und/oder Trinken abzunehmen.

In Ausübung des Hausrechts kann die Sitzungsleitung in der Sitzung, unter Abwägung der aktuellen Gesamtumstände, das Tragen einer medizinischen Maske oder einer Maske höheren Standards anordnen. Bitte leisten Sie den Aufforderungen der Sitzungsleitung Folge.

Durch die Verwaltung werden weitere Hygienemaßnahmen getroffen.

2. Gründe für eine Nichtteilnahme

Bitte begeben Sie sich insbesondere nicht zur Sitzung, wenn

- Sie Symptome einer Erkältungskrankheit aufweisen
- Sie zur Quarantäne bzw. Isolierung verpflichtet sind.

Sollten im Einzelfall Unsicherheiten bestehen, ob eine Teilnahme an der Sitzung möglich ist, steht die LVR-Stabsstelle Sitzungsmanagement unter LVR-Sitzungsmanagement@lvr.de für Fragen zur Verfügung.

TOP 1 Anerkennung der Tagesordnung

Qualität für Menschen

Niederschrift
über die 7. Sitzung des Gesundheitsausschusses
am 13.05.2022 in Köln, Horion-Haus
- öffentlicher Teil -

Anwesend vom Gremium:

CDU

Bündgens, Willi	(für van Benthem)
Dickmann, Bernd	(für Baer)
Heister, Joachim	
Körlings, Franz	(für Renzel)
Loepp, Helga	
Nabbefeld, Michael	
Schavier, Karl	
Stieber, Andreas-Paul	

SPD

Engler, Gerd	
Heinisch, Iris	
Karl, Christiane	
Kucharczyk, Jürgen	
Mahler, Ursula	(für Schulz)
Recki, Gerda	(für Krossa)

Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Deussen-Dopstadt	(für Hoffmann-Badache)
Kresse, Martin	
Manske, Marion	
Schäfer, Ilona	Vorsitzende
Tuschen, Johannes	(für Tietz-Latza)

FDP

vom Berg, Joachim
Breuer, Klaus

AfD

Dr. Schnaack, Frank

Die Linke.

Inderbieten Georg	(für Onori)

Die FRAKTION

Lukat, Nicole

Gruppe FREIE WÄHLER

Alsdorf, Georg

Verwaltung:

Wenzel-Jankowski	LVR-Dezernentin "Klinikverbund und Verbund Heilpädagogischer Hilfen"
Krüger	LVR-Fachbereichsleiter "Wirtschaftliche Steuerung"
Lüder	LVR-Fachbereichsleiter "Maßregelvollzug"
Dr. Möller-Bierth	LVR-Fachbereichsleiterin "Personelle und organisatorische Steuerung"
Stephan-Gellrich	LVR-Fachbereichsleiterin "Planung, Qualität und Innovationsmanagement"
Brehmer	Stellvertreter der Kaufmännischen Direktion im Vorstand des LVR-IFuB
Lohmanns	LVR-Fachbereich "Personelle und organisatorische Steuerung"
Anders	LVR-Fachbereichsleiter "Soziales Entschädigungsrecht" (bis TOP 9)
Woltmann	LVR-Stabsstelle "Inklusion - Menschenrechte - Beschwerden" (bis TOP 10)
Groeters	LVR-Fachbereich "Personelle und organisatorische Steuerung (Protokoll)

T a g e s o r d n u n g

Öffentliche Sitzung		**Beratungsgrundlage**
1.	Anerkennung der Tagesordnung	
2.	Niederschrift über die 6. Sitzung vom 18.03.2022	
3.	Sanierung, Umbau und Erweiterung des Hauses 29 "Paulo-Freire-Haus" an der LVR-Klinik Viersen zu einem Bildungscampus	**15/926** B
4.	Fachtagung zum Thema "Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) bei Mädchen/Frauen	**15/973** B
5.	PsychKG-Merkblatt für Patient*innen in bürgernaher Sprache (einfach verständlich) in Deutsch sowie 31 Fremdsprachen für den LVR-Klinikverbund	**15/920** K
6.	Stellungnahme zum Bericht der Garbrecht-Kommission	**15/912** K
7.	Integrierte Beratung: 3. Bericht zum Stand des Projektes zur sozialräumlichen Erprobung	**15/797** K
8.	LVR-Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention: Entwurf Jahresbericht 2021	**15/762** K
9.	Erweiterung des LVR-Beirates für Inklusion und Menschenrechte	**15/796** K
10.	Hilfen für aus der Ukraine geflüchtete Menschen durch die OEG-Traumaambulanzen	**15/981** K
11.	Maßregelvollzug	
11.1.	Gesetzesvorschlag zur Novellierung der Regelungen zur Unterbringung in einer Entziehungsanstalt gem. §§ 64 ff StGB	**15/908** K
11.2.	Belegungssituation im Maßregelvollzug	
12.	Anträge und Anfragen	
12.1.	Stärkung der Gesundheit und Steigerung der Lebensqualität durch Resilienztraining	**Antrag 15/58 Die FRAKTION** E
12.2.	Modellprojekt Bio-Lebensmittel in LVR-Kliniken	**Anfrage 15/31 Die Linke.** K
12.3.	Beantwortung der Anfrage 15/31 Die Linke.	
12.4.	Anfrage: Ansprechpartner*innen für Gleichstellung in den Kliniken	**Anfrage 15/30 GRÜNE** K
12.5.	Beantwortung der Anfrage 15/30 GRÜNE	
13.	Bericht aus der Verwaltung	

14.	Verschiedenes	
15.	Verschiedenes	

Nichtöffentliche Sitzung

16.	Niederschrift über die 6. Sitzung vom 18.03.2022	
17.	Wiederbestellung zum Ärztlichen Direktor im Klinikvorstand der LVR-Klinik Viersen	**15/902** B
18.	Strom- und Energieversorgung in den LVR-Kliniken	**15/944** K
19.	Aktueller Bericht aus dem Maßregelvollzug	
20.	Anträge und Anfragen	
21.	Bericht aus der Verwaltung	
22.	Verschiedenes	
23.	Bestellung eines Wirtschaftsprüfers zur Prüfung des Jahresabschlusses 2022 des LVR-Instituts für Forschung und Bildung	**15/934** B
24.	I. Quartalsbericht 2022 des Instituts für Forschung und Bildung	**15/940** K
25.	Verschiedenes	

Beginn der Sitzung:	09:30 Uhr
Ende öffentlicher Teil:	10:15 Uhr
Ende nichtöffentlicher Teil:	10:45 Uhr
Ende der Sitzung:	10:45 Uhr

Vor Eintritt in die Tagesordnung begrüßt die Vorsitzende die Mitglieder des Gesundheitsausschusses und die Verwaltung zu der heutigen Sitzung.

Öffentliche Sitzung

Punkt 1
Anerkennung der Tagesordnung

Frau Lukat erklärt, für die heutige Sitzung des Gesundheitsausschusses den Antrag Nr. 15/58 Die FRAKTION zurückzuziehen. Gegebenenfalls werde ein veränderter Antrag zu einem späteren Zeitpunkt eingebracht.

Der Tagesordnung für die Sitzung des Gesundheitsausschusses am 13.05.2022 wird mit dieser Änderung zugestimmt.

Punkt 2
Niederschrift über die 6. Sitzung vom 18.03.2022

Herr Kresse bittet, den Mitgliedern der Krankenhausausschüsse den Vortrag von Frau Brinkmann in der Sitzung des Gesundheitsausschusses am 18.03.2022 zum LVR-Gleichstellungsplan 2017 - 2020 zukommen zu lassen.

Der Gesundheitsausschuss stimmt dem zu.

Gegen den öffentlichen Teil der Niederschrift werden keine Einwendungen erhoben.

Punkt 3
Sanierung, Umbau und Erweiterung des Hauses 29 "Paulo-Freire-Haus" an der LVR-Klinik Viersen zu einem Bildungscampus
Vorlage Nr. 15/926

Die Vorsitzende führt aus, der Krankenhausausschuss 3 habe in seiner Sitzung am 09.05.2022 die Vorlage einstimmig empfohlen.

Herr Dr. Schnaack begrüßt das Projekt grundsätzlich, fragt aber nach, ob im Vorfeld auch über die Anmietung einer externen Immobilie nachgedacht worden sei, um Kosten zu sparen und eine schnellere Umsetzung vor 2026 zu ermöglichen.

Frau Wenzel-Jankowski antwortet, das Paulo-Freire-Haus eigne sich außerordentlich gut für den Ausbau zu einem Bildungscampus und komme dem Gesamtareal zugute. Das Raumkonzept sei zwischen allen Beteiligten abgestimmt. Die LVR-Klinik Viersen stehe vor der Herausforderung, die Ausbildung von Pflegefachkräften zu forcieren und die damit verbundenen Kapazitäten des Bildungszentrums auszuweiten. Für einen vergleichbaren Neubau sei mit deutlich höheren Kosten zu rechnen. Es müsse mit der baldigen Umsetzung der Maßnahme begonnen werden, damit alle Fördermittel fristgerecht eingesetzt werden können.

Der Gesundheitsausschuss fasst **einstimmig** folgenden Beschluss:

Die Verwaltung wird gemäß Vorlage Nr. 15/926 mit der weiteren Planung der Maßnahme beauftragt.

Punkt 4
Fachtagung zum Thema "Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) bei Mädchen/Frauen
Vorlage Nr. 15/973

Frau Heinisch führt aus, in der Fachtagung sollten bei den Autismus-Spektrum-Störungen die Auswirkungen auf alle Geschlechter betrachtet werden.

Frau Stephan-Gellrich informiert, bei der Formulierung des Tagesordnungspunktes sei sich an dem Antrag Nr. 15/23 GRÜNE orientiert worden. Ein besonderer Forschungsschwerpunkt liege bei Autismus-Spektrum-Störungen auf den Auswirkungen bei Mädchen und Frauen. In der Fachtagung solle aber auch auf die Problematik für alle Geschlechter eingegangen werden.

Frau Wenzel-Jankowski fasst die weitere Diskussion dahingehend zusammen, dass das Thema der Autismus-Spektrum-Störungen in der Fachtagung unter Gender-Aspekten behandelt werden solle, ohne dabei ein Geschlecht auszuschließen.

Die Vorsitzende schlägt vor, den Titel der Fachtagung noch entsprechend anzupassen.

Der Gesundheitsausschuss fasst **einstimmig** folgenden Beschluss:

Der Ausrichtung einer Fachtagung zum Thema "Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) bei Mädchen/Frauen" wird gemäß Vorlage Nr. 15/973 zugestimmt.

Punkt 5
PsychKG-Merkblatt für Patient*innen in bürgernaher Sprache (einfach verständlich) in Deutsch sowie 31 Fremdsprachen für den LVR-Klinikverbund
Vorlage Nr. 15/920

Herr Kresse begrüßt das überarbeitete Merkblatt, mit dem auch der Kritik der Betroffenenvertretungen der Staatlichen Besuchskommissionen nach § 23 PsychKG NRW sowie Änderungen am PsychKG NRW selbst Rechnung getragen werde. Eine Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie erfolge in der Regel auf anderen Grundlagen. Er schlägt aber vor, ein Merkblatt in bürgernaher Sprache auch für Patient*innen der Kinder- und Jugendpsychiatrie zu erstellen.

Frau Heinisch lobt, das Merkblatt sei sehr gelungen und weise einen Weg durch den Klinikalltag bei einer Unterbringung nach PsychKG NRW.

Frau Wenzel-Jankowski führt aus, die Überarbeitung des Merkblattes sei durch eine trialogisch besetzte Arbeitsgruppe erfolgt. Die professionelle Übersetzung in bürgernaher, einfach verständlicher Sprache in 31 Fremdsprachen, sei abgeschlossen.

Die Vorsitzende fasst die weitergehende Diskussion dahingehend zusammen, dass ein Merkblatt in bürgernaher Sprache auch für Patient*innen der Kinder- und Jugendpsychiatrie erstellt werden solle.

Die 2. Auflage des PsychKG-Merkblatts über die Rechte und Pflichten von nach dem PsychKG-NRW untergebrachten Patient*innen wird gemäß Vorlage Nr. 15/920 zur Kenntnis genommen.

Punkt 6
Stellungnahme zum Bericht der Garbrecht-Kommission
Vorlage Nr. 15/912

Herr Nabbefeld weist auf den in den Sitzungen des Sozialausschusses am 03.05.2022 und des Ausschusses für den LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen am 06.05.2022 einstimmig beschlossenen Ergänzungsantrag Nr. 15/60/1 CDU, SPD hin. Danach werde die Verwaltung beauftragt, eine Fachtagung zu organisieren, in der die Themen Gewaltschutz in der Eingliederungshilfe und insbesondere die Empfehlungen der Garbrecht-Kommission vertieft behandelt werden sollen.

Herr Kresse ergänzt, in der Sitzung des Ausschusses für den LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen am 06.05.2022 sei angeregt worden, analog zum Sozialausschuss auch den Aspekt des häuslichen Umfelds mit zu betrachten und die Sprecher*innen der im Landtag vertretenden Fraktionen zur Fachtagung einzuladen.

Die Vorsitzende führt aus, sie habe in der Sitzung des Sozialausschusses am 03.05.2022 angeregt, die Änderungen des Betreuungsgesetzes zum 01.01.2023 vorzustellen. Sie bittet, diese Vorlage auch dem Gesundheitsausschuss und dem Ausschuss für den LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen zur Verfügung zu stellen.

Die Stellungnahme zum Bericht der Garbrecht-Kommission wird gemäß Vorlage Nr. 15/912 zur Kenntnis genommen.

Punkt 7
Integrierte Beratung: 3. Bericht zum Stand des Projektes zur sozialräumlichen Erprobung
Vorlage Nr. 15/797

Herr Woltmann berichtet, es handele sich um den 3. Bericht zum Stand des Projektes zur sozialräumlichen Erprobung. Das Ende der sogenannten Erprobungsphase der Teilprojekte sei zum 30.06.2022 vorgesehen. Es gebe folgende Projekte: "BTHG 106 +", "Fachberatung Kindeswohl und Kinderrechte", "Peer-Bildungsberatung" und "Integrierte Beratung in der psychiatrischen Versorgung". Die Partizipation beschreibe die Beteiligung von Patient*innen in persönlichen und öffentlichen Angelegenheiten. In den LVR-Kliniken würden persönliche Angelegenheiten beispielsweise durch den Einsatz von Behandlungsvereinbarungen und partizipativen Behandlungsansätzen sowie Angebote der Genesungsbegleitung umgesetzt. Demgegenüber stehe die Beteiligung an öffentlichen Angelegenheiten, also im Rahmen der politischen Gremien sowie der Verwaltungsprozesse des Klinikverbundes. Ein trialogisches Beteiligungsformat liege immer dann vor, wenn beispielsweise psychiatrieerfahrene Menschen und Angehörige mit einbezogen würden.

Herr Kresse hebt die Bedeutung der integrierten Beratung hervor, die auch im BTHG verankert sei. Wichtig für psychisch Kranke sei eine gemeindepsychiatrische Versorgung, die niedrigschwellige Angebote vorhalte. Eine trialogische Struktur sollte immer dort zum Einsatz kommen, wo dieses möglich sei. Er fragt nach dem Projekt "Beratungstelefon Solingen".

Frau Wenzel-Jankowski antwortet, darüber sei in der Sitzung des Gesundheitsausschusses am 03.09.2021 berichtet worden. Die Finanzierung sei schwierig, so dass es für das Projekt keine Freistellungen gebe. Das Beratungstelefon Solingen sei aber ein wichtiger Baustein im Rahmen der integrierten Versorgung. Es werde weiter mit allen Beteiligten versucht, hier eine bessere Kooperation und Finanzierung, unter Beteiligung der LVR-Klinik Langenfeld, der Dependance Solingen, des Psychosozialen Trägervereins e.V. und möglichst auch des Sozialpsychiatrischen Dienstes in Solingen, zu erreichen.

Der Entwicklungsstand des LVR-Projektes zur Sozialräumlichen Erprobung Integrierte Beratung (SEIB) wird gemäß Vorlage Nr. 15/797 zur Kenntnis genommen.

Punkt 8
LVR-Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention: Entwurf Jahresbericht 2021
Vorlage Nr. 15/762

Herr Woltmann berichtet, der LVR-Aktionsplan "Gemeinsam in Vielfalt" sei 2014 vom Landschaftsausschuss beschlossen worden und bilde die zentrale Grundlage für die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. Seit 2016 erstelle die Stabsstelle Inklusion - Menschenrechte - Beschwerden in enger Zusammenarbeit mit den LVR-Dezernaten einmal jährlich einen Jahresbericht zur Umsetzung des Aktionsplanes. Dabei erfolge eine rückblickende Darstellung, welche besonderen Aktivitäten der LVR zur Erreichung seiner 12 Zielrichtungen aus dem LVR-Aktionsplan ergriffen habe. Damit sei der Jahresbericht ein wichtiges Instrument zur Überwachung und Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention im LVR. Im Jahresbericht gebe es 5 Kompetenzfelder, wobei der trialogische Ansatz immer dort Anwendung finde, wo dieses möglich sei. Nach der Beratung in allen Fachausschüssen im LVR sei abschließend eine Beschlussfassung durch

den Ausschuss für Inklusion vorgesehen.

Herr Kresse lobt die Berichterstattung. Sie biete eine gute Übersicht über die Aktivitäten der Verwaltung zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention.

Der Entwurf des Jahresberichtes 2021 zum LVR-Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention wird gemäß Vorlage Nr. 15/762 zur Kenntnis genommen.

Nach Beratung in allen Fachausschüssen im LVR ist abschließend eine Beschlussfassung durch den Ausschuss für Inklusion geplant.

Punkt 9
Erweiterung des LVR-Beirates für Inklusion und Menschenrechte
Vorlage Nr. 15/796

Die Vorsitzende informiert, der Ausschuss für Inklusion habe der Vorlage in seiner Sitzung am 31.03.2022 einstimmig zugestimmt.

Die Vorlage Nr. 15/796 wird zur Kenntnis genommen.

Punkt 10
Hilfen für aus der Ukraine geflüchtete Menschen durch die OEG-Traumaambulanzen
Vorlage Nr. 15/981

Herr Anders berichtet, nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine und dem Einsetzen der Fluchtbewegung aus den Kriegsgebieten seien der LVR-Fachbereich Soziale Entschädigung und das LWL-Amt für Soziales Entschädigungsrecht an das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen (MAGS) herangetreten und hätten diesem vorgeschlagen, die OEG-Traumaambulanzen auch für von Krieg und Flucht traumatisierte Menschen zu öffnen. Dieses sei auch bereits im Rahmen des Syrienkonfliktes und der Hochwasserkatastrophe erfolgt. Regulär ständen die OEG-Traumaambulanzen den im Inland von Gewalt betroffenen Menschen zur Verfügung. Das MAGS habe dem Vorschlag der Landschaftsverbände zugestimmt, sodass eine Finanzierung der Angebote, einschließlich notwendiger Kosten für Sprach- und Integrationsmittlung, durch das MAGS im Wege einer Projektförderung zur Verfügung gestellt wurden. Es könnten Einzel- und Gruppentherapien angeboten werden. Dabei sei es möglich, auch den niedergelassenen Bereich einzubeziehen. Bisher sei die Nachfrage nach den Angeboten der OEG-Traumaambulanzen aber eher verhalten.

Frau Wenzel-Jankowski bietet an, wenn Behandlungsbedarf bei den Flüchtlingen bestehe, könne eine Weiterbehandlung in den LVR-Kliniken erfolgen.

Frau Heinisch führt aus, das Verhandlungsergebnis sei sehr zu loben und es gebe eine gute Infrastruktur. Die Gebietskörperschaften seien dankbar für Hilfen für die geflüchteten Menschen, die einen Therapiebedarf hätten.

Die Vorsitzende hebt hervor, die Angebote müssten in den Kommunen bekannter gemacht werden.

Herr Kresse führt aus, ab 01.06.2022 hätten die ukrainischen Flüchtlinge Anspruch auf die staatliche Grundsicherung nach dem Sozialgesetzbuch II gegenüber den Jobcentern. Gleichzeitig würden ab 01.06.2022 Hilfen nach SGB XII geleistet. Durch den Wechsel aus dem Asylbewerberleistungsgesetz würden damit künftig umfassende Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhalts, für die Gesundheitsversorgung und die Integration nach SGB II

und SGB XII gewährleistet. Es stelle sich die Frage, inwieweit die Abteilungen für soziale Rehabilitation der LVR-Kliniken und der LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen Wohnraum und Hilfen zur Verfügung stellen können. Möglicherweise könnten auch ambulante Hilfen angeboten werden. Er macht auf die Bremer Homepage www.hilfsabfrage.de aufmerksam.

Frau Wenzel-Jankowski antwortet, im LVR-Klinik-Verbund und im LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen seien im Rahmen der Enthospitalisierungsmaßnahmen Plätze abgebaut worden. Von daher habe der LVR in dem Bereich nur beschränkte Ressourcen. Sobald es aber Anfragen gebe, werde der LVR dafür sorgen, dass entsprechende Hilfen geleistet würden.

Die Vorsitzende hebt hervor, in den Kommunen müsse bekannt gemacht werden, dass der LVR ab 01.06.2022 für die Eingliederungshilfe der ukrainischen Flüchtlinge zuständig sei.

Die Vorlage Nr. 15/981 zum Thema Hilfen für aus der Ukraine geflüchtete Menschen durch die OEG-Traumaambulanzen wird zur Kenntnis genommen.

Punkt 11
Maßregelvollzug

Punkt 11.1
Gesetzesvorschlag zur Novellierung der Regelungen zur Unterbringung in einer Entziehungsanstalt gem. §§ 64 ff StGB
Vorlage Nr. 15/908

Frau Wenzel-Jankowski berichtet, seit geraumer Zeit werde diskutiert, ob die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt gemäß § 64 StGB noch zeitgemäß sei oder ob diese Regelung aus dem Strafgesetzbuch gestrichen oder zumindest überarbeitet werden solle. Der LVR könne dem Vorschlag der Bund-Länder-Arbeitsgruppe gut zustimmen, den § 64 StGB beizubehalten und ihn zu überarbeiten. Der Vorschlag zur Novellierung der Unterbringung in einer Entziehungsanstalt sei gestern im Bundestag beraten und an den Rechtsausschuss zur weiteren Beratung überwiesen worden. Damit gehe das Gesetzgebungsverfahren weiter. Zusammen mit dem Bauprogramm, dem Qualitätssicherungsprogramm für den Maßregelvollzug und einer ambulanten Verzahnung von Schnittstellen und Interdependenzen zwischen allgemeinpsychiatrischer Versorgungslandschaft und Maßregelvollzug sehe sie eine bessere zukünftige Entwicklung für den Maßregelvollzug.

Der Bericht zur Novellierung der Regelungen zur Unterbringung in einer Entziehungsanstalt gem. §§ 64 ff StGB wird gemäß Vorlage Nr. 15/908 zur Kenntnis genommen.

Punkt 11.2
Belegungssituation im Maßregelvollzug

Herr Lüder erläutert, im Vergleich zur Stichtagsbelegung zum 01.04.2022 habe sich zum 01.05.2022 eine Erhöhung um weitere 8 stationäre Plätze ergeben.

Für die Errichtung einer Forensik für Frauen in Essen-Heidhausen gebe es mittlerweile einen Planungsbeirat, dessen konstituierende Sitzung bereits stattgefunden habe. Zur Information der Mitglieder hätten bereits Begehungen von einzelnen forensischen Standorten im Rheinland stattgefunden.

Für den Neubau in Wuppertal-Ronsdorf mit 150 Plätzen sei der Planungsbeirat ebenfalls bestellt. Die konstituierende Sitzung werde voraussichtlich im September stattfinden. Erste Gespräche zur Umsetzung des Neubaus seien mit der Stadt Wuppertal und dem Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW erfolgt. Nach der konstituierenden Sitzung sollen Besichtigungen von forensischen Einrichtungen stattfinden.

Der Bericht der Verwaltung wird zur Kenntnis genommen.

Punkt 12
Anträge und Anfragen

Punkt 12.1
Stärkung der Gesundheit und Steigerung der Lebensqualität durch Resilienztraining
Antrag Nr. 15/58 Die FRAKTION

Der Antrag Nr. 15/58 Die FRAKTION ist für die heutige Sitzung des Gesundheitsausschusses zurückgezogen worden.

Punkt 12.2
Modellprojekt Bio-Lebensmittel in LVR-Kliniken
Anfrage Nr. 15/31 Die Linke.

Die Beantwortung der Anfrage liegt vor.

Punkt 12.3
Beantwortung der Anfrage 15/31 Die Linke.

Herr Inderbieten hebt hervor, die Beantwortung der Anfrage sei sehr kurzfristig zugeschickt worden. Er bittet um Vertagung in die nächste Sitzung.

Der Gesundheitsausschuss stimmt dem zu.

Die Beantwortung der Anfrage soll in der Sitzung des Gesundheitsausschusses am 09.09.2022 zur Kenntnis genommen werden.

Punkt 12.4
Anfrage: Ansprechpartner*innen für Gleichstellung in den Kliniken
Anfrage Nr. 15/30 GRÜNE

Die Beantwortung der Anfrage liegt noch nicht vor.

Frau Wenzel-Jankowski informiert, sie solle bis zur Sitzung der Kommission Gleichstellung am 02.06.2022 vorgelegt werden.

Punkt 12.5
Beantwortung der Anfrage 15/30 GRÜNE

Die Beantwortung der Anfrage soll in der Sitzung des Gesundheitsausschusses am 09.09.2022 zur Kenntnis genommen werden.

Punkt 13
Bericht aus der Verwaltung

Frau Wenzel-Jankowski informiert über das Inkrafttreten des Krankenhausplans NRW. Es sei vorgesehen, im Mai die verwaltungstechnischen Voraussetzungen für die Umsetzung zu schaffen und im Juni mit den regionalen Planungsverfahren zu beginnen.

Frau Wenzel-Jankowski berichtet über die gebildete Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung. Besetzt sei die Kommission mit 15 Expert*innen aus der Versorgung, der Ökonomie, der Rechtswissenschaften und einem an das Bundesministerium für Gesundheit angebundenen Koordinator. Erarbeitet werden sollen schriftliche Stellungnahmen zu einzelnen Fragen der Krankenhausversorgung. Entsprechende Mitteilungen aus der Presse seien der Niederschrift als Anlage beigefügt.

Die Vorsitzende weist darauf hin, dass der Regierungskommission weder eine Patient*innenvertretung, noch eine Kassenvertretung und auch die Selbstverwaltung nicht angehörten. Hier sollte es ein ausgewogeneres Verhältnis geben.

Punkt 14
Verschiedenes

Keine Anmerkungen.

Punkt 15
Verschiedenes

Keine Anmerkungen.

Wuppertal, den 13.06.2022	Köln, den 08.06.2022
Die Vorsitzende	Die Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland In Vertretung
S c h ä f e r	W e n z e l - J a n k o w s k i

BM Lauterbach stellt Krankenhaus-Kommission vor

Expertinnen und Experten erarbeiten Reform-Empfehlungen

02. Mai 2022

Der Bundesminister für Gesundheit, Professor Karl Lauterbach, hat die „Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung" berufen. Besetzt ist die Kommission mit 15 Expertinnen und Experten aus der Versorgung (Pflege und Medizin), der Ökonomie, der Rechtswissenschaften und einem an das BMG angebundenen Koordinator. Erarbeitet werden sollen schriftliche Stellungnahmen zu einzelnen Fragen der Krankenhausversorgung. Wie im Koalitionsvertrag vereinbart, sollen die Empfehlungen Grundlagen für Krankenhausreformen ab dem Jahr 2023 werden. Mitglieder der Kommission sind:

1. **Prof. Dr. Boris Augurzky**, Kompetenzbereichsleiter Gesundheit im RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung.
2. **Prof. Dr. Reinhard Busse,** Professor für Management im Gesundheitswesen an der TU Berlin.
3. **Prof. Dr. Tom Bschor, Koordinator der Regierungskommission Krankenhausversorgung**, langjähriger Chefarzt der Abteilung für Psychiatrie der Schlosspark-Klinik Berlin.
4. **Prof. Dr. Jörg Dötsch,** Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ) und Direktor der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin an der Uniklinik Köln.
5. **Michaela Evans,** Direktorin des Forschungsschwerpunktes Arbeit & Wandel am Institut Arbeit und Technik (IAT) an der Westfälischen Hochschule.
6. **Prof. Dr. Dagmar Felix,** Professorin für Sozialrecht an der Universität Hamburg.
7. Volkswirtin **Irmtraud Gürkan,** stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende der Charité.
8. **Dr. Heidemarie Haeske-Seeberg,** Vorsitzende der Gesellschaft für Qualitätsmanagement und Leiterin Qualitätsmanagement und klinisches Risikomanagement der Sana Kliniken AG.
9. **Prof. Dr. Martina Hasseler,** Professorin für Klinische Pflege an der Ostfalia Hoschschule für angewandte Wissenschaften.
10. **Prof. Dr Stefan Huster,** Professor für Öffentliches Recht, Gesundheits- und Sozialrecht und Rechtsphilosophie an der Ruhr-Universität Bochum.
11. **Prof. Dr. Christian Karagiannidis,** Facharzt für Innere Medizin, Pneumologie und Intensivmedizin und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin.
12. **Prof. Dr. Thorsten Kingreen,** Professor für Öffentliches Recht, Sozialrecht und Gesundheitsrecht an der Universität Regensburg
13. **Prof. Dr. Heyo Kroemer**, Pharmazeut und Pharmakologe und Vorstandsvorsitzender der Charité.
14. **Prof. Dr. Laura Münkler,** Professorin für Öffentliches Recht (Verwaltungs- und Gesundheitsrecht) an der Universität Greifswald.
15. **Prof. Dr. Rajan Somasundaram,** Ärztlicher Leiter in der Notaufnahme Campus Benjamin Franklin.

16. **Prof. Dr. Leonie Sundmacher,** Professorin für Gesundheitsökonomie an der Fakultät für Sport- und Gesundheitswissenschaften an der TU München.

Die Kommission wird sich in den kommenden Tagen konstituieren und ihre Arbeit aufnehmen.

Hotline zum Coronavirus
(030) 346 465 100

Bürgertelefon zur Krankenversicherung
(030) 340 60 66-01

Bürgertelefon zur Pflegeversicherung
(030) 340 60 66-02

Bürgertelefon zur gesundheitlichen Prävention
(030) 340 60 66-03

© Copyright 2022 Bundesministerium für Gesundheit

DEUTSCHE KRANKENHAUS GESELLSCHAFT

Bundesverband der Krankenhausträger in der Bundesrepublik Deutschland

Pressemitteilung

DKG zur Bekanntgabe der Mitglieder der „Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung“

Kommission hat eine große Aufgabe vor sich

Berlin, 02. Mai 2022 – Zur Bekanntgabe der Mitglieder der „Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung“ erklärt Dr. Gerald Gaß, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG):

„Es ist gut, dass der Minister heute die Regierungskommission für die Krankenhausreform einberufen hat. Diese Kommission hat eine große Aufgabe vor sich, denn sie muss konsensfähige und umsetzbare Vorschläge unterbreiten. Es geht nicht darum, wissenschaftliche Modelle zu diskutieren, sondern tatsächliche Rahmenbedingungen für die Versorgung von 83 Millionen Menschen zu entwerfen, die dann auch von Kliniken und Kostenträgern mit Leben gefüllt werden können.

Es ist bekannt, dass wir die Beteiligung der Selbstverwaltung gefordert haben. Nun aber werden wir der Kommission jederzeit beratend zur Seite stehen und gehen davon aus, dass unsere Expertise in Diskussionen und Entscheidungen angemessen einbezogen wird.“

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) ist der Dachverband der Krankenhausträger in Deutschland. Sie vertritt die Interessen der 28 Mitglieder – 16 Landesverbände und 12 Spitzenverbände – in der Bundes- und EU-Politik und nimmt ihr gesetzlich übertragene Aufgaben wahr. Die 1.903 Krankenhäuser versorgen jährlich 17 Millionen stationäre Patienten und rund 19 Millionen ambulante Behandlungsfälle mit 1,3 Millionen Mitarbeitern. Bei 122 Milliarden Euro Jahresumsatz in deutschen Krankenhäusern handelt die DKG für einen maßgeblichen Wirtschaftsfaktor im Gesundheitswesen.

PRESSESTELLE

Joachim **Odenbach**
Telefon +49 30 39801-1020

Holger **Mages**
Telefon +49 30 39801-1022

Dr. Jörn **Wegner**
Telefon +49 30 39801-1023

Rike **Stähler**
Telefon +49 30 39801-1024

SEKRETARIAT
Stephanie **Gervers**
Telefon +49 30 39801-1021

Banu **Öztürk**
Telefon +49 30 39801-1025

Fax +49 30 39801-3021
E-Mail pressestelle@dkgev.de

Wegelystraße 3
10623 Berlin

www.dkgev.de
www.facebook.com/dkgev
www.twitter.com/dkgev
www.dkgev.de/rss2.php
www.youtube.com/user/dkgev

DEUTSCHE
KRANKENHAUS
GESELLSCHAFT

Bundesverband der Krankenhausträger
in der Bundesrepublik Deutschland

Rundschreiben Nr. 289/2022

Verteiler: Mitgliedsverbände	**Zuständige Bereiche im Krankenhaus:** Geschäftsführung/Verwaltungsleitung	**Datum:** 03.05.2022
Zuständig: Politik	**Ansprechpartner:** Jan Eilrich	**Telefon:** 030 39801-1017 **Telefax:** 030 39801-3011

Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung

Bundesgesundheitsminister Prof. Dr. Karl Lauterbach hat am 02.05.2022 im Rahmen einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz die Besetzung einer Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung bekannt gegeben. Die 15 Mitglieder sollen unter der Leitung von Prof. Dr. Bschor umfangreiche Empfehlungen für eine für das Jahr 2023 geplante Krankenhausreform erarbeiten. Die Konstituierung des Gremiums wird zeitnah erfolgen.

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen einer Pressekonferenz hat Bundesgesundheitsminister Prof. Dr. Karl Lauterbach die Konstituierung einer Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung verkündet (***Anlage 1***). Für das Gremium berief er folgende Expertinnen und Experten:

Koordination:

Prof. Dr. Tom Bschor, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und langjähriger Chefarzt der Abteilung für Psychiatrie der Schlosspark-Klinik Berlin und stellvertretender Vorsitzender der Berliner Gesellschaft für Psychiatrie und Neurologie

Mitglieder:

1. **Prof. Dr. Martina Hasseler** - Pflege- und Rehabilitationswissenschaftlerin und Professorin für Klinische Pflege an der Fakultät Gesundheitswesen an der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften

2. **Dr. Heidemarie Haeske-Seeberg** - Vorsitzende der Gesellschaft für Qualitätsmanagement und leitet den Bereich für Qualitätsmanagement und klinisches Risikomanagement der Sana Kliniken AG

3. **Michaela Evans** - Direktorin des Forschungsschwerpunktes Arbeit & Wandel am Institut Arbeit und Technik (IAT) an der Westfälischen Hochschule

4. **Prof. Dr. Jörg Dötsch** - Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ) und Direktor der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin an der Uniklinik Köln

5. **Prof. Dr. Christian Karagiannidis** - Facharzt für Innere Medizin, Pneumologie und Intensivmedizin und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin (DGIIN)

6. **Prof. Dr. Heyo Kroemer** – Pharmazeut, Pharmakologe und Vorstandsvorsitzender der Charité

7. **Prof. Dr. Rajan Somasundaram** - Ärztlicher Leiter in der Notaufnahme des Charité Campus Benjamin Franklin

8. **Prof. Dr. Dagmar Felix** - Professorin für Öffentliches Recht mit dem Schwerpunkt Sozialrecht an der Universität Hamburg

9. **Prof. Dr Stefan Huster** - Professor für Öffentliches Recht, Gesundheits- und Sozialrecht und Rechtsphilosophie an der Ruhr-Universität Bochum

10. **Prof. Dr. Thorsten Kingreen** – Professor für Öffentliches Recht, Sozialrecht und Gesundheitsrecht an der Universität Regensburg

11. **Prof. Dr. Laura Münkler** - Professorin für Öffentliches Recht mit Schwerpunkt Verwaltungs- und Gesundheitsrecht an der Universität Greifswald

12. **Prof. Dr. Boris Augurzky** - Kompetenzbereichsleiter Gesundheit im Rheinisch-Westfälischen Wirtschaftsinstitut (RWI)

13. **Prof. Dr. Reinhard Busse** - Professor für Management im Gesundheitswesen an der TU Berlin

14. **Irmtraud Gürkan** - Volkswirtin und u.a. stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende der Charité

15. **Prof. Dr. Leonie Sundmacher** - Professorin für Gesundheitsökonomie an der Fakultät für Sport- und Gesundheitswissenschaften der Technische Universität München

Dem Vernehmen nach soll sich die Regierungskommission zeitnah konstituieren, um umfassende Vorschläge für eine für das Jahr 2023 avisierte Krankenhausreform zu erarbeiten. Die DKG hat mit beigefügter Pressemitteilung auf die Bekanntgabe der Regierungskommission reagiert (***Anlage 2***).

Über die weiteren Entwicklungen werden wir Sie zeitnah informieren.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag:

gez. Jan Eilrich
Referent Bereich Politik

Anlagen

Die Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland

Qualität für Menschen

Vorlage Nr. 15/988

öffentlich

Datum: 19.08.2022
Dienststelle: OE 6
Bearbeitung: Herr Eichmüller

Schulausschuss	**22.08.2022**	**Kenntnis**
Sozialausschuss	**23.08.2022**	**Kenntnis**
Landesjugendhilfeausschuss	**01.09.2022**	**Kenntnis**
Gesundheitsausschuss	**09.09.2022**	**Kenntnis**
Ausschuss für Digitale Entwicklung und Mobilität	**14.09.2022**	**Beschluss**
Ausschuss für Inklusion	**19.09.2022**	**Kenntnis**

Tagesordnungspunkt:

Aufnahme des Regelbetriebs des LVR-Beratungskompasses zur dauerhaften Unterstützung Integrierter Beratung

Beschlussvorschlag:

Der Aufnahme des Regelbetriebs des LVR-Beratungskompasses zur dauerhaften Unterstützung integrierter Beratung und der Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes wird gemäß Vorlage Nr. 15/988 zugestimmt. Der LVR-Beratungskompass wird kontinuierlich inhaltlich und technisch weiterentwickelt.

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.	ja

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2025.	ja

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):

Produktgruppe:	
Erträge: Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan	Aufwendungen: /Wirtschaftsplan
Einzahlungen: Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:	Auszahlungen: /Wirtschaftsplan
Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:	
Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten	

In Vertretung

J a n i c h

Zusammenfassung

Wie in Vorlage 14/2746 umfassend beschrieben, ist mit Blick auf ratsuchende Personen eine integrierte Beratung dadurch gekennzeichnet, dass das gesamte Beratungsgeschehen fachlich-inhaltlich auf die ratsuchende Person zugeschnitten wird und möglichst in einem Beratungszuge mit wenigen Kontaktpersonen erfolgt. Die persönliche Lebenssituation, der individuelle Bedarf, sowie die spezifischen Kommunikations- und Mitwirkungsmöglichkeiten werden im Sinne des personenzentrierten Ansatzes konsequent berücksichtigt. Die Beratung nimmt den individuellen (Gesamt-)Bedarf in den Blick.
Die Umsetzung der integrierten Beratung erfolgte unter anderem durch das Teilprojekt B „Entwicklung und Aufbau eines Portals Integrierte Beratung". Ziel dieser Vorlage ist es, einen Überblick über die Aufnahme des Regelbetriebs des Webportals „LVR-Beratungskompass" zu geben.

Hierzu werden die Anforderungen an das Web-Portal und die Umsetzung der Anforderungen an den LVR-Beratungskompass erläutert. Mit Bezug auf die Vorlage 14/2746 werden die gestalterischen sowie funktionalen Eckpunkte des Portals erläutert.

Überblicke über das Nutzungserleben sowie die Barrierefreiheit stellen ebenfalls Eckpunkte dieser Vorlage dar, welche durch repräsentative Nutzergruppen im Rahmen von Akzeptanztests geschaffen wurden. Die Vorlage schließt mit der Verknüpfung des LVR-Beratungskompass als Basisdienst für die Umsetzung des Online-Zugangsgesetz.

Begründung der Vorlage Nr. 15/988:

Aufnahme des Regelbetriebs des LVR-Beratungskompass zur dauerhaften Unterstützung Integrierter Beratung

Inhalt

1 Integrierte Beratung 2
2 Webportal „LVR-Beratungskompass" 3
2.1 Inhalt des LVR-Beratungskompass 3
2.2 Gestalterische und funktionale Eckpunkte 4
2.3 Nutzungserleben 7
2.4 Barrierefreiheit 7
2.5 LVR-Beratungskompass als Plattform für die Erfüllung des Onlinezugangsgesetzes 8

1 Integrierte Beratung

Der LVR nimmt in all seinen Geschäftsfeldern Beratungsleistungen wahr. Im Wesentlichen richten sich diese direkt, indirekt oder mittelbar an Menschen mit Behinderungen im Rheinland bzw. deren Angehörige oder Menschen die von Behinderung bedroht sind. Mit Beschluss des Antrages 14/140 („Haushaltsbegleitbeschluss") wurde die Verwaltung u.a. beauftragt, „alle Felder, in denen der LVR beratend tätig ist, aufzulisten. Ziel ist eine stärkere Koordination und Vernetzung der Beratungsleistungen".

Zu diesem Zweck verfolgte der LVR gemäß Vorlage 14/2746 in zwei dezernatsübergreifenden Projekten (Projekt A: Sozialräumliche Erprobung Integrierter Beratungsmodelle / Projekt B: Entwicklung und Aufbau eines Portals Integrierte Beratung) die Leitidee der sogenannten ‚Integrierten Beratung'. Mit Blick auf die rat- und hilfesuchenden Personen ist eine integrierte Beratung dadurch gekennzeichnet, dass das gesamte Beratungsgeschehen fachlich-inhaltlich auf die ratsuchende Person zugeschnitten wird und möglichst in einem Beratungszuge mit wenigen Kontaktpersonen erfolgen kann.

Für die Ratsuchenden besteht der Hauptvorteil der ‚Integrierten Beratung' darin, dass sie Beratung aus einer Hand erfahren und somit schnell und zielführend die Information und Unterstützung erhalten, die sie tatsächlich brauchen und nutzen können. Hierbei wurde insbesondere dem Aspekt des niedrigschwelligen Zugangs Rechnung getragen.

Auf organisatorischer Ebene zeichnet sich eine ‚Integrierte Beratung' dadurch aus, dass die Beratungsangebote gut miteinander vernetzt sind, wechselseitig aufeinander verweisen können und koordiniert sind. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, wurde bei der Konzeption der Themenseiten des Beratungskompasses großer Wert auf eine

umfangreiche dezernatsübergreifende Abstimmung bezüglich der Koordination der operativen redaktionellen Tätigkeiten gelegt. Ziel dieser Koordination war, bei der Präsentation der Leistungen des LVR die Perspektive des rat- und hilfesuchenden Bürgers einzunehmen und nicht die dezernatsbezogene Innensicht des LVR widerzuspiegeln. Um dieses Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, werden nach der Produktivsetzung des Beratungskompasses weiterhin regelmäßig Abstimmungen mit Vertreter*innen der Fachdezernate durchgeführt, um neue oder veränderte Themenseiten den Bürger*innen abgestimmt auf sie zugeschnitten zu präsentieren.

2 Webportal „LVR-Beratungskompass"


Durch den ‚LVR-Beratungskompass' wurden somit seit dem 01.09.2021 Akteure und Verfahren in der modellhaften sozialräumlichen Erprobung erfolgreich unterstützt, da Standardmerkmale, wie z.B. die vollständige und differenzierte Darstellung der sozialräumlichen „LVR-Präsenz" vor Ort, beziehungsweise in der Region, und der zu digitalisierende „Verwaltungsservice" unmittelbar durch entsprechende Funktionen im LVR-Beratungskompass unterstützt werden.

Diese Unterstützung ist durch eine Suchfunktion sichergestellt, die mithilfe einer interaktiven Landkarte den Nutzer*innen ermöglicht, innerhalb einer von ihm ausgewählten Region sämtliche Angebote des LVR und externer Institutionen anzuzeigen und diese nach Themenfeldern filtern kann. Nachdem die Nutzer*innen das passende Beratungsangebot gefunden haben, kann direkt der Kontakt zu der jeweiligen Ansprechperson aufgenommen werden. Eine Terminanfrage ist in den meisten Fällen ebenfalls möglich. Abgerundet wird die Möglichkeit zur direkten Kontaktaufnahme auch durch die Integration eines Routenplaners für jede Beratungsstelle, unter Einbeziehung des ÖPNV. Die Applikation ‚Wege zum LVR' wurde in den Beratungskompass integriert und hilft Menschen mit Mobilitätseinschränkungen beim Aufsuchen einer Beratungsstelle.

2.1 Inhalt des LVR-Beratungskompass

Die Themenbezogenheit des Beratungskompasses lässt eine dezernatsspezifische Zuordnung der präsentierten Themen nur in Einzelfällen zu, die überschneidende Verantwortung wurde bewusst in den Blick genommen, um bei der Themenpräsentation eine nutzer*innenzentrierte Perspektive einzunehmen, welche in einer nutzer*innenzentrierten Beratung und Leistungserbringung mündet.

Abbildung 1: Themen des Beratungskompass



2.2 Gestalterische und funktionale Eckpunkte

Der Beratungskompass hat gemäß Vorlage 14/2746 die grundsätzliche Aufgabe, anwenderfreundlich und soweit wie möglich barrierefrei standortunabhängig rat- und hilfesuchenden Bürger*innen umfassende Informationen über alle relevanten LVR-Leistungen anzubieten.

Der Beratungskompass soll vorrangig Menschen mit Behinderungen in ihren persönlichen Angelegenheiten zur Information und Kommunikation mit dem LVR zur Verfügung stehen.
Darüberhinausgehend soll der Beratungskompass auch die Beratungsexpertise des LVR im Sinne einer internen Arbeitsplattform vernetzen und integrieren sowie der Kooperation mit öffentlichen und freien Partnern dienen.

Ziel dieses Portals ist es, in einer organisationsübergreifenden und homogenen Benutzeroberfläche bedarfsgerechte Informationen und interaktive Elemente zu Leistungen, (Verwaltungs-)Verfahren oder Diensten bereitzustellen. Dabei werden natürlich bereits vorhandene und für die zukünftige Portalphilosophie geeignete Web-Lösungen und auch geeignete einzelne Elemente eingebunden. Dazu zählen u.a. Anwendungen wie „Wege zum LVR", vorhandene Erklär-Videos oder interaktive Formulare. Das Portal wird auf Grund seiner spezifischen Zielsetzung parallel zu bereits bestehenden Internetangeboten des LVR entwickelt, insbesondere auch parallel zu www.lvr.de.

Tabelle 1: Funktionsziele des Beratungskompass

Geplante Funktionsziele gemäß Vorlage 14_2746	umgesetzt	nicht umgesetzt	Bemerkung
Internetportal steht mit Basisfunktionen zur Verfügung	✓		Beratungskompass wurde am 01.09.2021 produktiv gesetzt. Alle angeforderten Basisfunktionen standen zur Verfügung
Bedarfsgerechte Benennung von fachlichen Ansprechpersonen o Strukturunabhängig, auf Basis einer intelligenten Suchfunktion	✓		Ansprechpersonen werden bezugnehmend zu einer Ortseingabe der Nutzer*innen systemseitig gesucht und ausgespielt.
Geodatenbasierte Informationen zu Beratungsangeboten und Leistungen des LVR o Standardisierte Bereitstellung von Basisdaten	✓		Beratungsangebote werden bezugnehmend zu einer Ortseingabe der Nutzer*innen systemseitig gesucht und ausgespielt. Die Sortierung der Ergebnisse erfolgt nach aufsteigender Entfernung vom Wunschort der Nutzer*innen.
Erste Online-Terminvereinbarungsfunktionen für ausgewählte Leistungen des LVR	✓		Nutzer*innen können unverbindliche Terminanfragen an ausgewählte Mitarbeitende des LVR stellen. Der Beratungskompass ermöglicht Nutzer*innen, auf Kontaktformulare externer Partner*innen des LVR zuzugreifen.
Interaktive und technisch gleichartige Formulare zur Antragstellung		🕐	Einbindung von Lucom-Formularen in den Beratungskompass wird aktuell im Rahmen des OZG-Programms durchgeführt.
Überleitung bereits vorhandener Informationen und Materialien		🕐	
Einrichtung von technischen Möglichkeiten und Verfahren zur Datenpflege	✓		Pimcore[1] wurde als Tool für die zentrale Datenhaltung und das Datenmanagement eingesetzt.
Einbindung vorhandener Fachanwendungen		🕐	Fachanwendungen werden sukzessive im Rahmen der Umsetzung des OZG-Programms an den Beratungskompass angebunden.

[1] Pimcore ist eine frei nutzbare Open-Source-Software-Plattform.

Geplante Funktionsziele gemäß Vorlage 14_2746	umgesetzt	nicht umgesetzt	Bemerkung
Online-Dialoge zur Beratung bei der Auswahl und Bearbeitung von Anträgen	✓		Die 'Geführte Formularbearbeitung' leitet den Nutzer dialoghaft zu dem von ihm benötigten, in den Beratungskompass eingebetteten Online-Formular.
Einrichtung von personalisierten Nutzer*innenbereichen zur individuellen Ablage von eigenen Daten und Informationen des LVR		🕚	Pilotierungen von diesbezüglichen Autorisierungslösungen sind vom Hersteller Dataport[2] für November 2022 geplant.
Ausbau der Unterstützung bei der Antragstellung (verschiedene Aspekte der Barrierefreiheit)	✓		Hierzu werden entwicklungsbegleitende qualitätssichernde Maßnahmen gemäß BITV[3] durchgeführt.
Weitere, noch zu definierende Funktionsziele abgeleitet aus dem noch zu entwickelnden Gesamtzielbild bzw. aus Anforderungen aus der modellhaften Erprobung	✓		User Acceptance Tests mit verschiedenen Nutzergruppen lieferten Anregungen für Anforderungserweiterungen, welche in die Entwicklung des Beratungskompasses aufgenommen wurden.
Einbindung von Videotutorials mit Basisinformationen zu spezifischen Themenfeldern	✓	🕚	Die Startseite und viele Themenseiten enthalten Erklärvideos, diese wurden von allen Nutzern als hilfreich empfunden, weitere Themenseiten werden mit Erklärvideos ausgestattet.
Hinzunahme von Angeboten Dritter zur Verbreiterung der Informationsinhalte	✓	🕚	§ 106 BTHG wurde dahingehend umgesetzt, dass in den Beratungskompass Beratungsangebote integriert sind, die nicht direkt vom LVR angeboten werden.

[2] Dataport ist der Informations- und Kommunikationsdienstleister der öffentlichen Verwaltung für die vier Bundesländer Hamburg, Schleswig-Holstein, Bremen und Sachsen-Anhalt sowie für die Steuerverwaltungen in Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen.

[3] Verordnung zur Schaffung barrierefreier Informationstechnik nach dem Behindertengleichstellungsgesetz (Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung - BITV 2.0).

2.3 Nutzungserleben

Der LVR hat als Leistungserbringer für Menschen mit Behinderungen eine sehr heterogene Klientel. Die Leistungserbringung erfolgt seitens verschiedener Fachdezernate. Die Leistungen des LVR werden den rat- und hilfesuchenden Bürger*innen im Beratungskompass in niedrigschwelliger und komfortabler Weise zugänglich gemacht und die Kontaktaufnahme zu möglichen Ansprechpartnern passgenau für das jeweilige Anliegen des Nutzers ermöglicht. Das Informationsangebot des Beratungskompasses ist sprachlich und didaktisch so gestaltet, dass Interessierte intuitiv das für sie passende Angebot finden können, insbesondere dadurch, dass auf verschiedenen Wegen nach Beratungsangeboten gesucht werden kann. Nutzer*innen des Beratungskompasses können die für sich komfortabelste Art des Informationszuganges auswählen. An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass diese für die Nutzer*innen komfortable Navigationsstruktur eine optimale Auffindbarkeit des Beratungskompasses durch Suchmaschinen dadurch beeinträchtigt, dass die über verschiedene Pfade auffindbaren Inhalte des Beratungskompasses als eine von Suchmaschinen ungewünschte Redundanz bewertet werden. Dieser Sachverhalt liegt zurzeit im Fokus der Weiterentwicklung und ständigen Verbesserung der Integrierten Beratung. So sollen technische Vorkehrungen diese scheinbare Redundanz für Suchmaschinen unsichtbar machen. Zudem muss das gleiche Vorgehen für redundante Informationen auf www.lvr.de zur Anwendung kommen.

Die rat- und hilfesuchende Bürger*innen können eine Suchfunktion nutzen, welche die Suche nach einem Thema mit einer Standortsuche verknüpft und so den Nutzer*innen die Information ausspielt, welcher Ansprechpartner zu seiner Anfrage am Wunschort für ihn zuständig ist.
Eine systemseitige Vorlesefunktion unterstützt durchgängig im Beratungskompass diejenigen Nutzer*innen, denen Lesen schwerfällt. Auch gibt es zu etlichen Themen, über die der Beratungskompass informiert, einfach verständliche Erklärvideos, deren Dauer die Aufmerksamkeitsspanne der Nutzer*innen bewusst nicht überlastet. Die Inhalte der Themenseiten sowie die Erklärvideos wurden in Zusammenarbeit mit den beteiligten Fachdezernaten erstellt und führten auch hier zu einer dezernatsübergreifenden Vernetzung bezüglich der Beratungsangebote.
Seit dem Live-Gang des Beratungskompass am 01.09.2022 wird mithilfe einer Webanalytik-Plattform das Benutzerverhalten verfolgt, hierbei zeichnet sich ab, dass die Themenseiten zu ‚Arbeit und Behinderung', ‚Eingliederungshilfe' und ‚Kindertagesbetreuung' am häufigsten durch die Nutzer*innen aufgesucht werden. Seit der Antrag auf Aufhebung des besonderen Kündigungsschutzes als online-Formular im Beratungskompass verfügbar ist, wird dieser Bereich des Beratungskompass vermehrt frequentiert. Die durchschnittlichen täglichen Zugriffe die echten Nutzer*innen zugerechnet werden können (in Unterscheidung zu Zugriffen durch Web-Roboter von Suchmaschinen) liegen bei 52 Zugriffen /pro Tag.

2.4 Barrierefreiheit

Viele Themenseiten des Beratungskompasses sind in leichter Sprache verfügbar und unterstützen Nutzer*innen, denen das Lesen und Verstehen komplexer Formulierungen schwerfällt.

Zukünftig werden zusätzlich zur Startseite des Beratungskompasses, welche jetzt schon durch einen Avatar in einem Gebärdensprache-Video übersetzt wird, auch weitere Themenseiten in Gebärdensprache bereitgestellt. Ein Projekt, welches die automatische Übersetzung von Texten in Gebärdensprache zum Inhalt hat, soll gemeinsam mit externen Partnern umgesetzt werden.
Eine weitere Funktionalität des Beratungskompasses, die ‚Geführte Suche', unterstützt die Nutzer*innen in dialoghafter Art und Weise bei der Suche nach einer Ansprechperson für ihre individuellen Anliegen. Diese Funktion wurde im Rahmen von Akzeptanztests durch Menschen mit Lern- und Leseschwierigkeiten begrüßt und als sehr hilfreich empfunden.

Um sicherzustellen, dass Menschen, die bei der Nutzung von Computern auf Assistenzsysteme angewiesen sind, den Beratungskompass vollumfänglich nutzen können, wurde die Unterstützung durch externe Probanden mit Seh- und motorischen Behinderungen in die Entwicklung des Beratungskompasses integriert. Das Ergebnis dieser Akzeptanztests war positiv, die verwendeten Assistenzsysteme kooperierten problemlos mit dem Beratungskompass.

Während der Entwicklung des Beratungskompasses wurde begleitend die BITV-Konformität durch LVR-InfoKom geprüft, sowie nach Abschluss des Projektes eine umfassende Prüfung auf vollumfängliche BITV-Konformität durch die Agentur DIAS[4] durchgeführt. Wo entsprechender Handlungsbedarf festgestellt wurde, ist die sunzinet GmbH[5] mit den entsprechenden Ergänzungen beauftragt worden.

Zum Zweck der Steigerung der Angebote zur Gebärdensprachkommunikation beteiligt sich der LVR an einem Forschungsprojekt zur Entwicklungen eines automatisierten Gebärdensprachavatars.

2.5 LVR-Beratungskompass als Plattform für die Erfüllung des Onlinezugangsgesetzes

Das Onlinezugangsgesetz (OZG) sieht bis Ende 2022 die digitale Ertüchtigung eines Großteils der bundesweit mehr als 6.000 Verwaltungsleistungen des Leistungskatalogs der öffentlichen Verwaltung (LeiKa) vor.
Aus der Masse an Verwaltungsleistungen wurden zur vereinfachten Umsetzung 575 OZG-Leistungsbündel gebildet, die wiederum entsprechend der föderalen Zuständigkeit unterteilt wurden. Gemeinsam mit den zuständigen Dezernaten sind 42 OZG-Leistungen ermittelt worden, die es bis Ende 2022 digital zu ertüchtigen gilt.
Die Umsetzung des OZGs ist ein großer Schritt in Richtung digitale Verwaltung und folgt folgenden Motiven:

- *Bürger*innenfreundliche Verwaltung*
- *Kohärente Digitalisierung der Verwaltungsleistungen*
- *Arbeit 4.0 und aktivitätsbasiertes Arbeiten*

[4] Die DIAS GmbH – kurz für: Daten, Informationssysteme und Analysen im Sozialen – wurde 1994 von Rehabilitationsforschern der Universität Hamburg gegründet. Die Arbeitsschwerpunkte sind Barrierefreiheit und Inklusion.
[5] Die sunzinet GmbH ist eine Digitalagentur in Köln, die den Beratungskompass gemeinsam mit Dezernat 6 entwickelt hat.

Um die Anforderungen des OZGs im LVR umzusetzen wird ein Programm zur Umsetzung dieser Vorgaben betrieben. Das Programm bildet die Basis für die Zusammenarbeit von LVR-Dezernat 6 mit den jeweils für die Leistung zuständigen LVR-Dezernaten sowie LVR-InfoKom. Dem LVR-Dezernat 6 obliegt die Verantwortung für die Grundarchitektur und die Koordination des Programms sowie der methodischen Unterstützung. Die Details zur Umsetzung des Programms sind in den Vorlagen Nr. 15/206 Das Onlinezugangs- und das E-Government-Gesetz als ein Treiber der Digitalen Transformation des LVR sowie 15/880 Bericht zum aktuellen Umsetzungsstand des OZG-Programmes im LVR zu ausgeführt.

In der Nutzung des Beratungskompasses als Basiskomponente im Rahmen der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) spiegelt sich die Leitidee der integrierten Beratung wider. Durch dieses Gesetz soll einerseits der Aufbau eines Bundesportales, inklusive Nutzerkonto als Identifizierungskomponente, umgesetzt werden. Andererseits beinhaltet das Gesetz die Verknüpfung der Verwaltungsportale von Bund und Ländern zu einem Portalverbund, die Bereitstellung von Basisdiensten und IT-Komponenten sowie den vollständigen Ausbau digitaler Verwaltungsleistungen bis Ende 2022. In diesem Zusammenhang wird den rat- und hilfesuchenden Bürger*innen innerhalb des Beratungskompasses der digitale Zugang zu den Leistungen des LVR und anderer Institutionen OZG-konform ermöglicht, ohne auf eine niedrigschwellige und auf die Benutzer*innen zugeschnittene Präsentation der Leistungsangebote unter Berücksichtigung des barrierefreien Zugangs zu verzichten.

In Vertretung

J a n i c h

Die Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland

Qualität für Menschen

Vorlage Nr. 15/1089

öffentlich

Datum: 24.08.2022
Dienststelle: Fachbereich 84
Bearbeitung: Herr Baar

Krankenhausausschuss 3	**05.09.2022**	**Kenntnis**
Krankenhausausschuss 2	**06.09.2022**	**Kenntnis**
Krankenhausausschuss 4	**07.09.2022**	**Kenntnis**
Krankenhausausschuss 1	**08.09.2022**	**Kenntnis**
Gesundheitsausschuss	**09.09.2022**	**Kenntnis**

Tagesordnungspunkt:

Gesamtvorlage der aktualisierten Versorgungskonzepte der gerontopsychiatrischen Abteilungen der LVR-Kliniken

Kenntnisnahme:

Der Bericht zu den aktualisierten Versorgungskonzepten der gerontopsychiatrischen Abteilungen der LVR-Kliniken wird gem. Vorlage Nr. 15/1089 zur Kenntnis genommen.

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.	ja

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2025.	ja

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):

Produktgruppe:	
Erträge: Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan	Aufwendungen: /Wirtschaftsplan
Einzahlungen: Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:	Auszahlungen: /Wirtschaftsplan
Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:	
Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten	

In Vertretung

W e n z e l - J a n k o w s k i

Zusammenfassung:

Die Überarbeitung der strategischen Versorgungskonzepte der Abteilungen für Gerontopsychiatrie der LVR-Kliniken beruht auf dem im Gesundheitsausschuss am 22.01.2019 eingereichten Antrag Nr. 14/300. Dieser forderte die Aktualisierung der im Jahr 2015 vorgelegten gerontopsychiatrischen Versorgungskonzepte (vgl. Vorlage Nr. 14/591; 14/592; 14/593; 14/594).

Begründung der Vorlage Nr. 15/1089:

Die Vorlage Nr. 15/1089 gibt einen Überblick über die bestehende Versorgungssituation im Bereich der Gerontopsychiatrie, zu erwartende Anpassungen in den Pflichtversorgungsgebieten und Änderungen durch die demographische Entwicklung (siehe Anlage). Hieraus werden Schlussfolgerungen für die strategische Planung des Klinikverbunds gezogen. Die Versorgungskonzepte der einzelnen Kliniken werden in einem nächsten Schritt in Einzelvorlagen in der kommenden Ausschussrunde vorgelegt. Einzelne Aspekte daraus werden auch hier berichtet. Es kann an dieser Stelle bereits festgestellt werden, dass die strategischen Versorgungskonzepte der gerontopsychiatrischen Fachabteilungen der LVR-Kliniken eine gute Grundlage für die Weiterentwicklung und zukünftigen Herausforderungen der gerontopsychiatrischen Versorgung bilden.

Bekannte Entwicklungen wie der demographische Wandel, der medizinische Fortschritt sowie die Singularisierung von Haushalten in den Ballungszentren stellen besondere Herausforderungen dar, die eine Anpassung entsprechender Behandlungs- und Versorgungsstrukturen erfordern. Hierbei darf der Fokus jedoch nicht nur auf die direkt Betroffenen gerichtet werden. Mehr denn je ist in der Zukunft das soziale System verstärkt mit einzubeziehen. Dem individuellen Behandlungsbedarf gilt es zukünftig, mit angemessenen Versorgungskonzepten zu begegnen.

Der Krankenhausplan NRW 2022 sieht den Gesamtbedarf der Behandlungskapazitäten im Gebiet der Psychiatrie und Psychotherapie – bis auf einen kleinen Teil tagesklinischer Erweiterung in vereinzelten Regionen - für die Zukunft im Wesentlichen unverändert. Eine Ausweitung der gerontopsychiatrischen Kapazitäten wird daher durch Verschiebungen innerhalb der Gesamtkapazitäten der Erwachsenenpsychiatrie zu realisieren sein.

Bezogen auf das künftige Pflichtversorgungsgebiet der LVR-Kliniken im Gebiet der Erwachsenenpsychiatrie und -psychotherapie ist auf Basis der Daten der Bevölkerungsvorausberechnung von IT.NRW in den kommenden 20 Jahren mit wenig Veränderung bezüglich der Einwohner*innen ab 18 Jahren insgesamt zu rechnen. Innerhalb der Gruppe der Erwachsenen sind jedoch deutliche Verschiebungen von den 18- bis unter 65-Jährigen hin zu den ab 65-Jährigen zu erwarten. Spätestens ab Mitte der 2030er Jahre wird zudem das Anwachsen der Altersgruppe der Hochbetagten (ab 80 Jahren) die gerontopsychiatrischen Abteilungen vor besondere Herausforderungen stellen. Insgesamt sind dabei die ländlichen Regionen in der Regel stärker als die kreisfreien Städte von diesen Entwicklungen betroffen.

Die zukünftige gerontopsychiatrische Versorgungsstruktur sowie die Behandlungsinhalte werden hierbei wesentlich durch die demographische Entwicklung, unterschiedliche ausbildungs-, berufsbedingte und kulturell beeinflusste Biographien, zunehmend individuelle Lebenskonzepte, wie auch ein erhöhtes Bewusstsein der Patient*innen über Rechte auf autonome Selbstbestimmung im Behandlungsprozess, gekennzeichnet sein. All das wird zu einem Wandel der Anforderungen an eine patient*innenzentrierte Behandlung führen.

Diese Vorlage gibt einen verbundweiten Überblick über die sich aus der in Umsetzung der Krankenhausplanung NRW 2015 ergebenden Anpassungen der Pflichtversorgungsgebiete sowie aus der Verschiebung der Altersstruktur in der Bevölkerung ergebenden strukturellen Voraussetzungen.

In Vertretung

W e n z e l – J a n k o w s k i



Update 2022

Weiterentwicklung der gerontopsychiatrischen Versorgungskonzepte im LVR-Klinikverbund

LVR-Klinikverbund
LVR Qualität für Menschen

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung 1

2. Pflichtversorgung und demographische Entwicklung im LVR-Klinikverbund 2

2.1 Pflichtversorgungsgebiete der LVR-Kliniken 2

2.2 Demographische Entwicklung in den Pflichtversorgungsgebieten 3

2.3 Zusammenfassung 9

3. Die gerontopsychiatrische Versorgung im LVR-Klinikverbund 10

3.1 Angebotsstrukturen 10

3.2 Krankheitsbilder und Inanspruchnahme der Angebote 14

4. Strategische Versorgungskonzepte der gerontopsychiatrischen Abteilungen der LVR-Kliniken 20

4.1 Realisierte Baumaßnahmen und bauliche Standardverbesserungen 20

4.2 Vernetzung und Kooperation im Sinne einer ganzheitlichen Patient*innenversorgung 21

4.3 Personal- und Qualifikationsstruktur 22

4.4 Weiterentwicklung der Angebotsstrukturen (Behandlungsangebote) 23

5. Ausblick 24

Abkürzungsverzeichnis 27

Abbildungsverzeichnis nach Kapiteln

Abbildung 2-1: Pflichtversorgungsgebiet der LVR-Kliniken 2022 2

Abbildung 2-2: Veränderung der Altersgruppen in NRW 2015 - 2021 - 2041 4

Abbildung 2-3: Einwohnerdifferenzen im Planungs-PVG des LVR-Klinikverbundes 2021 bis 2041; Altersgruppenanteile 2015, aktuell und 2041 5

Abbildung 2-4: Einwohner*innen in den Altersgruppen im PVG IST und Plan 2021 und 2041; Differenz und anteilige Veränderung aktuell zu 2015 und 2041 zu aktuell 5

Abbildung 2-5: prozentuale Einwohnerveränderung in den PVG der LVR-Kliniken 2041 zu aktuell nach Altersgruppen 6

Abbildung 2-6: Einwohnerdifferenz der GER-Altersgruppen im Planungs-PVG des LVR-Klinikverbundes bis 2041 7

Abbildung 2-7: Altersgruppenanteile in den PVG bei den Erwachsenen 2021 und 2041 ... 7

Abbildung 2-8: Einwohnerentwicklung, prozentuale Veränderung und Anteile der GER-Altersgruppen aktuell, Planung und 2041 8

Abbildung 2-9: prozentuale Einwohnerveränderung in den PVG der LVR-Kliniken 2041 zu aktuell nach GER-Altersgruppen 8

Abbildung 3-1: Übersicht der gerontopsychiatrischen Angebote der LVR-Kliniken in 2022 nach Setting und zentral/dezentral 10

Abbildung 3-2: gerontopsychiatrische Betten pro 10.000 PVG-Einwohner*innen im Alter ab 65 Jahren 11

Abbildung 3-3: Anteil vollstationärer GER-Kapazitäten an den PP-Kapazitäten in 2022 ..12

Abbildung 3-5: Anteil teilstationärer GER-Kapazitäten an den PP-Kapazitäten in 2022 ...13

Abbildung 3-4: gerontopsychiatrische Plätze pro 10.000 PVG-Einwohner*innen im Alter ab 65 Jahren 13

Abbildung 3-6: Fälle/Patient*innen ab 65 Jahren in den Settings 2013 und 2019 14

Abbildung 3-7: Entwicklung der Patient*innen- bzw. Fallzahlen im Klinikverbund 2013 bis 2019 14

Abbildung 3-8: Anteile der ambulanten Patient*innen im Alter ab 65 in 2019 15

Abbildung 3-9: Anteile der teilstationären Fälle im Alter ab 65 in 2019 15

Abbildung 3-10: Anteile der vollstationären Fälle im Alter ab 65 in 2019 16

Abbildung 3-11: Anteil der vollstationären Fallzahlen im LVR-Klinikverbund 2019 nach Altersjahren 16

Abbildung 3-12: Kumulierte Berechnungstage der vollstationären Fälle 2019 im LVR-Klinikverbund nach Altersjahren 17

Abbildung 3-13: Krankenhausstatistik NRW 2019 - vollstationäre Belegungstage ab 65 Jahren nach Diagnosehauptgruppen 17

Abbildung 3-14: Vergleich der vollstationären Krankenhaushäufigkeiten 2019 bei den ab 65-Jährigen NRW zu ausgewählten Regionen 18

Abbildung 3-15: Anteil von vollstationären Fällen, welche in ausgewählten Regionen in 2019 von psychiatrischen Fachabteilungen erreicht wurden 19

Abbildung 3-16: Anteil der Fälle im LVR-Klinikverbund nach Hauptdiagnosegruppe und Setting 2019 19

1. Einleitung

Der Landschaftsausschuss beschloss in seiner Sitzung vom 06.12.2013:

„Die Verwaltung wird beauftragt, in 2014 eine Konzeption zur Weiterentwicklung der gerontopsychiatrischen Versorgung durch die Fachabteilungen der LVR-Kliniken vorzulegen. In dem Konzept sollten die Fragestellungen nach einer wohnortnahen, patient*innenzentrierten und sektorenübergreifenden Gestaltung der Behandlungsprozesse, nach einer Einbeziehung der Angehörigen bzw. des jeweiligen Lebensumfeldes sowie nach verbindlichen Kooperationen mit den übrigen Leistungserbringern der geriatrischen Behandlung, Rehabilitation und Pflege besonders betrachtet werden.“ (vgl. Antrag 13/268).

Am 22.11.2019 beschloss der Gesundheitsausschuss, dass die LVR-Kliniken die im Jahr 2015 vorgelegten gerontopsychiatrischen Versorgungskonzepte (vgl. Vorlage 14/591; 14/592; 14/593; 14/594) aktualisieren sollten (vgl. Antrag 14/300). Dies solle unter besonderer Berücksichtigung der anstehenden Krankenhausbedarfsplanung und der Optimierung der Vernetzung in Kooperation mit den somatischen Krankenhäusern und niedergelassenen Haus- und Fachärzt*innen der Region geschehen.

Auf Grundlage der bereits bestehenden Versorgungskonzepte der gerontopsychiatrischen Abteilungen des Klinikverbundes wurden die Konzepte von den dualen Leitungen der gerontopsychiatrischen Abteilungen und Fachbereiche somit aktualisiert. Sie beschreiben - unter Berücksichtigung des Krankenhausplans NRW - die zukünftige Planung und Ausrichtung der gerontopsychiatrischen Versorgung der LVR-Klinken.

Diese Vorlage fasst die wesentlichen Aspekte der einzelnen Versorgungskonzepte der LVR-Kliniken zusammen und stellt dabei Gemeinsamkeiten und Unterschiede heraus.

Dazu wurde zunächst die demographische Entwicklung in den Pflichtversorgungsgebieten der LVR-Kliniken untersucht. Mitberücksichtigt wurden dabei anstehende Änderungen bei den Pflichtversorgungszuständigkeiten in den Gebieten (Kapitel 2).

Anschließend wird zur Veranschaulichung des Rahmenkonzeptes die gerontopsychiatrische Versorgung im LVR-Klinikverbund genauer betrachtet. Der Fokus wird dabei auf die Angebotsstrukturen sowie die vorliegenden Krankheitsbilder und Inanspruchnahme der Angebote gelegt (Kapitel 3).

Daraus leiten sich die darauffolgenden strategischen Versorgungskonzepte ab. Neben baulichen Maßnahmen und Kooperationen wurden hier auch die Personal- und Qualifikationsstruktur und die Weiterentwicklung der Angebotsstrukturen erörtert (Kapitel 4).

Abschließend erfolgt ein Ausblick unter der Berücksichtigung der absehbaren zukünftigen Herausforderungen (Kapitel 5).

2. Pflichtversorgung und demographische Entwicklung im LVR-Klinikverbund

Die Kapitel 2.1 und 2.2 beschreiben und analysieren die Entwicklungen in den Pflichtversorgungsgebieten der LVR-Kliniken. Dies betrifft zum einen die Veränderungen in den Pflichtversorgungsregionen und zum anderen die demographische Entwicklung in den Altersgruppen. Beides zusammen betrachtet gibt Hinweise auf Herausforderungen der einzelnen Kliniken. Eine Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse findet sich in Kapitel 2.3.


2.1 Pflichtversorgungsgebiete der LVR-Kliniken

Das **P**flicht**v**ersorgungs**g**ebiet (PVG) des LVR-Klinikverbundes umfasst im Bereich der psychiatrischen Versorgung von Erwachsenen aktuell rund 3,7 Millionen Einwohner*innen (EW) ab 18 Jahren[1]. Der Anteil der älteren Erwachsenen ab 65 Jahren beträgt dabei verbundweit im Schnitt 25%.

Seit der Vorlage 14/591 gab es folgende Änderungen im Pflichtversorgungsgebiet des LVR-Klinikverbundes:

- **LVR-Klinik Bonn**: Abgabe der Bonner Stadtteile Ückesdorf, Ippendorf, Friesdorf, Godesberg-Nord, Hochkreuz, Godesberg-Villenviertel, Mehlem, Plittersdorf, und Rüngsdorf an das Universitätsklinikum Bonn (2019/2020)
- **LVR-Klinik Düren**: Abgabe der Gemeinden Herzogenrath und Würselen der Städteregion Aachen an das Universitätsklinikum Aachen (2017)
- **LVR-Klinikum Essen**: Übernahme des Essener Stadtteils Nordviertel aus dem Stadtbezirk 1 vom Philippusstift Essen (2022)

Abbildung 2-1: Pflichtversorgungsgebiet der LVR-Kliniken 2022



[1] Basierend auf Einwohnerzahlen 2021 von IT.NRW

- **LVR-Klinik Köln**: Abgabe der Kölner Stadtteile Riehl und Niehl aus dem Stadtbezirk Nippes an das St. Agatha Krankenhaus (2019)
- **LVR-Klinik Mönchengladbach und Viersen:** Wechsel der PVG-Zuständigkeit für den Norden der Stadt Mönchengladbach von der LVR-Klinik Viersen zur LVR-Klinik Mönchengladbach (2017)

Bis heute hat sich das Gesamt-PVG des Klinikverbundes damit seit 2015 um rund 3% Einwohner*innen im Erwachsenenalter verringert.

Darüber hinaus sind weitere Veränderungen im PVG der LVR-Kliniken beschlossen bzw. in Planung:

- **LVR-Klinik Bonn**: Abgabe der Stadt Troisdorf aus dem Rhein-Sieg-Kreis an die GFO-Kliniken Troisdorf ➔ Nach Umsetzung der hierfür erforderlichen Baumaßnahmen des neuen Trägers
- **LVR-Klinikum Düsseldorf**: Abgabe des Stadtbezirkes 4 der Stadt Düsseldorf an das St. Vinzenz-Krankenhaus ➔ Nach Umsetzung der hierfür erforderlichen Baumaßnahmen des neuen Trägers
- **LVR-Klinik Köln**: *Eventuelle Abgabe der Stadtteile Blumenberg, Chorweiler, Fühlingen, Merkenich, Seeberg und Worringen des Stadtbezirks Köln an das St. Agatha Krankenhaus ➔ Diese Planung des St. Agatha Krankenhauses befindet sich noch im Krankenhausplanungsverfahren und steht somit unter dem Vorbehalt eines positiven Bescheides.*

Mit Umsetzung dieser Planung verringert sich das PVG des LVR-Klinikverbundes um weitere 2%.

2.2 Demographische Entwicklung in den Pflichtversorgungsgebieten

Bereits in der Vorlage 14/591 wurde auf den bevorstehenden demographischen Wandel mit seinen Herausforderungen hingewiesen und eine entsprechende Bevölkerungsprognose dargestellt. Mittlerweile stehen dieser mehr als sechs Jahre Realentwicklung gegenüber, weshalb ein differenziertes Update dieser Prognose auf Basis der aktuellen Daten der Bevölkerungsvorausberechnung 2021 bis 2050 von IT.NRW erfolgt[2]. Dargestellt wird ein 20-Jahres-Abschnitt (2021 bis 2041).

Für den hier relevanten Betrachtungszusammenhang wurde der Ausschnitt der erwachsenen Bevölkerung ab 18 Jahren herangezogen und vorrangig in die Altersklassen *18 bis unter 65* und *ab 65* aufgeteilt. Die Altersgrenze ab 65 wird hier als Orientierung für die Altersgruppe der gerontopsychiatrischen Patient*innen herangezogen, auch wenn es z.B. im Rahmen von Lebensphasenmodellen bereits jetzt vereinzelt anders praktiziert wird oder durch die Verschiebung des Renteneintrittsalters künftig diesbezüglich Anpassungen geben kann bzw. wird.

Die Altersgruppe *ab 65* wird an einigen Stellen unterteilt, um die Entwicklung für die ab 80-Jährigen – hier bezeichnet als *Hochbetagte* – noch einmal gesondert betrachten zu können. Sie stellen die gerontopsychiatrischen Abteilungen vor besondere Herausforderungen, weil sie neben den psychiatrischen Krankheitsbildern nicht selten auch schwere oder mehrfache somatische Grund- wie auch Begleiterkrankungen mitbringen.


[2] IT.NRW: Landesdatenbank NRW Bevölkerungsvorausberechnung 2021 bis 2050

Abkürzungserläuterungen zu den nachfolgenden Diagrammen:

- **PVG-IST$_{21}$**: Aktuelles PVG (2022er PVG-Regelung) der Klinik basierend auf den Einwohnerdaten von 2021
- **PVG-Plan$_{21}$**: Planungs-PVG – also PVG nach Umsetzung geplanter PVG-Änderungen – basierend auf den Einwohnerdaten 2021
- **PVG-Plan$_{41}$**: Planungs-PVG mit den auf Basis der Bevölkerungsvorausberechnung von IT.NRW prognostizierten Daten für das Jahr 2041
- **EW-Differenz aktuell (IST$_{21}$) zu 2015**: Gibt die Differenz der PVG-Einwohner*innen im aktuellen PVG basierend auf den Einwohnerzahlen 2021 zu denen aus 2015 wieder
- **EW-Differenz Plan$_{41}$ zu IST$_{21}$**: Gibt die Differenz der PVG-Einwohner*innen für das Planungs-PVG im Jahr 2041 zu den Einwohner*innen des aktuellen PVG basierend auf den Einwohnerzahlen 2021 wieder. Im Gegensatz zur Darstellung der Bevölkerungsvorausberechnung, welche als Ausgangspunkt das Planungs-PVG zum Zeitpunkt 2021 betrachtet und nur deren Entwicklung bis 2041 berücksichtigt, wird hier gleichzeitig die Information der PVG-Änderung mitverarbeitet und die Veränderung zur IST-Situation sichtbar.
- **Prozentuale EW-Veränderung**: Prozentuale Änderung der PVG-Einwohner*innen im jeweiligen Zeitraum (2015 bis 2021 und 2021 bis 2041)

Zwischen 2015 und 2021 (sechs Jahre) ist die erwachsene Bevölkerung in NRW um 0,4% angestiegen (siehe *Abbildung 2-2*). Die Anzahl der 18 bis 64-Jährigen sank um 0,7%, während die ab 65-Jährigen um 2,8% zulegten. Gemäß IT.NRW wird von 2021 bis 2041 (20 Jahre) neuerlich ein Anstieg von nur 0,4% für die Erwachsenen vorausberechnet. Dabei soll sich die Gruppe der 18 bis unter 65-Jährigen um rund 8% verringern, während die Älteren ab 65 um rund 24% im Vergleich zum Basisjahr 2021 zulegen. Es kommt demnach zu einer Verschiebung der stärker besetzten Altersgruppe der 18- bis 64-Jährigen hin zur Altersgruppe der Älteren ab 65 Jahren. Die Gruppe der Älteren, welche in 2021 25,5% an den Erwachsenen in NRW ausmachte, wächst demzufolge auf einen Anteil von 31,4% in 2041 an. Für den LVR-Klinikverbund wurden die Daten gemäß der aktuell gültigen Pflichtversorgungsgebiete (PVG) und der Planungen bzgl. dieser Gebiete aufbereitet[3] und in unterschiedlichen Szenarien gegenübergestellt.

Abbildung 2-2: Veränderung der Altersgruppen in NRW 2015 - 2021 - 2041



[3] Für die Kreisfreien Städte liegen keine entsprechenden Vorausberechnungen für einzelne Stadtbezirke vor, so dass für die Städte, in welchen der LVR nicht für die gesamte Stadt Pflichtversorger ist (Bonn, Düsseldorf, Essen und Köln), mit Anteilen auf Basis der letzten vorliegenden differenzierten Daten aus 2018 gearbeitet wurde. Gleiches gilt für die Gemeinde Kerpen, für welche die LVR-Klinik Düren nur für einen Teil der Pflichtversorgung zuständig ist.

Abbildung 2-3: Einwohnerdifferenzen im Planungs-PVG des LVR-Klinikverbundes 2021 bis 2041; Altersgruppenanteile 2015, aktuell und 2041





*Abbildung 2-4: Einwohner*innen in den Altersgruppen im PVG IST und Plan 2021 und 2041; Differenz und anteilige Veränderung aktuell zu 2015 und 2041 zu aktuell*



Auf den Daten basierende Aussagen für den LVR-Klinikverbund:


- ⇨ Seit 2015 hat sich das PVG um 106.752 Einwohner*innen ab 18 Jahren (-3%) verringert
- ⇨ Das aktuelle PVG des Verbundes (PVG-IST$_{21}$) umfasst 3.674.571 Einwohner*innen ab 18 Jahren, davon 913.912 (25%) im Alter ab 65 Jahren
- ⇨ Mit Umsetzung aller Planungen umfasst das PVG noch 3.539.341 Erwachsene (PVG-Plan$_{21}$) und wird bis 2041 auf 3.588.561 anwachsen (PVG-Plan$_{41}$) und damit im Ergebnis 2% unter denen des aktuellen PVG (PVG-IST$_{21}$) bleiben (-86.010)
- ⇨ Für die Altersgruppe der ab 65-Jährigen reduziert sich der für das künftige PVG bis 2041 vorausberechnete Zuwachs von 225.037 Einwohner*innen bei Gegenrechnung der PVG-Verkleinerungen auf einen Zuwachs von 189.339 Einwohner*innen in dieser Altersgruppe im Planungs-PVG
- ⇨ Die Altersgruppe der ab 65-Jährigen an den Erwachsenen insgesamt (ab 18) hat sich seit 2015 bis 2021 von 24% auf 25% erhöht; für 2041 wird ein Anteil von 31% der ab 65-Jährigen im Gesamt-PVG vorausberechnet.

Die zu erwartenden Veränderungen im Planungs-PVG in 2041 im Vergleich zur aktuell gültigen PVG-Regelung auf Basis der Bevölkerungszahlen 2021 gestalten sich dabei für die einzelnen LVR-Kliniken durchaus unterschiedlich und hängen zum einen von der Region ab, zum anderen aber auch von Veränderungen bzgl. der PVG-Zuständigkeit.

Während die Veränderungen insgesamt für alle Einwohner*innen ab 18 Jahren mit einem Rückgang von 5,5% im PVG der LVR-Klinik Bonn bis hin zu einer Zunahme um 3,5% in PVG der LVR-Klinik Bedburg-Hau reicht und relativ moderat scheinen, sind die Veränderungen bei getrennter Betrachtung der Altersgruppen *unter 65* und *ab 65* deutlicher und gegenläufig zueinander (*Abbildung 2-5*).

Die LVR-Kliniken, deren PVG ausschließlich aus ländlichen Kreisen bestehen, erwarten hiernach Steigerungen von rund 28% in Düren bis hin zu 35% bis 36% in Viersen bzw. Bedburg-Hau in der Altersgruppe *ab 65*. Dagegen werden z.B. für das PVG der Kliniken Düsseldorf, Essen und Köln deutlich geringere Zunahmen in der Altersgruppe erwartet. In Bonn, Düsseldorf und Köln ist zu beachten, dass hier die Reduzierungen der Pflichtversorgungsgebiete bereits miteingerechnet ist. Die Prognose für die Einwohnerzahlen der Stadt insgesamt weichen hiervon also ab.

Abbildung 2-5: prozentuale Einwohnerveränderung in den PVG der LVR-Kliniken 2041 zu aktuell nach Altersgruppen




* *Abgabe Troisdorf*
** *Abgabe Stadtbezirk 4 Düsseldorf*
*** *Unter Vorbehalt: Abgabe einiger Stadtteile aus dem Stadtbezirk Chorweiler*

Der Zunahme in der Altersgruppe *ab 65* (GER) steht in allen Kliniken die Abnahme der Altersgruppe *unter 65* (AP/SU) gegenüber, was zu der moderaten Gesamtentwicklung führt. Die Abnahmen reichen hier von rund 6% im PVG des LVR-Klinikums Essen bis rund 15% in dem der LVR-Klinik Viersen.


Die Spanne bezüglich der Anteile der Altersgruppe ab 65 Jahren an der erwachsenen Bevölkerung insgesamt reichte in 2021 von 20% in Köln bis 27% in Langenfeld und Viersen. Unter Berücksichtigung der angenommenen Entwicklungen kann 2041 bzgl. dieser Altersgruppe von einer Spannweite von 25% in Düsseldorf und Köln bis 37% in Viersen ausgegangen werden (*Abbildung 2-7*).

Abbildung 2-7: Altersgruppenanteile in den PVG bei den Erwachsenen 2021 und 2041



Mit Blick auf die besonderen Anforderungen bzgl. der Gruppe der Hochbetagten ab 80 Jahren wurden auch diese Bevölkerungszahlen differenziert ausgewertet. Für das Planungs-PVG der LVR-Kliniken wird ab 2026 zunächst ein Rückgang der Hochbetagten im Vergleich zum Basisjahr 2021 erwartet. Ab 2030 wächst das Niveau jedoch stetig an. Die Altersgruppe 65 bis unter 80 nimmt dagegen bis 2036 kontinuierlich zu und läuft ab da der Entwicklung der Hochbetagten entgegen (*Abbildung 2-6*).

Abbildung 2-6: Einwohnerdifferenz der GER-Altersgruppen im Planungs-PVG des LVR-Klinikverbundes bis 2041



Für die Schätzung der zu erwartenden Veränderungen bis 2041, ausgehend von der aktuellen Situation, werden die 2041er Planungszahlen den 2021er IST-Zahlen gegenübergestellt (*Abbildung 2-8*). Danach wird bis 2041 verbundweit einen Anstieg von 22% in der Altersgruppe ab 65 bis unter 80 und 20% bei den Hochbetagten erwartet. Ab Mitte der 30er Jahre wird die Altersgruppe ab 65 ihren Höchstwert erreicht haben und verteilt sich ab da immer stärker hin zu den Hochbetagten. Beide Gruppen der Älteren wachsen im Vergleich zu 2021 deutlich an, doch wird ihr Verhältnis zueinander in

gerontopsychiatrischen 2041wieder dem in 2021 entsprechen. Damit verteilen sich in 2041 die Altersgruppen auf rund 68% ab 65-80 Jahre und 32% ab 80 Jahren.

Abbildung 2-8: Einwohnerentwicklung, prozentuale Veränderung und Anteile der GER-Altersgruppen aktuell, Planung und 2041





Abbildung 2-9: prozentuale Einwohnerveränderung in den PVG der LVR-Kliniken 2041 zu aktuell nach GER-Altersgruppen



* *Abgabe Troisdorf*
** *Abgabe Stadtbezirk 4 Düsseldorf*
*** *Unter Vorbehalt: Abgabe einiger Stadtteile aus dem Stadtbezirk Chorweiler*

Auch bzgl. der gerontopsychiatrischen Altersgruppen sind die prognostizierten Entwicklungen für die Planungs-PVG der einzelnen Kliniken in 2041 zum aktuellen PVG mit Daten von 2021 sehr unterschiedlich, folgen aber im Wesentlichen der oben beschriebenen Entwicklung der Gesamt-Altersgruppe ab 65 Jahren (*Abbildung 2-9*). Der rote Balken der Düsseldorfer bei den Hochbetagten begründet sich zum einen in einem relativ niedrigen Anteil der ab 65-Jährigen insgesamt in der Stadt Düsseldorf (23% in 2021, 25% in 2041) und zum anderen in der Abgabe des Stadtbezirkes 4.

2.3 Zusammenfassung

Das Pflichtversorgungsgebiet des LVR-Klinikverbundes wird sich mit Umsetzung aller beschlossener und in Planung befindlicher Änderungen um rund 2% verringern. Darin enthalten sind die Teilabgaben der Kliniken Bonn, Düsseldorf und - unter Vorbehalt - Köln. Damit verbunden ist die Verringerung der Einwohner*innenzahl von aktuell rund 3,7 Mio. (davon rund 914.000 ab 65 Jahren) auf rund 3,5 Mio. (davon rund 878.000 ab 65 Jahren) ab 18 Jahren auf Basis der Einwohnerzahlen 2021.

Für den LVR-Klinikverbund scheinen, basierend auf den Daten zur Bevölkerungsvorausberechnung bis 2041 und den in den nächsten Jahren geplanten Umsetzungen zu den Veränderungen der Pflichtversorgungsgebiete - bei Annahme unveränderter Randbedingungen[4] -, folgende Vorhersagen wahrscheinlich:

- ⇨ Der Gesamtbedarf im Fachgebiet der Psychiatrie und Psychotherapie (PP) bleibt in den nächsten 20 Jahren verbundweit relativ unverändert (-2%)
- ⇨ Ausgehend von der Annahme, dass Patient*innen ab dem 65. Lebensjahr vorrangig in der Gerontopsychiatrie (GER) behandelt werden, kann bis 2041 ein Anstieg des gerontopsychiatrischen Kapazitätsbedarfs um durchschnittlich 21% in diesen Abteilungen angenommen werden
- ⇨ Ausgehend von der Annahme, dass Patient*innen zwischen 18 und 65 Jahren vorrangig in den Abteilungen Allgemeinpsychiatrie (AP) und Abhängigkeitserkrankungen (SU)[5] behandelt werden, kann bis 2041 für diese Abteilungen ein Rückgang des AP-/SU-Kapazitätsbedarfs um rund 10% erwartet werden.
- ⇨ Ab Mitte der 2030er Jahre nehmen die Hochbetagten in den gerontopsychiatrischen Abteilungen deutlich zu.

Insgesamt bleibt hiernach der Gesamtbedarf für die Psychiatrie und Psychotherapie im Vergleich zu heute relativ unverändert. Allerdings dürften in den LVR-Kliniken bedarfsangepasste Verschiebungen oder Umstrukturierungen der Abteilungen in unterschiedlichem Ausmaß erforderlich werden, wobei die größten Veränderungen in den Kliniken mit ländlichen Versorgungsregionen zu erwarten sind. Einfluss können z.B. auch die Verschiebung des Renteneintrittsalters oder den Lebensphasen angepasste Behandlungsmodelle nehmen, welche in diesen Berechnungen nicht berücksichtigt wurden. Bis spätestens Mitte der 2030er Jahre werden sich die meisten gerontopsychiatrischen Abteilungen darüber hinaus verstärkt den besonderen Anforderungen bei der Versorgung der Hochbetagten gegenübergestellt sehen.

Es sei an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Bevölkerungsprognose nur ein Baustein des Gesamtszenarios darstellt. Abgesehen davon gibt es eine Vielzahl möglicher anderer Faktoren und regionaler Besonderheiten (z.B. in der Versorgungslandschaft), welche die Kliniken in ihren Konzepten zu anderen Einschätzungen kommen lassen kann, was ausdrücklich nicht als Widerspruch zu den hier dargestellten Szenarien gesehen wird.

---

[4] also ohne Berücksichtigung möglicher Auswirkungen alternativer Versorgungsmodelle, bei gleichbleibender Prävalenz, ohne Berücksichtigung anderer möglicher Faktoren wie stärkere Singularisierung von Haushalten, verändertes Migrationsgeschehen, etc.

[5] Die älteren Patient*innen mit einer Abhängigkeitserkrankung als Hauptdiagnose werden zum Teil unterschiedlich in der AP oder GER behandelt, machen aber bisher insgesamt nur rund 1% der Abhängigkeitserkrankten im Verbund aus und werden hier daher bzgl. einer genaueren Zuordnung vernachlässigt.


3. Die gerontopsychiatrische Versorgung im LVR-Klinikverbund

Im LVR-Klinikverbund halten alle Kliniken gerontopsychiatrische Abteilungen vor, die den Anforderungen von psychiatrischen Erkrankungen bei Menschen in höheren Lebensabschnitten gerecht werden. Die Kliniken haben dazu unterschiedliche Strukturen und Angebote etabliert. In der Folge werden die klinikspezifischen Angebotsstrukturen sowie die Inanspruchnahme abgebildet. Eine Übersicht der verschiedenen Krankheitsbilder veranschaulicht die Diversität bezüglich der Aufgabenstellung in den Abteilungen.

3.1 Angebotsstrukturen

Die LVR-Kliniken halten ihre gerontopsychiatrischen Angebote in unterschiedlichen Abteilungsstrukturen vor. Während die Kliniken in Bonn, Düren, Düsseldorf, Köln, Langenfeld und Viersen reine gerontopsychiatrische Abteilungen führen, werden die Kapazitäten der drei Kliniken mit den kleinsten Pflichtversorgungsgebieten in Bedburg-Hau, Essen und Mönchengladbach gemeinsam mit Angeboten der Allgemeinpsychiatrie geführt.

Abbildung 3-1: Übersicht der gerontopsychiatrischen Angebote der LVR-Kliniken in 2022 nach Setting und zentral/dezentral



[1] *Mischnutzung – die angegebene Kapazitäten werden nicht nur von der GER, sondern auch von anderen Subdisziplinen genutzt*
[2] *Nicht direkt am Klinikstandort, aber in unmittelbarer Nähe (Schoellerstr. Düren)*
[3] *Plätze werden integriert auf einer GER-Stationen geführt*
[4] ***Dyna**mische, **l**ebensnahe und **i**ntegrative **Ve**rsorgung (Modellvorhaben nach §64b SGB V)*
[5] ***St**ations**ä**quivalente **B**ehandlung (Versorgung nach §115d SGB V)*
[6] *Therapiezentrum Bergheim – Dependance der AP mit insgesamt 64 Betten, 24 Plätzen und Ambulanz zur Versorgung von Patient*innen der AP/GER*
[7] *Behandlungszentrum für seelische Gesundheit Leverkusen - Behandlung „junggebliebene Ältere" mit Affektiven Störungen innerhalb der AP-TK*
[8] *Ambulanz der AP, welche auch GER-Patient*innen versorgt*

Insgesamt werden im Klinikverbund aktuell 608 Betten, 233 Plätze und viele ambulante Angebote für gerontopsychiatrische Patient*innen bereitgehalten. Hiervon sind 96 Betten und 46 Plätze – im Organigramm mit „Mischnutzung" gekennzeichnet – nicht ausschließlich für die Gerontopsychiatrie vorgesehen, sondern sowohl für

allgemeinpsychiatrische als auch gerontopsychiatrische Nutzung. Zudem werden 16 Betten und 23 Plätze in AP-Abteilungen geführt.

Alle Kliniken - bis auf die LVR-Klinik Bedburg-Hau - verfügen über dezentrale Behandlungsmöglichkeiten für Patient*innen in höherem Lebensalter. Die für die LVR-Klinik Bedburg-Hau laufenden Planungen bzgl. der Dependance Geldern befindet sich noch im Verhandlungsprozess mit dem Kooperationspartner. In den Ambulanzen der Abteilung EPIII in Geldern und Kleve finden ältere Menschen aber auch jetzt schon dezentral kompetente Hilfe. Auch die Kliniken Langenfeld und Düren halten mit dem GPZ Solingen und dem Therapiezentrum Bergheim dezentrale Angebote für gerontopsychiatrische Patient*innen bereit. Diese Angebote sind organisatorisch den jeweiligen Abteilungen der AP zugeordnet.


Darüber hinaus hat sich mit DynaLIVE in der LVR-Klinik Bonn bereits ein sektorenübergreifendes Angebot erfolgreich etabliert und die LVR-Klinik Mönchengladbach führt erste gerontopsychiatrische Fälle im Rahmen stationsäquivalenter Behandlung (StäB).

Mit der Dürener Dependance in Bergheim konnte in 2017 ein neues wohnortnahes Angebot im Rhein-Erft-Kreis geschaffen werden, welches allgemeinpsychiatrische und gerontopsychiatrische Patient*innen behandelt. In der kürzlich in Betrieb genommenen Langenfelder Dependance Leverkusen wurden ebenfalls erste Überlegungen zur Entwicklung entsprechender Angebote vor Ort angestellt.

Weitere Vorhaben wie die Tagesklinik in Mettmann und die Altersmedizinischen Zentren (AMZ) in Köln und Viersen konnten bislang nicht realisiert werden, werden aber weiterverfolgt und befinden sich zum Teil in weit fortgeschrittenen Stadien der Planung/Umsetzung.

Seit 2015 haben sich in einigen Kliniken die Pflichtversorgungsgebiete, in anderen Kliniken der Abteilungszuschnitt oder die Kapazitäten verändert. Für einen Vergleich zur letzten Vorlage (Nr. 14/591) werden daher die gerontopsychiatrischen Kapazitäten pro 10.000 PVG-Einwohner*innen ab 65 Jahren dargestellt (*Abbildung 3-2*). Zudem floss die im letzten Kapitel entwickelte Prognose für die demographische Entwicklung in den künftigen PVG der Kliniken mit ein um darzustellen, wie sich das Verhältnis bei unveränderter Kapazitätszahl in 2041 darstellen würde. Die rote Linie gibt den Schnitt des Jahres 2022 im Verbund an. Sie dient nur der Orientierung bzgl. der Verhältnisse der Kliniken untereinander und ist nicht als qualitative Aussage zu verstehen.


*Abbildung 3-2: gerontopsychiatrische Betten pro 10.000 PVG-Einwohner*innen im Alter ab 65 Jahren*



Im vollstationären Bereich weisen Bedburg-Hau, aber vor allem Essen in 2022 ein hohes Betten-Einwohner-Verhältnis aus. Dies ist darauf zurückzuführen, dass in Essen alle und in Bedburg-Hau seit 2017 zwei Drittel der gerontopsychiatrischen Betten in Mischnutzung betrieben werden. Diese sind somit – anders als hier für die Rechnung angenommen – keine reinen gerontopsychiatrischen Betten, sondern werden sowohl von der Allgemeinpsychiatrie als auch der Gerontopsychiatrie genutzt.

In Düren konnten mit dem Therapiezentrum Bergheim und in Viersen mit den kürzlich in Betrieb genommenen zusätzlichen 20 Betten erste – in Viersen deutliche – Kapazitätsausweitungen in der Gerontopsychiatrie erzielt werden. Trotzdem scheinen die Kapazitäten der Kliniken Bonn, Düren und Langenfeld noch verhältnismäßig niedrig. Mit Blick auf die prognostizierte Bevölkerungsentwicklung in den Planungs-PVG kann aber auch für die Kliniken Bedburg-Hau, Mönchengladbach und Viersen perspektivisch ein vollstationärer Umverteilungsbedarf vermutet werden.

Abbildung 3-3: Anteil vollstationärer GER-Kapazitäten an den PP-Kapazitäten in 2022




Aktuell werden verbundweit rund 18% bis 21% der vollstationären Kapazitäten der Erwachsenenpsychiatrie für die gerontopsychiatrische Versorgung eingesetzt (*Abbildung 3-3*). Den höchsten Anteil erreicht seit 2022 die LVR-Klinik Viersen.

Bezüglich der vollstationären Kapazitäten werden für die Kliniken Bedburg-Hau und Langenfeld mit den Dependancen Geldern und Leverkusen noch Erweiterungen erwartet. Auch in Viersen werden sich die GER-Kapazitäten nach Umsetzung eines Altersmedizinischen Zentrums am St. Irmgardis-Krankenhaus noch etwas erhöhen.


Die Beurteilung der teilstationären Versorgungslage ist deutlich diffuser (*Abbildung 3-4*), da die tagesklinischen Angebote in dieser Altersgruppe nicht überall gleich angenommen und nur für eine kleine Gruppe der Älteren geeignet sind. In einigen Regionen gibt es tagesstrukturierende Maßnahmen oder aufsuchende Angebote anderer Anbieter, die stärker nachgefragt sind und somit den tagesklinischen Bedarf in unseren Kliniken verringern. Eine Aussage zu diesem Bedarf kann daher auf Basis dieser Daten nicht getätigt werden.

*Abbildung 3-5: gerontopsychiatrische Plätze pro 10.000 PVG-Einwohner*innen im Alter ab 65 Jahren*



Der Anteil gerontopsychiatrischer Plätze an den Tagesklinikplätzen der Erwachsenenpsychiatrie insgesamt liegt in 2022 verbundweit bei 24% bis 30% (*Abbildung 3-5*). Die vergleichsweise hohen Anteile in Bedburg-Hau und Essen sind auf die im Verhältnis kleinen Pflichtversorgungsgebiete und für Tageskliniken sinnvolle Mindestgrößen zurückzuführen. Bonn hat das größte PVG im Verbund und weist mit 14% den geringsten Anteil gerontopsychiatrischer Plätze aus.

Abbildung 3-4: Anteil teilstationärer GER-Kapazitäten an den PP-Kapazitäten in 2022




Seit 2017 haben die Kliniken Düren mit dem TZ Bergheim und der Erweiterung der Schoellerstr. und Düsseldorf mit integrierten Plätzen im DTFZ ihre tagesklinischen Kapazitäten erweitert. Der „Ausreißer" Mönchengladbach geht auf die 46 Plätze der TK Gartenstraße zurück, die zwar fast ausschließlich von der AP genutzt werden, aber prinzipiell für AP- und GER-Nutzung vorgesehen sind. Ein weiterer Ausbau der tagesklinischen Kapazitäten wird zudem perspektivisch für die Klinik Bedburg-Hau mit der Dependance Geldern und die Klinik Langenfeld mit der Dependance Leverkusen und der TK Mettmann erwartet.

3.2 Krankheitsbilder und Inanspruchnahme der Angebote

Im Folgenden wird als aktuellstes Auswertungsjahr das Jahr 2019 verwendet, da die Belegungszahlen ab 2020 durch den pandemischen Einfluss schwer interpretierbar sind.


Im Vergleich zum Auswertungsjahr 2013 der Vorlage 14/591 haben sich die Fall- (voll-, teilstationär) bzw. Patient*innenzahlen (ambulant) im LVR-Klinikverbund bis 2019 insgesamt[6] um rund 17% erhöht (*Abbildung 3-6*). Der größte Zuwachs mit 22% zeigte sich hierbei im ambulanten Bereich. Voll- und teilstationär nahmen die Leistungen um 5% und 6% im Vergleich zu 2013 zu. Der Anteil des vollstationären Leistungsgeschehens machte in 2019 rund 25%, der teilstationäre Sektor 4% und der ambulante 71% aus.

*Abbildung 3-6: Fälle/Patient*innen ab 65 Jahren in den Settings 2013 und 2019*



Die ambulanten Patient*innenzahlen im Alter ab 65 Jahren stiegen von 2013 bis 2019 kontinuierlich und deutlich an (*Abbildung 3-7*). Auch im vollstationären Bereich nahmen die Fallzahlen stetig – wenn auch in deutlich geringerem Umfang – zu. Der teilstationäre Sektor zeigt keine eindeutige Tendenz und schwankte im Betrachtungszeitraum zwischen 1.022 und 1.137 Fällen.


*Abbildung 3-7: Entwicklung der Patient*innen- bzw. Fallzahlen im Klinikverbund 2013 bis 2019*



[6] Hier wurden voll- und teilstationäre Fallzahlen mit ambulanten Patient*innenzahlen gemeinsam betrachtet. Da es im Wesentlichen um die Darstellung der Veränderung der einzelnen Settings geht, wird die methodische Unkorrektheit hier als vertretbar gewertet.


Der Anteil gerontopsychiatrischer Patient*innen an allen Ambulanzpatient*innen der Erwachsenenpsychiatrie variierten von 19% in Mönchengladbach und 32% in Düsseldorf (*Abbildung 3-8*).

*Abbildung 3-8: Anteile der ambulanten Patient*innen im Alter ab 65 in 2019*



Teilstationär waren die Unterschiede mit Mönchengladbach 3% und 35% in Langenfeld noch deutlicher (*Abbildung 3-9*). In Mönchengladbach ist diese geringe Inanspruchnahme des teilstationären Angebotes bereits in 2015 berichtet worden.


Abbildung 3-9: Anteile der teilstationären Fälle im Alter ab 65 in 2019



In Langenfeld verhält es sich etwas anders. Hier sticht der hohe gerontopsychiatrische Anteil heraus, weil tagesklinische Planungen der AP noch nicht umgesetzt werden konnten (Mettmann), bzw. bis 2019 noch nicht umgesetzt waren (Leverkusen). Die Gerontopsychiatrie ist hier also nicht überrepräsentiert, sondern die Allgemeinpsychiatrie zu diesem Zeitpunkt noch unterrepräsentiert, weshalb das Bild verzerrt wird.

Vollstationär zeichnet sich ein homogeneres Bild. Die Kliniken wiesen in 2019 Anteile von 13% in Köln bis 17% in Düsseldorf auf (*Abbildung 3-10*).


Abbildung 3-10: Anteile der vollstationären Fälle im Alter ab 65 in 2019



Wie sich die Schwerpunkte bzw. die im Vordergrund stehenden Krankheitsbilder in der Psychiatrie im Verlauf des Erwachsenenalters verändern, soll hier anhand vollstationärer Daten der Hauptdiagnosen aus 2019 für den LVR-Klinikverbund illustriert werden. Jede Farbe steht hierbei für eine Diagnosehauptgruppe nach dem ICD10-Klassifikationssystem (*Abbildung 3-11*). Auf der horizontalen Achse sind die Altersjahre abgetragen, wobei nach der 94 alle Fälle in der Gruppe *95 und älter* zusammengefasst wurden.

Während bei den unter 65-Jährigen die Affektiven Störungen (F3, grün), Schizophrenie/Psychose (F2, gelb) und vor allem die Abhängigkeitserkrankungen (F1, pink) vollstationär in den Hauptdiagnosen führend sind, verändert sich dies in den höheren Altersklassen deutlich. Die Gruppe der organischen einschließlich symptomatischen psychischen Störungen inkl. Alzheimer (F0/G30, dunkelblau) ergänzt das Spektrum zunehmend und macht ab ca. 80 Jahren bereits 50% der Hauptdiagnosen aus. Einen Großteil der anderen psychiatrischen Diagnosen machen zu diesem Zeitpunkt noch die Affektiven Störungen aus. Ab ca. 85 Jahren beläuft sich der Anteil der F0/G30 auf rund 80% aller psychiatrischer Hauptdiagnosen dieser Altersgruppe.

Abbildung 3-11: Anteil der vollstationären Fallzahlen im LVR-Klinikverbund 2019 nach Altersjahren




Mindestens bezüglich der Abhängigkeitserkrankungen ist das Bild nicht so eindeutig, wie es sich hier darstellt. Die mit dieser Hauptdiagnose erfassten Fälle im höheren Alter – meist männlich - beziehen sich fast ausschließlich auf Alkohol (F10). Sie werden in weiten Teilen in den Abteilungen für Abhängigkeitserkrankungen behandelt. Allerdings gibt es einen hohen Anteil - hier nicht erkennbarer - F1-Diagnosen in den Nebendiagnosen, die

in der Gerontopsychiatrie behandelt werden. Hier spielen z.B. auch die Medikamentenabhängigkeiten bei den Frauen eine Rolle.

Da die Verweildauern in den einzelnen Diagnosehauptgruppen sich zum Teil deutlich unterscheiden und auch die Altersklassen in Richtung der Älteren deutlich geringer besetzt sind, werden für die oben dargestellten Fälle auch die kumulierten Behandlungstage in den Altersstufen dargestellt, um die Peeks in den Altersstufen sichtbar zu machen (*Abbildung 3-12*).


Danach fielen verbundweit 2019 bei den unter 65-Jährigen die meisten Berechnungstage im Alter zwischen 52 und 56 Jahren und bei den Älteren zwischen 78 und 82 Jahren an.

Abbildung 3-12: Kumulierte Berechnungstage der vollstationären Fälle 2019 im LVR-Klinikverbund nach Altersjahren



Für die weitere Betrachtung wird sich im Folgenden auf die in der Gerontopsychiatrie in den Hauptdiagnosen führenden Diagnosegruppen beschränkt.

Abbildung 3-13: Krankenhausstatistik NRW 2019 - vollstationäre Belegungstage ab 65 Jahren nach Diagnosehauptgruppen



Die Krankenhausstatistik NRW 2019 weist für die vollstationären Fälle mit Herkunft aus NRW und F0/G30, F1, F2, F3 oder F4 als Hauptdiagnose in der Altersklasse ab 65 Jahren rund 1,1 Mio. Belegungstage (51.110 Fälle) aus, die zu 84% von psychiatrischen Fachabteilungen geleistet wurden (*Abbildung 3-13*). Rund 80% der gesamten Belegungstage entfielen in dieser Altersgruppe auf die *organischen, einschließlich symptomatischen psychischen Störungen inkl. Alzheimer* (F0/G30) und die *Affektiven Störungen* (F3). Weitere 10% auf die *Schizophrenien, schizotypen und wahnhaften Störungen* (F2) und je 5% auf die *psychischen oder Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen* (F1) und die *neurotischen, Belastungs- und somatoformen Störungen* (F4).


NRW-weit werden dabei in dieser Altersgruppe 98% der Schizophrenien/Psychosen und 93% der Affektiven Störungen von psychiatrischen Fachabteilungen erreicht. Bei einem

Teil der F3- und bei vielen der F4-Diagnosen handelt es sich um Krankheitsbilder, die klassischerweise der Psychosomatischen Medizin zuzuordnen sind, weshalb diese Fachabteilung hier ebenfalls sichtbar wird. Besonders Patient*innen mit einer F4-Hautpdiagnose – zu denen auch die somatoformen Störungen (F45) gehören[7] - haben dabei häufig einen langen Leidensweg hinter sich, bevor sie den Weg in eine psychiatrische oder psychosomatische Fachabteilung finden, weshalb sich hier hohe Anteile verschiedenster Fachabteilungen und eine noch viel buntere Mischung unter den 21% der *Sonstigen* wiederfinden.

Bei den organischen Störungen (F0/G30) treten mit zunehmendem Alter somatische Komorbiditäten in den Vordergrund, weshalb sich diese auch in neurologischen, geriatrischen und Abteilungen für Innere Medizin wiederfinden. Letzteres gilt ebenfalls für die Abhängigkeitserkrankungen (F1), wo es z.B. nach jahrelangem Konsum von Alkohol zu verschiedenen somatischen Folgeerkrankungen kommen kann.

Für die vollstationären Fälle mit Hauptdiagnosen F0/G30, F1, F2, F3 und F4 wurden auf Basis der Krankenhausstatistik 2019 insgesamt die Krankenhaushäufigkeiten (KHH) – das heißt, Fälle pro 100.000 Einwohnerinnen der hier relevanten Altersgruppe ab 65 Jahre, – für einzelne Kreise und kreisfreie Städte berechnet und mit den entsprechenden Zahlen für ganz NRW verglichen *(Abbildung 3-14*).

Abbildung 3-14: Vergleich der vollstationären Krankenhaushäufigkeiten 2019 bei den ab 65-Jährigen NRW zu ausgewählten Regionen




In Grau sind die Häufigkeiten - ungeachtet dessen, in welcher Fachabteilung die Fälle mit Herkunft aus der jeweiligen Region gezählt wurden, – dargestellt. Die gestrichelte graue Linie zeigt dabei den Durchschnittswert für ganz NRW. Danach gibt es Regionen wie die Kreise Kleve, Düren oder Mettmann und die Städte Düsseldorf und Essen, die, bezogen auf die Einwohner*innen und Altersgruppe ab 65, verhältnismäßig viele Fälle zählen, aber auch solche, die deutlich unter dem NRW-Schnitt liegen, wie z.B. der Rhein-Sieg- und der Rhein-Erft-Kreis. Die Unterschiede hierfür können vielfältig sein und lassen sich auf Basis dieser Zahlen allein nicht aufklären. Sie können ein Hinweis auf eine tatsächliche Unterversorgung in dem Gebiet, aber auch auf gut ausgebaute ambulante, aufsuchende Angebote und andere Hilfen in diesen Regionen hindeuten, die einen vollstationären

[7] Von den gesamten F4-Belegungstagen der betrachteten Altersgruppe entfielen 53% auf die somatoformen Störungen, aber nur 8% der F45-Belegungstage wurden in einer psychosomatischen Fachabteilung erbracht.

Aufenthalt ggfs. ersetzen können. Auch unterschiedliche Kodiergewohnheiten könnten hier die Statistik beeinflussen.


Die blauen Balken geben die Häufigkeit an, mit welcher diese Patient*innengruppe aus der jeweiligen Region in 2019 vollstationär in einer psychiatrischen Fachabteilung behandelt wurden, die gestrichelte blaue Linie wieder den Landesschnitt.

Abbildung 3-15: Anteil von vollstationären Fällen, welche in ausgewählten Regionen in 2019 von psychiatrischen Fachabteilungen erreicht wurden



Aussagekräftiger als die Höhe der grauen Balken an sich scheinen die Abstände der grauen zu den blauen Balken. Der Quotient aus den Werten der blauen und grauen Balken gibt die Wahrscheinlichkeit an, mit der ein Fall in einer psychiatrischen Fachabteilung versorgt wurde, und somit einen Hinweis darauf, wie gut diese Fälle von den psychiatrischen Fachabteilungen erreicht werden (*Abbildung 3-15*). Dass dieser Quotient niedriger ausfällt als bei den Belegungstagen weiter oben, liegt daran, dass diese zum Teil nur einen oder wenige Tage in einer fachfremden Fachabteilung verbleiben – sich bei den Berechnungstagen weiter oben also nur wenig auswirken - und dann später möglicherweise in eine psychiatrische Fachabteilung verlegt werden.

Abbildung 3-16: Anteil der Fälle im LVR-Klinikverbund nach Hauptdiagnosegruppe und Setting 2019



Die Wahrscheinlichkeiten lagen in 2019 für die meisten Regionen, in denen die LVR-Kliniken tätig sind, nah am Landesschnitt von 65%. Überdurchschnittlich hoch wurden Patient*innen aus Düsseldorf, Mönchengladbach, den Kreisen Mettmann und Viersen erreicht, die Fälle mit Herkunft aus der Stadt Essen dagegen deutlich weniger. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich in Essen für die in dieser Altersgruppe dominierende Hauptdiagnose F0/G30 ein Anteil von rund 40% der Fälle in geriatrischen Fachabteilungen.

Während sich im ambulanten Bereich eine ähnliche Verteilung des Diagnosespektrums findet, zeigt sich im teilstationären Sektor ein ähnliches Bild wie im Bereich der Allgemeinpsychiatrie (*Abbildung 3-16*). Die F3-Diagnosen sind hier die führenden Diagnosen. In Teilen lassen sich bei den Älteren auch noch Fälle der F0/G30 mit minderschweren Ausprägungen führen.

4. Strategische Versorgungskonzepte der gerontopsychiatrischen Abteilungen der LVR-Kliniken

Die bisher definierten Zieldimensionen (s. Vorlage 14/591) zur Weiterentwicklung der gerontopsychiatrischen Versorgung bilden den gemeinsamen Rahmen für die klinikspezifischen, strategischen Versorgungskonzepte.

Dabei zeichnet sich seit 2015 ein Spektrum an folgenden klinikinternen - wie übergreifenden Entwicklungen in inhaltlichen Schwerpunktsetzungen - Vorgehensweisen und Maßnahmen ab.

4.1 Realisierte Baumaßnahmen und bauliche Standardverbesserungen

In der Folge werden Baumaßnahmen sowie die damit einhergehenden baulichen Standardverbesserungen, welche in den letzten fünf Jahre realisiert wurden, dargestellt.

Verbesserung der **räumlichen Ausstattungen und baulichen Bedingungen** im Hinblick auf Barrierefreiheit, Komfort der Zimmer (Zweibettzimmer-Standard), Sanitärausstattung, "Bewegungsparcours", etc.:

- **Bedburg-Hau:** Im Jahr 2020 wurde ein Neubau bezogen, in dem die ambulanten, teilstationären und stationären gerontopsychiatrischen Behandlungsangebote „unter einem Dach" in einem gerontopsychiatrischen Zentrum bzw. in Kooperation mit der Abteilung Neurologie zu einem Zentrum zusammengeführt wurden.
- **Düsseldorf**: Die Gerontopsychiatrische Abteilung ist im Juni 2021 mit allen vier Stationen in den Klinikneubau, das Diagnose-Therapie-und Forschungszentrum, eingezogen.
- **Mönchengladbach:** Der Umbau des Altbaus (Haus B) wurde genutzt, um auch die Raumstrukturen der Station für die Behandlung von Menschen mit dementiellen Erkrankungen speziell an deren Bedürfnissen auszurichten. Dies erfolgte im Rahmen der Umbauplanung von Haus B in den Jahren 2015 – 2017. Die Station wurde zunächst im Frühjahr 2017 eröffnet. Aufgrund eines Wasserschadens, der sich kurz nach der Sanierung ereignete, musste das Haus freigezogen werden. Hierfür wurden drei Stationen nach Viersen verlagert. Das Haus kann voraussichtlich 2023 wieder in Betrieb genommen werden.
- **Viersen**: Im Juni 2022 wurde eine dritte offen geführte Gerontopsychiatrische Station eröffnet. Darüber hinaus sind die Station G1 und G2 von Haus 13 in den Neubau Haus 12 gezogen.

Verbesserung der wohnortnahen Behandlung durch die weitere Dezentralisierung der Angebote - **Aufbau von Dependancen und dezentralen Tageskliniken** in den Versorgungsgebieten:

- **Düren**: 2017 wurde in der Stadt Düren nahe dem Klinikstandort und dem Krankenhaus Düren gelegen in Zusammenarbeit mit dem rheinischen Blindenfürsorgeverein ein Zentrum für Altersmedizin, genannt „Therapiezentrum Schoellerstraße", eröffnet (vgl. Vorlage 14/215), welches die Gerontopsychiatrische Tageklinik sowie die Gerontopsychiatrische Ambulanz beherbergt. In der Tagesklinik können nun 20 Patient*innen behandelt werden (Steigerung um zehn Behandlungsplätze). Die Gerontopsychiatrische Ambulanz ist ebenfalls in diesen Neubau gezogen. Im selben Jahr wurde das Therapiezentrum in Bergheim mit 64 Betten und 24 tagesklinischen Plätzen zur Behandlung von allgemeinpsychiatrischen und gerontopsychiatrischen Patient*innen eröffnet.

- **Langenfeld**: 2019 ist das tagesklinische Angebot der gerontopsychiatrischen Abteilungen der LVR-Klinik Langenfeld sowie der gerontopsychiatrischen Ambulanz von der Kreuzstraße in einen Neubau in der Langenfelder Innenstadt (Lessingsstraße) gezogen.

4.2 Vernetzung und Kooperation im Sinne einer ganzheitlichen Patient*innenversorgung

Verbesserung der patient*innenzentrierten, integrierten Behandlung: Enge Verzahnung der Fachdisziplinen Neurologie, Innere Medizin, Geriatrie und Gerontopsychiatrie durch die **Einrichtung von Altersmedizinischen Zentren** in Kooperation mit somatischen Krankenhäuser.

In der LVR-Klinik in **Düren** wird im Rahmen des Projektes „Zentrum für Altersmedizin" eine disziplinenübergreifende Versorgung angeboten.

Im Rahmen der Behandlung im Gerontopsychiatrischen Zentrum des LVR-Klinikums **Essen** erfolgt eine Optimierung der Behandlungsprozesse durch direkte Kontaktaufnahme der Haupt-Behandler*innen mit den anderen Einrichtungen. Die Behandlung ist insofern übergreifend, als dass die Sektoren ambulant versus tagesklinisch versus stationär oder aber auch die Grenzen zwischen Fachdisziplinen oder Regionen überbrückt werden.

Die Kooperationsbemühungen der gerontopsychiatrischen Abteilung der LVR-Klinik **Köln** mit der Uni-Klinik Köln sowie den städtischen Kliniken Köln, mit dem Ziel, gemeinsam ein Zentrum für Altersmedizin zu etablieren, waren bislang nicht erfolgreich.

In der LVR-Klinik **Viersen** ist nach wie vor ein AMZ in Kooperation mit dem St. Irmgardis-Krankenhaus in Viersen-Süchteln für ältere Patient*innen in Planung.

Die enge Verzahnung der Fachdisziplinen Neurologie, Innere Medizin, Geriatrie und Gerontopsychiatrie durch **Konsiliar- und Liaisondienste** über spezielle Kooperationsvereinbarungen mit somatischen Krankenhäusern besteht nach wie vor in Bedburg-Hau, Bonn, Düren, Essen, Köln, Langenfeld und Viersen.

Die **sektorenübergreifenden Behandlungsangebote (einschließlich dezentraler Angebote)**, welche sich nach den Bedürfnissen der Patient*innen ausrichten, werden kontinuierlich optimiert. Nach wie vor wird eine noch intensivere Vernetzung in der Gerontopsychiatrie zwischen vollstationärer, tagesklinischer und ambulanter Behandlung nötig sein und weiterhin von allen Klinikstandorten angestrebt.

Ausbau der **ambulanten Leistungen durch die Institutsambulanzen**, insbesondere aufgrund steigender Nachfrage durch Heim- und Pflegeeinrichtungen, die sich an der Lebenswirklichkeit vor Ort orientiert:

In der LVR-Klinik **Bonn** verfolgt die zielorientierte, an den Bedürfnissen der gerontopsychiatrischen Patient*innen ausgerichtete Behandlung den Grundsatz, die jeweils betroffenen Patient*innen in ihrer Lebenswirklichkeit vor Ort zu erreichen und die jeweilig spezifischen Behandlungsbedürfnisse dann vor Ort, also ambulant, zu realisieren. Dies bedeutet konkret, dass der Idealfall die ambulante Versorgung vor Ort zu Hause in Behandlungskontinuität ermöglicht. In Bezug auf eine an den Patient*innen ausgerichtete Behandlung werden in Bonn auch für die gerontopsychiatrischen Patient*innen **DynaLIVE**-Plätze (vgl. Vorlage 15/281) vorgehalten, welche auch einen aufsuchenden Anteil in der Behandlung vorsehen.

Im LVR-Klinikum **Essen** besteht ein umfangreiches Angebot mit altersspezifischen Spezialambulanzen (Sucht im Alter, Depression im Alter, Zentrum für therapieresistente

Depressionen). Patient*innen, die in Pflegeeinrichtungen leben, werden in den Einrichtungen vor Ort fachpsychiatrisch behandelt.

Auch die gerontopsychiatrische Abteilung der LVR-Klinik in **Mönchengladbach** hat erste Erfahrungen mit aufsuchenden Behandlungsangeboten gemacht. So wurde das Angebot von **StäB** (Stationsäquivalente Behandlung) im geringen Umfang etabliert. Das StäB-Team ist in der Ambulanz angesiedelt und behandelt und versorgt die Patient*innen sowohl zuhause in der eigenen Wohnung als auch in Wohnheimen.

Um eine ganzheitliche Behandlung anzubieten und als relevanter Anbieter in der Region sichtbar zu sein, ist eine entsprechende regionale Vernetzung und der Ausbau **externer Kooperationen** unumgänglich. So sind alle gerontopsychiatrischen Abteilungen in ein regionales Netzwerk eingebettet, welches sich an den Strukturen und Erfordernissen der jeweiligen Kliniken orientiert und je nach Anforderung kontinuierlich angepasst und erweitert wird.

4.3 Personal- und Qualifikationsstruktur

Zukünftig nehmen Strategien zur Personalgewinnung und –entwicklung einen noch höheren Stellenwert ein. Dies geschieht vor dem Hintergrund der zunehmenden Komplexität im Gesundheitswesen sowie dem demographischen Wandel und dem damit einhergehenden Fachkräftemangel.

Im Pflegedienst werden unterschiedliche Qualifikationen vorgehalten, um den unterschiedlichen Aufgaben in Bezug auf die Kernprozesse gerecht zu werden. So werden überwiegend Gesundheits- und Krankenpflegekräfte eingesetzt. Ein weiterer großer Anteil in den gerontopsychiatrischen Abteilungen stellen Altenpflegekräfte dar. Darauf folgt unterstützendes Personal, wie z.B. Krankenpflegehelfer*innen und Pflegehelfer*innen, mit einem eher geringeren Anteil.

Insgesamt erlangen interdisziplinäre Schulungs- und Fortbildungsangebote für Mitarbeitende an Bedeutung. Dies gerade in Bezug auf Fortbildungsmaßnahmen, die alle Professionen in den Behandlungsteams betrifft, wie z.B. das Thema der Gewaltvermeidung, der Milieugestaltung oder der fachlich-inhaltlichen Ausrichtung der zukünftigen therapeutischen Arbeit in den Organisationseinheiten im Rahmen von Klausurtagungen. I.d.R. haben alle pflegerischen Stationsleitungen eine entsprechende Qualifizierungsmaßnahme durchlaufen, um den Erwartungen, die an eine Stationsleitung gestellt werden, zu entsprechen. Darüber hinaus werden in den Abteilungen Mitarbeitende aus dem Pflege- und Erziehungsdienst beschäftigt, welche eine Zusatzqualifikation als Praxisanleiter*in erworben haben. Somit werden die gesetzlichen Anforderungen zur praktischen Anleitung von Pflegefachkräften, die sich in Ausbildung befinden, erfüllt.

Schulungsmaßnahmen, in welchen Know-how zur Deeskalation vermittelt werden, gehören in den LVR-Kliniken zur Basis-Qualifizierung. In einigen gerontopsychiatrischen Organisationseinheiten arbeiten Mitarbeitende im Pflege- und Erziehungsdienst, die eine entsprechende Qualifikation als Deeskalationstrainer*innen erworben haben. Weitere Zusatzqualifikationen beziehen sich auf die Umsetzung der Nationalen Expertenstandards (Deutsches Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege, DNQP), wie z.B. die Weiterbildung zur/zum Wundmanager*in, Stomatherapeut*in oder Pain-Nurse. Weitere Qualifikationsmaßnahmen beziehen sich auf Themenfelder wie Hygiene, Pflegetrainer*innen (Familie-Pflege) und unterschiedliche therapeutische Maßnahmen wie

Gruppenangebote (wie z.B. Ohrakupunktur, Kinästhetik, progressive Muskelentspannung, Aromatherapie).

Darüber hinaus werden in den gerontopsychiatrischen Fachabteilungen ebenfalls Pflegekräfte eingesetzt, welche die Fachweiterbildung (Altenpflege und Rehabilitation) absolviert haben. Seit vielen Jahren setzt sich der LVR zudem für den Einsatz von akademisierten Pflegefachkräften in der direkten Patient*innenversorgung ein, sodass in den gerontopsychiatrischen Abteilungen auch Pflegefachkräfte mit entsprechenden Hochschulabschlüssen (u.a. B.A. of Nursing, B.A. Psychiatrische Pflege, B.A. Pflegewissenschaften) zum Einsatz kommen.

Im medizinischen Bereich kommen Fachärzt*innen mit unterschiedlichen Schwerpunkten zum Einsatz (Psychiatrie und Psychotherapie, Neurologie, Geriatrie). An einigen Standorten sind die Abteilungen auch Teil eines Lehrkrankenhauses mit unterschiedlichen fachlichen Gewichtungen. Daher befinden sich dort Ärzt*innen in einer entsprechenden Weiterbildung (z.T. einhergehend mit einer Rotation durch die unterschiedlichen Fachabteilungen der jeweiligen Kliniken). Vereinzelt werden darüber hinaus geringe Stellenanteile von Internist*innen in den gerontopsychiatrischen Abteilungen vorgehalten.

Weitere Berufsgruppen, die in den gerontopsychiatrischen Fachabteilungen zum Einsatz kommen sind:

- Diplom-Psycholog*innen
- Psychologische Psychotherapeut*innen
- Heilpädagog*innen
- Sozialarbeiter*innen
- Bewegungstherapeut*innen
- Physiotherapeut*innen
- Sportlehrer*innen
- Ergotherapeut*innen
- Kunsttherapeut*innen
- Med. Bademeister*innen
- Arzthelfer*innen / Medizinische Fachangestellte
- Gymnastik- und Tanzpädagog*innen
- Musiktherapeut*innen

Zur gemeinsamen berufsgruppenübergreifenden Weiterbildung, Qualifizierung wie auch Stärkung der Zusammenarbeit werden verbundweit Tagungsveranstaltungen für komplementäre Kooperationspartner und niedergelassene Ärzt*innen angeboten.

Zusammenfassend wird in allen Abteilungen der gerontopsychiatrischen Versorgung im LVR-Klinikverbund das Personal als eine wichtige und besondere Ressource gesehen und behandelt. Den Führungskräften ist diese besondere Verantwortung bewusst. So werden im Rahmen von Mitarbeitendengesprächen individuelle Potenziale und Ressourcen ermittelt, die eine Grundlage darstellen für eine individuelle Personalförderung. Dies vor dem Hintergrund der Qualitätssicherung im Rahmen der Patient*innenversorgung sowie der Personalbindung und -gewinnung.

4.4 Weiterentwicklung der Angebotsstrukturen (Behandlungsangebote)

In den letzten Jahren stellten die Pandemie und vereinzelt auch die Folgen der Flutkatastrophe (2021) für die Kliniken eine besondere Herausforderung dar. Vor dem Hintergrund der gültigen Verfügungen und den daraus abgeleiteten Maßnahmen zur

Sicherstellung der Eindämmung des COVID-19-Virus waren die Kliniken und deren Mitarbeitende, im Sinne einer weiterhin qualitativ hochwertigen Patient*innenversorgung, täglich vor Herausforderungen gestellt. Diese bezogen sich auf die erschwerte Durchführung von Therapieangeboten unter Pandemiebedingungen und auf die Personalausfälle, die durch Quarantänebestimmungen unumgänglich waren. So lag der Fokus überwiegend auf der Aufrechterhaltung der bisherigen Angebotsstrukturen. Vereinzelt konnten Angebote vor dem Hintergrund der jeweils geltenden Verfügung oder aufgrund von Personaleinbrüchen nicht mehr sichergestellt werden. Erhebliche Beeinträchtigungen hat die Angehörigenarbeit erfahren. Bedingt durch die teils extrem restriktiven Besucherregelungen im Rahmen der Pandemie konnten Besuche von Patient*innen durch ihre Angehörigen in den Kliniken kaum noch stattfinden. Aktuell sind die verantwortlichen Klinikmitarbeitenden bemüht, die vor der Pandemie bestehenden Angebotsstrukturen zu reaktivieren, um gezielt das soziale System der Patient*innen wieder vermehrt zu fördern und zu stärken. Die Entwicklung der therapeutischen Angebotsstruktur ist den Einzelvorlagen zu entnehmen.

Um den Ansprüchen einer Qualitätsweiterentwicklung gerecht zu werden, wurden vom IFuB (Sparte Forschung) in enger Abstimmung mit den Vertreter*innen der Kliniken Qualitätsindikatoren (QI) identifiziert, welche als Kriterium herangezogen werden, um eine Überprüfung der Entwicklung in der Praxis zu ermöglichen.
Im Sinne der Förderung der Patient*innensicherheit wurde das Risikomanagement in den Kliniken kontinuierlich weiterentwickelt. Darüber hinaus profitieren die gerontopsychiatrischen Abteilungen auch von dem klinikübergreifenden Arbeitskreis Gewalt- und Suizidprävention, der zwei Mal im Jahr zusammenkommt und in verschiedenen Unterarbeitsgruppen ganzjährig Instrumente, Leitlinien und Standards für den klinischen Kontext (fachübergreifend) gemeinsam mit den Vertreter*innen aus den LVR-Kliniken entwickelt und fortlaufend aktualisiert.

5. Ausblick

Mit der Krankenhausplanung NRW 2015 erfuhr die Disziplin der Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatische Medizin (PPPM) eine – zum Teil deutliche – Erweiterung der stationären Kapazitäten. Viele Kliniken, denen zusätzliche Kapazitäten zugesprochen wurden, konnten diese bis heute aber noch nicht oder nur in Teilen umsetzen, weil z.B. keine geeigneten Grundstücke oder Räumlichkeiten gefunden werden konnten, die Finanzierung nicht geklärt werden konnte oder es mit Blick auf Kooperationsprojekte an Planungssicherheit bei den Akteur*innen fehlte. Auch die LVR-Kliniken sind von diesen Entwicklungen betroffen. Für die Gerontopsychiatrie sind hier zum Beispiel die Dependance Geldern, die Tagesklinik Mettmann und die Altersmedizinischen Zentren in Köln und Viersen zu nennen.

Das MAGS kommt zudem im neuen Krankenhausplan NRW 2022 – auf Basis der im Vorfeld durchgeführten Analysen und dem daraus erstellten Gutachten - zu dem Ergebnis, dass der Leistungsbereich PPPM mit der Umsetzung der in den regionalen Planungsverfahren 2015 genehmigten Kapazitäten gut für die Zukunft aufgestellt sei. Ausbaubedarf wird allenfalls für bestimmte Regionen im teilstationären Sektor gesehen und generell bezüglich alternativer Behandlungsformen wie z.B. der **St**ations**ä**quivalenten **B**ehandlung (StäB). Hierbei blockieren die hohen strukturellen Anforderungen der Krankenkassen in der Umsetzung der StäB eine verbundweite Ausdehnung des Angebotes. Beispielhaft genannt sei hier die Kontinuität von Erreichbarkeit, auch des

ärztlichen Dienstes, sowie die Tatsache, dass die Quote der Prüfungen durch den MD weitaus höher als in der herkömmlichen stationären Behandlung ausfällt.

Es bedarf daher neben der StäB der Betrachtung aller strategischer Konzepte alternativer Behandlungsmodelle, wie beispielsweise der Integrierten Versorgung nach § 140 SGB V sowie der modellhaften Versorgung nach § 64 b SGB V oder aufsuchender Behandlungsformen aus den Institutsambulanzen heraus. Jede dieser Versorgungsformen wird beispielhaft in der Erwachsenenpsychiatrie bzw. Kinder-und Jugendpsychiatrie in einer der LVR-Kliniken erprobt bzw. angewandt (s. Vorlage 15/281 für die Krankenhausausschüsse und den Gesundheitsausschuss im Juni 2021). Die Anwendbarkeit dieser alternativen Behandlungsmodelle auf die Bedürfnisse der Patient*innen der Gerontopsychiatrie wären im Zuge einer konzeptionellen Weiterentwicklung mit zu berücksichtigen.

Bezüglich der vollstationären Kapazitäten teilt die Verwaltung – basierend auf der Untersuchung zu den Pflichtversorgungsgebieten - die Einschätzungen des MAGS, dass die Gesamtkapazitäten der PPPM für die künftige Versorgung der Erwachsenen insgesamt auskömmlich sein sollte. Immer vorausgesetzt, alle noch nicht realisierten SOLL-Kapazitäten können perspektivisch in Betrieb genommen werden. Der stationäre Erweiterungsbedarf in der Gerontopsychiatrie müsste sich demnach durch interne Anpassungen/Verschiebung von Kapazitäten auffangen lassen. Da die demographische Entwicklung nur ein Faktor ist, kann es regionale Besonderheiten – zum Beispiel in der Versorgerstruktur – geben, die in der Gesamtbetrachtung an einzelnen Standorten zu abweichenden Ergebnissen führen.

Weitere zukünftige Herausforderungen werden in folgenden Bereichen gesehen:

- **Anwachsen der Altersgruppe der Hochbetagten:** Mit Anwachsen dieser Altersgruppe wächst die Gruppe derer, welche mit einem deutlich erhöhten Pflegebedarf – basierend auf zum Teil schweren somatischen Begleiterkrankungen - in die gerontopsychiatrischen Abteilungen kommen, was den Ausbau bzw. die Entwicklung von altersmedizinischen Kooperationen umso wichtiger erscheinen lässt.
- **Personalgewinnung sowie –bindung**, um die qualitativ hochwertige Behandlung sowohl aufrecht zu halten als auch im Rahmen der Qualitätsentwicklung weiter auszubauen. Hierbei müssen die Maßstäbe, die sich aus der PPP-RL ableiten, berücksichtigt werden. Weiter stellt die Konzentration von psychisch schwer und multimorbid erkrankten Patient*innen in der stationären Behandlung durch Zuweisungen insbesondere aus somatischen und geriatrischen Krankenhäusern sowie Pflegeeinrichtungen eine besondere und komplexe Aufgabe dar.
- Die **Angehörigenarbeit** ist in den LVR-Kliniken bereits seit vielen Jahren etabliert. Zuletzt haben die pandemischen Bedingungen (COVID 19) diesen Versorgungsbereich erheblich beeinträchtigt. Mit den zunehmenden Erfahrungen, einer generellen Erhöhung der Impfquote in der Allgemeinbevölkerung und den damit einhergehenden Prozessanpassungen im klinischen Kontext wird nun das Angebot für Angehörige wieder zunehmend ausgeweitet. Standortbezogen sind vereinzelt auch die Nachwirkungen der Flut im Ahrtal als relevante Einflussfaktoren zu berücksichtigen. Dennoch ist die Bedeutung der Angehörigenarbeit in den Kliniken bekannt, weshalb diese Angebote wieder stabilisiert und darüber hinaus noch stärker auf die Bedürfnisse der Zielgruppe ausgerichtet werden.
- Weitere **Vernetzung**, sowohl intern als auch extern, zur Sicherstellung einer ganzheitlichen Behandlung von Patient*innen und deren Angehörigen. Kooperationen

mit externen Leitungserbringern stellen hierbei u. a. auch eine Grundlage für weitere Planungsvorhaben dar.

- **Entwicklung bzw. Ausbau trialogischer Kommunikationsstrukturen**: Zur Überwindung von Systemgrenzen und zur Stärkung von Bedürfnisorientierung und Personenzentrierung bedarf es gelingender Kommunikation und Verständigung zwischen Menschen mit Psychiatrieerfahrung, Angehörigen, professionellen und ehrenamtlichen Helfer*innen.
- **Inklusion, Barrierefreiheit, Sozialraumorientierung**: Entsprechend der Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention muss die Versorgungsstruktur barrierefrei zugänglich sein. Die Ausgestaltung der Hilfen soll den betroffenen Menschen ein eigenständiges und selbstbestimmtes Leben in ihren gewohnten sozialen Bezügen erlauben.
- Ausbau von **ambulanten und neuen aufsuchenden Behandlungsformen**, welche sich an den Bedürfnissen der Patient*innen und deren Angehörigen orientiert. In der gerontopsychiatrischen Krankenhausbehandlung sind vorrangig Ansätze des Home-Treatment (s.o. StäB, IV-Modelle) und in den Psychiatrischen Institutsambulanzen aufsuchende Behandlungs- und Pflegeangebote zu entwickeln.

Die gerontopsychiatrischen Abteilungen der LVR-Kliniken verfügen bereits über ein breites, auf die Bedürfnisse von gerontopsychiatrischen Patient*innen zugeschnittenes Versorgungsangebot sowie darüberhinausgehende Entwicklungsideen und konkrete Planungen, um den künftigen Herausforderungen gerecht zu werden. Diese werden in den einzelnen strategischen Versorgungskonzepten der Kliniken den jeweiligen Krankenhausausschüssen Ende 2022 vorgestellt und bieten die Basis für die weitere Entwicklung des Bereichs. Eine erfolgreiche Weiterentwicklung der Angebote setzt jedoch voraus, dass bestimmte Rahmenbedingungen gegeben sind und Ressourcen zur Verfügung stehen. Hier ist insbesondere die erfolgreiche Rekrutierung von qualifiziertem Personal zu nennen, um das sich der LVR bereits intensiv bemüht. Außerdem ist von den Kostenträgern eine stärkere Unterstützung bei der Umsetzung von ambulanten und stationsersetzenden Behandlungsangeboten einzufordern.

Abkürzungsverzeichnis

AMZ	Altersmedizinisches Zentrum
AP	Allgemeinpsychiatrie
DTFZ	Diagnose-, Therapie- und Forschungszentrum
DynaLIVE	Dynamische, lebensnahe und integrative Versorgung
EW	Einwohner*innen
GER	Gerontopsychiatrie
IT.NRW	Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen
KHH	Krankenhaushäufigkeit (Fälle/100.000 Einwohner)
PM	Psychosomatische Medizin
PP	Psychiatrie und Psychotherapie (Gesamtheit der Erwachsenenpsychiatrie, welche Allgemeinpsychiatrie, Gerontopsychiatrie und Abhängigkeitserkrankungen umfasst)
PPPM	Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatische Medizin (umfasst PP und PM)
PVG	Pflichtversorgungsgebiet
PVG-IST$_{21}$	Pflichtversorgungsgebiet nach aktuell gültiger Regelung auf Basis der Einwohnerzahlen von 2021
PVG-Plan$_{21}$	künftiges Pflichtversorgungsgebiet – Planungs-PVG – auf Basis der Einwohnerzahlen von 2021
PVG-Plan$_{41}$	künftiges Pflichtversorgungsgebiet – Planungs-PVG – auf Basis der für 2041 prognostizierten Einwohnerzahlen
StäB	Stationsäquivalente Behandlung
SU	Abhängigkeitserkrankungen
TK	Tagesklinik
TZ	Therapiezentrum

Die Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland

Qualität für Menschen

Vorlage Nr. 15/1130

öffentlich

Datum: 22.08.2022
Dienststelle: Fachbereich 84
Bearbeitung: Frau Schröder

Krankenhausausschuss 3	**05.09.2022**	**Kenntnis**
Krankenhausausschuss 2	**06.09.2022**	**Kenntnis**
Krankenhausausschuss 4	**07.09.2022**	**Kenntnis**
Krankenhausausschuss 1	**08.09.2022**	**Kenntnis**
Gesundheitsausschuss	**09.09.2022**	**Kenntnis**

Tagesordnungspunkt:

Fachliche Weiterentwicklung, Ausbau und Umsetzung der Versorgungsangebote im Bereich der Psychosomatischen Medizin und Psychotherapie im LVR-Klinikverbund: das Zentrum für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie Viersen-Mönchengladbach

Kenntnisnahme:

Der Sachstand gemäß Vorlage Nr. 15/1130 wird zur Kenntnis genommen.

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.	ja

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2025.	ja

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):

Produktgruppe:	
Erträge: Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan	Aufwendungen: /Wirtschaftsplan
Einzahlungen: Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:	Auszahlungen: /Wirtschaftsplan
Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:	
Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten	

In Vertretung

W e n z e l - J a n k o w s k i

Zusammenfassung

Das im Krankenhausplan NRW 2015 konstituierte Integrative Versorgungskonzept für die psychiatrische und psychosomatische Krankenhausversorgung und der damit verbundene Auftrag an alle Versorger in der Psychiatrie oder Psychosomatischen Medizin, künftig auch die jeweils andere Disziplin mitanzubieten, findet sich nahezu unverändert im Krankenhausplan NRW 2022 wieder und ist somit weiterhin handlungsweisend für alle (Weiter-)Entwicklungen.

Mit Vorlage Nr. 15/1130 berichtet die Verwaltung vor dem Hintergrund des am 27.04.2022 in Kraft gesetzten Krankenhausplans NRW über grundlegende Überlegungen zur fachlichen Weiterentwicklung, zu Ausbau und Umsetzung der Versorgungsangebote im Bereich der Psychosomatischen Medizin und Psychotherapie im LVR-Klinikverbund.

Ein besonderes Augenmerk wird auf das neue Zentrum für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie Viersen-Mönchengladbach gelegt, das beispielhaft nicht nur für die Möglichkeiten der fachlichen Weiterentwicklung, sondern auch für eine gewinnbringende Kooperation innerhalb des LVR-Klinikverbunds steht.

Die LVR-Klinik Mönchengladbach und die LVR-Klinik Viersen beabsichtigen, gemeinsam ein Zentrum für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie Viersen-Mönchengladbach einzurichten und ab dem 01.01.2023 an zwei Standorten zu betreiben. In einem ersten Schritt erfolgt neben dem bestehenden Angebot in Viersen die Inbetriebnahme von 10 tagesklinischen Plätzen in Mönchengladbach.
Es handelt sich um einen organisatorischen Zusammenschluss, der insbesondere durch eine einheitliche ärztliche Leitung gekennzeichnet ist und damit eine Behandlung nach gleichen Qualitätsstandards an beiden Standorten, Viersen und Mönchengladbach, garantiert.

Bis voraussichtlich 2025 besteht mit dem Zentrum für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie Viersen-Mönchengladbach eine moderne psychosomatische Fachabteilung mit allen drei Behandlungssettings und insgesamt 46 Betten und 34 tagesklinischen Plätzen. Diese bietet eine bedarfsgerechte, differenzierte psychosomatische Versorgung mit stationären, tagesklinischen und ambulanten Angeboten sowie Konsil- und Liasiondienst an beiden Standorten. Das Zentrum ermöglicht eine weitere, dem Fachgebiet angemessene Binnendifferenzierung, ist attraktiv für die Personalgewinnung und -entwicklung und kann unter wirtschaftlichen Aspekten nachhaltig und zukunftsfest betrieben werden.

Begründung der Vorlage Nr. 15/1130:

1. Ausgangslage

Die Psychosomatische Medizin ist in Deutschland ein relativ junges Fachgebiet. Die Entscheidung zur Einrichtung des Fachgebietes „Psychotherapeutische Medizin" traf im Jahr 1992 der 92. Deutsche Ärztetag in Köln. Im Mai 2003 erfolgte die Umbenennung des Fachgebietes in „Psychosomatische Medizin und Psychotherapie". Allerdings existiert die Psychosomatische Medizin bereits seit Mitte der 1930er Jahre als eigenes Fach mit systematischer wissenschaftlicher Forschung.
Nach der Musterweiterbildungsordnung der Bundesärztekammer[1] umfasst das Fachgebiet „die Erkennung, psychotherapeutische Behandlung, Prävention und Rehabilitation von Krankheiten und Leidenszuständen, an deren Verursachung psychosoziale und psychosomatische Faktoren einschließlich dadurch bedingter körperlich-seelischer Wechselwirkungen maßgeblich beteiligt sind".

Behandlungsangebote der Psychosomatischen Medizin und Psychotherapie richten sich an Patient*innen mit psychosomatischen Erkrankungen, somatoformen Störungen, wie z.B. organisch nicht erklärbare körperliche Beschwerden oder Schmerzen, Ess-Störungen, akuten und posttraumatischen Belastungsreaktionen sowie Angsterkrankungen, Depressionen und Anpassungsstörungen, häufig im Zusammenhang mit bzw. als Folge von schweren körperlichen Erkrankungen (z.B. Krebserkrankungen, Diabetes). Sie sind eng mit dem somatischen Versorgungssystem verzahnt. In der Regel haben die Behandlungskonzepte einen deutlichen psychotherapeutischen Schwerpunkt und sind ganzheitlich im Sinne des bio-psycho-sozialen Krankheitsverständnisses ausgerichtet.

Ein aktuelles Beispiel dafür sind im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie entstandene psychosoziale und körperliche Stressoren und die Relevanz der Leistungsangebote der Psychosomatischen Medizin für die Behandlung von deren Folgen. So entwickeln viele Menschen zum einen stressbedingt psychische und psychosomatische Beschwerden, zum anderen gilt es, die nach einer Erkrankung an Covid-19 bei einer Reihe von Betroffenen auftretenden körperlichen und psychischen Einschränkungen differenziert einzuschätzen und zu behandeln (Long-Covid).

Mit der Krankenhausplanung 2015 erfolgte in NRW die Einführung des **Integrativen Versorgungskonzeptes** und damit die Zusammenlegung der Disziplinen Psychiatrie und Psychotherapie (PP) und Psychosomatische Medizin und Psychotherapie (PM) zu einem gemeinsamen Planungsgebiet Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatische Medizin und Psychotherapie (PPPM). Dieses Konzept wurde in den Krankenhausplan 2022 übernommen. Folgende Textpassagen (Auszüge aus dem Krankenhausplan NRW 2022) veranschaulichen den Konzeptgedanken:

> *Das mit dem Krankenhausplan NRW 2015 eingeführte **Integrative Versorgungskonzept** für die psychiatrische und psychosomatische Krankenhausversorgung hat sich bewährt und wird auch mit der aktuellen Krankenhausplanung weitergeführt.*

[1] Auf Basis der Beschlüsse der Deutschen Ärztetage wurde die neue (Muster-)Weiterbildungsordnung am 15.11.2018 verabschiedet.

[…] So kann nach fachlicher Einschätzung eine bedarfsgerechte und an den Bedürfnissen der betroffenen Patienten ausgerichtete qualitativ hochwertige Versorgung angeboten werden. ***Hierbei ist dem jeweiligen Bedarf in den einzelnen Gebieten innerhalb der Planung der Gesamtkapazitäten Rechnung zu tragen****.*

[…] Dieser ganzheitliche ***Ansatz erfordert zudem eine enge Zusammenarbeit mit den somatischen Gebieten****. Hierdurch kann nicht nur eine Chronifizierung psychischer und psychosomatischer Krankheiten wirksam verhindert, sondern insbesondere auch einer Stigmatisierung und Ausgrenzung der betroffenen Patienten gezielt entgegengewirkt werden.*

[…] ***Die bedarfsgerechten Versorgungskapazitäten für Psychiatrie und Psychosomatik sind mittels gemeinsamer Planung auf regionaler Ebene*** *unter besonderer Berücksichtigung des Prinzips „ambulant vor teilstationär vor vollstationär" sowie der Anforderungen an die Pflichtversorgung nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)* ***festzulegen****.*

[…] Die ***Versorgungsangebote*** *für Psychiatrie und Psychosomatik* ***sind so auszugestalten****,* ***dass ein angemessenes Weiterbildungsangebot nach den ärztlichen Weiterbildungsordnungen für beide Gebiete vorgehalten wird.*** *Grundsätzlich sind alle bestehenden Fachkrankenhäuser und Fachabteilungen für Psychiatrie und Psychotherapie und für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie in das Integrative Versorgungskonzept einzubeziehen und weiterzuentwickeln.*

Die krankenhausplanerischen Ausführungen zum Versorgungsauftrag in Verbindung mit internen Auswertungen[2] des LVR-Fachbereichs 84, dass - gemessen am Bundesdurchschnitt - sowohl in NRW insgesamt als auch im LVR-Klinikverbund eine Unterrepräsentanz der PM an der PPPM gegeben ist, veranlassen den LVR-Klinikverbund im Bereich der Psychosomatischen Medizin und Psychotherapie zu einer strategischen Neuausrichtung. Hierzu wird die Verbundzentrale mit gesonderter Vorlage in den politischen Ausschüssen berichten.

2. Kurzer Überblick: Versorgungsangebote im Bereich der Psychosomatischen Medizin und Psychotherapie im LVR-Klinikverbund – aktueller Stand

Im LVR-Klinikverbund verfügen aktuell die LVR-Klinika Düsseldorf und Essen (seit Mitte der 1970er Jahre) sowie die LVR-Kliniken Viersen (seit 2018) und Köln (seit 2019) im Bereich der Psychosomatischen Medizin und Psychotherapie über eigene Fachabteilungen, mit unterschiedlichen Spezialisierungen und fachlichen Schwerpunkten.

Die Implementierung eines psychosomatischen Leistungsangebotes in Mönchengladbach befindet sich in Umsetzung (siehe **3. Zentrum für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie Viersen-Mönchengladbach**).

Die Kapazitäten Psychosomatische Medizin werden an den anderen Klinikstandorten bisher noch als sogenannte „eingestreute" Betten bzw. in der LVR-Klinik Langenfeld

[2] Auswertung interner Leistungszahlen der LVR-Kliniken, Berechnungen und Vergleiche der fachabteilungsbezogenen Krankenhaushäufigkeiten Deutschland, NRW und LVR auf Basis der Krankenhausstatistik, Internetrecherche zu Versorgern im Rheinland

durch eine spezialisierte Station für Psychosomatische Medizin (in Leverkusen) umgesetzt.

Nach Einschätzung der Verbundzentrale ist letztlich nur mit der Etablierung von eigenständigen Fachabteilungen für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie die erforderliche hohe Fachlichkeit in der Versorgung von komplex psychosomatisch erkrankten Patient*innen sichergestellt sowie die Möglichkeit der Facharztweiterbildung gegeben, was die Attraktivität der Klinikstandorte in Bezug auf Gewinnung und Bindung von Mitarbeitenden weiter steigern würde. Hierbei sind vor allem Vernetzungen und Kooperationen innerhalb des LVR-Klinikverbunds anzustreben und Synergieeffekte zu nutzen. Konzeptuell werden Kooperationsmöglichkeiten in o.a. Vorlage zur Neuausrichtung konkretisiert, eine erste praktische Umsetzung soll nunmehr mit dem Zentrum für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie Viersen-Mönchengladbach erfolgen.

3. Zentrum für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie Viersen-Mönchengladbach

Nach § 8 des KHGG NRW sind Krankenhäuser entsprechend ihrer Aufgabenstellung zur Zusammenarbeit untereinander verpflichtet. Mit diesem gesetzlichen Leitgedanken wird eine Optimierung der Versorgungsqualität, Bündelung von Kompetenzen und die Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung gefördert. In diesem Zusammenhang ist in der Medizin der Zentrumsbegriff positiv belegt und steht für: umfassende Behandlung, Kompetenz und Spezialisierung. Für Patient*innen wird der Zentrumsbegriff mit Vertrauen und Erleichterung für die eigene Versorgung assoziiert. Konkret ist in einem Zentrum eine unkomplizierte Weiterleitung von einem Behandlungssetting in das andere möglich, z. B. von stationär zu teilstationär.

Die LVR-Klinik Mönchengladbach und die LVR-Klinik Viersen beabsichtigen daher, gemeinsam ein Zentrum für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie Viersen-Mönchengladbach einzurichten und ab dem 01.01.2023 zu betreiben.

Das Zentrum soll aus einer psychosomatischen Fachabteilung mit zwei Standorten bestehen. Ein Standort befindet sich auf dem Klinikgelände der LVR-Klinik Viersen, der andere Standort am Bethesda-Krankenhaus (somatisches Krankenhaus) in Mönchengladbach. Es handelt sich um einen organisatorischen Zusammenschluss, der insbesondere durch eine einheitliche ärztliche Leitung gekennzeichnet ist und damit eine Behandlung nach gleichen Qualitätsstandards an beiden Standorten garantiert.

Das Zentrum für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie Viersen-Mönchengladbach beinhaltet alle drei Behandlungssettings (ambulant, teilstationär, stationär), zunächst dezentralisiert an zwei Standorten. In der Außendarstellung verfügt das Zentrum so über alle Bausteine der psychosomatischen Versorgung, was sowohl für Patient*innen als auch für Zuweiser*innen einen großen Vorteil darstellen und zu einer generellen Aufwertung beider LVR-Kliniken führen würde.

3.1 Inhaltliche Ausrichtung und Vorteile einer Zentrumsbildung

Dem Zentrum wird ein kooperatives Versorgungskonzept zugrunde gelegt, welches Synergiemöglichkeiten bietet. Dabei liegt der Schwerpunkt der Behandlung in Viersen auf der multidisziplinären Schmerzbehandlung, der Psychotraumatologie und den Somatisierungsstörungen und am Standort in Mönchengladbach auf der Behandlung von schweren komorbiden körperlichen und psychischen Erkrankungen (wie z. B. chronisch entzündliche Darmerkrankungen, Diabetes, Asthma, Multiple Sklerose etc.) sowie Somatisierungsstörungen und Essstörungen. Hierbei kann auf die bewährten personellen und konzeptionellen Strukturen der psychosomatischen Abteilung in Viersen Bezug genommen werden.

Weitere Vorteile der Zentrumsbildung sind:

- Große Angebotsvielfalt für Patient*innen
- Hohe Patient*innen- und Serviceorientierung
- Effiziente Nutzung von personellen bzw. Fachkräfteressourcen
- Keine Notwendigkeit einer Doppelvorhaltung von Funktionen
- Wettbewerbsfähige Außendarstellung
- Sicherstellung der ärztlichen und psychologischen Weiterbildung[3]
- Effiziente Nutzung der Expertisen beider Standorte[4]
- Möglichkeiten der Kreativität und Innovation[5]
- Kooperations- vs. Konkurrenzverhalten

3.2 Standorte

Während der Standort in Viersen bereits jetzt 20 vollstationäre psychosomatische Betten und eine psychosomatische Ambulanz betreibt, soll in einem ersten Schritt zum 01.01.2023 die Inbetriebnahme 10 tagesklinischer Plätze, die bereits im Feststellungsbescheid der LVR-Klinik Mönchengladbach ausgewiesen sind, sowie einer psychosomatischen Ambulanz am Standort in Mönchengladbach erfolgen.

Die 10 tagesklinischen Plätze werden in den Räumlichkeiten des Bethesda-Krankenhauses als sogenannte Stand-alone-Tagesklinik untergebracht, die störungsübergreifende Psychotherapie anbieten soll. Es ergeben sich insbesondere Synergiemöglichkeiten in Bezug auf die Zusammenarbeit mit dem Bethesda-Krankenhaus im Konsiliardienst, aber auch in der besseren Verzahnung somatischer und psychotherapeutischer Fachexpertisen. Hieran wird auch der Standort in Viersen unmittelbar partizipieren. Die Nähe der Infrastruktur eines Akutkrankenhauses bietet die Möglichkeit, ganzheitlich integrierte klinische psychosomatische Versorgung anzubieten. Neben dem OPS-Code 9-63 soll hier bei einem erhöhten somatischen Aufwand für die Behandlung auch der OPS-Code 9-642 zur Anwendung kommen.

[3] Die Aufnahme des Standortes Mönchengladbach in den Weiterbildungsverbund Psychosomatischer Kliniken NRW wird angestrebt, erhöht Attraktivität als Arbeitgeber

[4] Der etablierte Viersener Fachtag zur psychosomatischen Medizin wird zum Fachtag des Zentrums, reputationsfördernd

[5] Videosprechstunden, Angebote für Berufstätige, digitale Gesundheitsanwendungen, Biofeedback, etc.

Die detaillierte inhaltliche Ausrichtung der Tagesklinik soll mit den psychiatrischen Stationen der LVR-Klinik Mönchengladbach sowie mit den derzeit bestehenden tagesklinischen Angeboten der LVR-Klinik Mönchengladbach konzipiert werden, um ein ergänzendes Behandlungsangebot mit Alleinstellungsmerkmal zu schaffen.

Durch die Etablierung eines psychosomatischen Angebotes direkt an einem somatischen Krankenhaus kann gerade die Versorgung von Patient*innen mit unklaren, eventuell noch verdeckten somatoformen Störungsbildern verbessert, der Zugang zu einer spezialisierten Diagnostik und Behandlung erleichtert und damit somatischen Fehlbehandlungen entgegengewirkt werden. Auf diese Weise kann die Behandlung bereits frühzeitig - noch während der somatischen Diagnostik und Behandlung – begonnen werden.

Die Psychosomatische Ambulanz am Standort Mönchengladbach soll räumlich ebenso am Bethesda-Krankenhaus untergebracht werden. Zunächst sollen Diagnostik und Indikationsstellung durchgeführt werden sowie die Nachsorge für entlassene Patient*innen. Die Einrichtung ambulanter gruppentherapeutischer Angebote hat eine bewährte Praxis und soll hier auch angestrebt werden. Die Angebote sollen sich über psycho-dynamisch interaktionelle Nachsorgegruppentherapie über Skills und kreativtherapeutische Gruppen sowie für Patient*innen mit chronischen körperlichen Erkrankungen mit Bewältigungsproblematik erstrecken.

Parallel wird im Rahmen der anstehenden Krankenhausplanungsverfahren eine kapazitative Aufstockung der Psychosomatik von 6 Betten und 24 tagesklinischen Plätzen in Viersen sowie die Sollumsetzung von 20 Betten aus dem bestehenden Feststellungsbescheid in Mönchengladbach angestrebt. In Viersen konzentriert sich die Erweiterung inhaltlich auf 6 vollstationäre Betten für ein transkulturelles Therapieangebot, 9 tagesklinische Plätze zur Versorgung aller psychosomatischen Krankheitsbilder, 9 tagesklinische Plätze für einen Schwerpunkt chronischer Schmerzen und 6 tagesklinische Plätze für eine transkulturelle Tagesklinik.

Die Umsetzung der erweiterten Versorgungsaufträge kann in Viersen binnen 12 Monaten nach Bescheidbekanntgabe erfolgen, die Implementierung 20 stationärer Betten in Mönchengladbach wegen noch zu realisierender Baumaßnahmen bis zum Jahr 2025. Aufgrund der aktuell bestehenden Unsicherheiten durch die Energiekrise mit den daraus resultierenden Kostensteigerungen und den Preisindexsteigerungen von bis zu 25 % jährlich im Bausektor ist die zeitliche Planung für noch umzusetzende bauliche Maßnahmen mit einem gewissen Vorbehalt zu sehen.

3.3 Ausblick

Bis voraussichtlich 2025 besteht mit dem Zentrum für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie Viersen-Mönchengladbach eine moderne psychosomatische Fachabteilung mit allen drei Behandlungssettings und insgesamt 46 Betten und 34 tagesklinischen Plätzen. Diese bietet eine bedarfsgerechte, differenzierte psychosomatische Versorgung mit stationären, tagesklinischen und ambulanten Angeboten sowie Konsil- und Liasiondienst an beiden Standorten. Das Zentrum ermöglicht eine weitere, dem Fachgebiet angemessene Binnendifferenzierung, ist attraktiv für die Personalgewinnung

und -entwicklung und kann unter wirtschaftlichen Aspekten nachhaltig und zukunftsfest betrieben werden.


Eine Darstellung der Organisationsstruktur finden Sie in der **Anlage**.

Das Zentrum für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie steht beispielhaft für mögliche fachliche Weiterentwicklungen und gewinnbringende Kooperation im LVR-Klinikverbund.

In Vertretung

W e n z e l - J a n k o w s k i

ANLAGE



STAT	TK	AMB	Versorgungsangebot	STAT	TK	AMB
20	10	X	Psychosomatische Regelversorgung	20	9 (neu)	X
			Chronische Schmerzen		9 (neu)	
			Transkulturelle Angebote	6 (neu)	6 (neu)	X
			OEG-Traumambulanz			X

Die Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland

Qualität für Menschen

Vorlage Nr. 15/894

öffentlich

Datum: 08.08.2022
Dienststelle: Fachbereich 43
Bearbeitung: Christine Schoelen

Landesjugendhilfeausschuss	**01.09.2022**	**Kenntnis**
Gesundheitsausschuss	**09.09.2022**	**Kenntnis**

Tagesordnungspunkt:

LVR-Förderprogramm „Unterstützung der Kommunen und Kreise im Rheinland beim Ausbau der Angebots- und Koordinationsstrukturen für Kinder und Jugendliche mit psychisch und/oder suchterkrankten Eltern": Stand der Umsetzung

Kenntnisnahme:

Der Bericht zur Umsetzung des LVR-Förderprogramms „Unterstützung der Kommunen und Kreise im Rheinland beim Ausbau der Angebots- und Koordinationsstrukturen für Kinder und Jugendliche mit psychisch und/oder suchterkrankten Eltern" wird gem. Vorlage Nr. 15/894 zur Kenntnis genommen

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.	ja

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2020.	nein

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):

Produktgruppe:	
Erträge: Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan	Aufwendungen: /Wirtschaftsplan
Einzahlungen: Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:	Auszahlungen: /Wirtschaftsplan
Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:	
Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten	

In Vertretung

L i m b a c h

Zusammenfassung:

In der Umsetzung des politischen Auftrages „Unterstützung von Hilfen für Kinder psychisch und/oder suchterkrankter Eltern" (Beschluss zum Haushaltsantrag Nr. 14/227/1) wurde 2020 das LVR-Förderprogramm „Unterstützung der Kommunen im Rheinland beim Ausbau der Angebots- und Koordinationsstrukturen für Kinder und Jugendliche mit psychisch und/oder suchterkrankten Eltern" als einmalige Initialförderung neu entwickelt und ausgeschrieben. Bis Mitte 2021 wurden insgesamt 27 Anträge bewilligt und die zur Verfügung stehenden insgesamt 900.000,- Euro verausgabt.

In den bis zu zweijährigen Projekten wurde und wird – trotz Corona bedingten Einschränkungen und Verzögerungen beim Projektstart – die Praxisentwicklung bei präventiven, niedrigschwelligen Angeboten für Kinder und Jugendliche, begleitenden Angeboten für deren Eltern sowie die kommunale Koordination und Vernetzung auf- und ausgebaut.

Die Kommunen konnten und können bei der Umsetzung auf die Unterstützung und – bei Bedarf prozessbegleitende Beratung – der Fachberatung „Kinder psychisch und/oder suchtkranker Eltern" in der LVR-Koordinationsstelle Kinderarmut zurückgreifen. Im Rahmen von Fortbildungen wie zum Beispiel Werkstattgesprächen wurden fachliche Impulse rund um das Thema „Kinder und Jugendliche mit psychisch und/oder suchterkrankten Eltern" gegeben und wurde der Wissenstransfer und die Vernetzung der Kommunen untereinander gefördert.

Aktuell befinden sich viele der Kommunen in der Endphase der LVR-Förderung und damit bei der Klärung der nachhaltigen Absicherung der aufgebauten Angebote und Strukturen nach Projektende.

Das Förderprogramm berührt die Zielsetzung Z4. „Den inklusiven Sozialraum mitgestalten" des LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention.

Begründung der Vorlage Nr. 15/894:

Förderprogramm „Unterstützung der Kommunen im Rheinland beim Ausbau der Angebots- und Koordinationsstrukturen für Kinder und Jugendliche mit psychisch und/oder suchterkrankten Eltern": Stand der Umsetzung

In der Umsetzung des Beschlusses zum Haushaltsantrag Nr. 14/227/1 von CDU und SPD haben die Dezernate 4 und 8 das Förderprogramm „Unterstützung der Kommunen im Rheinland beim Ausbau der Angebots- und Koordinationsstrukturen für Kinder und Jugendliche mit psychisch und/oder suchterkrankten Eltern" entwickelt und, nach Verabschiedung durch den LVR-Landschaftsausschuss (23.06.2020) und die LVR-Landschaftsversammlung (30.09.2020), im Juli 2020 ausgeschrieben.

Zielsetzung des Förderprogramms ist es, die Gestaltungsrolle der Jugendämter und der Gesundheitsämter zu stärken. Sie haben eine maßgebliche Steuerungs- und Planungsverantwortung für die bedarfsgerechte Versorgung der Adressat*innen und sind gefordert, die notwendigen Unterstützungsleistungen zu initiieren und zu verstetigen. Antragsberechtigt für die einmalige Initialförderung waren deshalb ausschließlich Jugend- und Gesundheitsämter im Rheinland.

1 Beteiligte Kommunen

Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen 2020, bedingt insbesondere durch die Corona-Pandemie, ist das Förderprogramm bei Jugendämtern und Gesundheitsämtern auf großes Interesse gestoßen. Die Aufmerksamkeit und das Engagement für das Thema Kinder und Jugendliche mit psychisch- und/oder suchterkrankten Eltern ist bei Fachkräften sehr hoch. So waren Maßnahmen in vielen Kommunen bereits vorhanden und sollten durch die LVR-Förderung weitergeführt und ausgebaut werden.

Beantragt und bewilligt wurden bis Mitte 2021 insgesamt Anträge von 27 Städten und Kreisen. Bei 21 Anträgen liegt die Federführung beim Jugendamt, bei sechs Kommunen beim Gesundheitsamt. Bei den Kreisen ist in der Regel eine Einbindung der kreisangehörigen Kommunen erfolgt, so dass die Zahl der beteiligten Kommunen entsprechend größer ist. Konkret nehmen folgende Kommunen am Förderprogramm teil:

- Die Städte Bedburg, Bonn, Düren, Düsseldorf, Duisburg, Erftstadt, Erkelenz, Essen, Geilenkirchen, Heinsberg, Hückelhoven, Hürth, Köln, Leverkusen, Mönchengladbach, Mülheim an der Ruhr, Remscheid, Solingen, Wesel.
- Der Kreis Düren, die StädteRegion Aachen, der Kreis Mettmann, der Kreis Wesel, der Rhein-Sieg-Kreis, der Oberbergische Kreis – ein Verbundprojekt mit den Städten Wiehl, Gummersbach, Wipperfürth und Radevormwald –, der Rheinisch-Bergische Kreis sowie ein Verbundprojekt der Städte Herzogenrath, Würselen, Stolberg, Alsdorf und Eschweiler in Federführung der StädteRegion Aachen.
- In Düsseldorf, Viersen, Düren und Mönchengladbach sind LVR-Kliniken in die Umsetzung der Projekte eingebunden.

Mit der Bewilligung der 27 Anträge sind die zur Verfügung stehenden LVR-Mittel in Höhe von 900.000,- Euro vorausgabt (siehe Vorlage Nr. 14/4450 und 15/80). Da es sich um eine einmalige Initialförderung handelt, ist keine weitere Ausschreibung vorgesehen.

Bedingt durch die Einschränkungen der Corona-Pandemie, hat sich der Start einiger Projekte verzögert. Im Laufe des Jahres 2021 konnte dann aber mit der Umsetzung der geplanten Maßnahmen in allen Kommunen begonnen werden.

2 Zur Umsetzung

Grundsätzlich haben psychische Erkrankungen der Eltern unmittelbare Auswirkungen auf die Kinder und Jugendlichen. Durch die Stigmatisierung und Tabuisierung psychischer Erkrankungen kommt es in den Familien häufig zu einer Desorientierung, die zu Ängsten und sozialem Rückzug führen kann. Psychisch erkrankte Eltern sind oft nicht in der Lage, die Betreuung der Kinder und Jugendlichen adäquat zu leisten. Dadurch erfahren die Kinder Defizite in der Erziehung und leiden unter Trennungen – und häufig entsteht eine

Parentifizierung, das heißt, dass die Kinder Aufgaben wie auch Rollenfunktionen der Eltern übernehmen. Ähnliche Belastungen gibt es bei Kindern und Jugendlichen mit suchterkrankten Eltern.

Aktuelle Studien belegen, dass sich durch die Corona-Pandemie die psychische Belastung dieser Kinder und Jugendlichen noch verschärft hat (Copsy-Längsschnittstudie-Welle 3 2021[1], BIB.BEVÖLKERUNGS.STUDIEN 2 2021[2]; DAK-Kinder und Jugendreport 2022[3]). Familien wurden zu geschlossenen Systemen, abgeschottet von anderen sozialen Interaktionen. Dadurch verstärkten sich die Eigendynamiken und die Problematiken innerhalb des familiären Systems. Externe Entlastungsorte, wie zum Beispiel Schulen, Kindertagesstätten, Jugendfreizeiteinrichtungen, aber auch das Treffen der Peers untereinander im Sozialraum, waren über viele Monate hinweg nicht möglich. Hinzu kam, dass durch „die soziale Isolation die Not der Kinder, Jugendlichen und Familien für die Hilfesysteme unsichtbar" wurde. Auch wenn inzwischen wieder fast alle Einrichtungen geöffnet sind und es keine Kontaktbeschränkungen mehr gibt, ist davon auszugehen, dass die letzten zwei Jahre nicht spurlos an den Familien vorbeigegangen sind und die Belastungen der Kinder und Jugendlichen zugenommen haben.

Umso erfreulicher war und ist, dass in den bis zu zweijährigen Projekten die Praxisentwicklung bei präventiven, niedrigschwelligen Angeboten für Kinder und Jugendliche mit psychisch und/oder suchterkrankten Eltern sowie die Entwicklung der kommunalen Koordination und Vernetzung dieser Angebote weiter auf- und ausgebaut werden konnte. Die LVR-Fachberatung, verortet in der Koordinationsstelle Kinderarmut im Fachbereich 43, hat die geförderten Kommunen durch Besuche vor Ort, Beteiligung an Gremien, Inhouse-Veranstaltungen sowie durch Fortbildungs- und Vernetzungsangebote unterstützt.

Konkret wurden folgende Maßnahmen umgesetzt und konnten dabei folgende Aktivitäten und Entwicklungen beobachtet werden:

- Feste wöchentliche Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche mit begleitender Elternarbeit wie zum Beispiel psychoedukative Kinder- und Jugendgruppen, Interaktions- und Krabbelgruppe für Kinder und Eltern (zum Beispiel in Duisburg, Düren, Köln, der StädteRegion Aachen, Hürth und in Heinsberg) sowie Angebote im Bereich der Frühen Hilfen wurden umgesetzt. So wurden zum Beispiel Kinderpfleger*innen durch niedrigschwelligen Einsatz in acht Familien mit insgesamt 16 Kindern (Stand Juni 2022) zur Entlastung und Unterstützung der Eltern und Kinder in Hürth eingesetzt. Der Einsatz orientiert sich am konkreten Bedarf der Familien und wird regelmäßig angepasst. Das Angebot wird gut angenommen; ein Wissenstransfer hin zu anderen interessierten Kommunen hat bereits stattgefunden.
- Ein Handlungsfeld in vielen Projekten war und ist die Qualifizierung von Fachkräften. So fanden zum Beispiel in der StädteRegion Aachen und in der Stadt und im Kreis Düren Fachveranstaltungen zur Sensibilisierung von Fachkräften aus Gesundheit und Jugendhilfe zu den Themenbereichen Sucht und/oder psychische Erkrankungen statt.
- Angebote, die in Kooperation mit LVR-Kliniken umgesetzt werden, konnten über Besuche der LVR-Fachberatung vor Ort (zum Beispiel in Düren und Essen) im Aufbau der Kooperation und der Ausgestaltung der Angebote für Kinder- und Jugendliche durch projektbegleitende Beratung unterstützt werden.
- Präventive Projekttage für Schüler*innen, Lehrkräfte mit begleitender Elternarbeit an offenen Ganztagsgrundschulen wurden zum Beispiel über das Remscheider Netzwerk „Kleine Helden" im Rahmen von Projekttagen „Kleine Helden werden stark" sowie „KinderKunstProjekten" durchgeführt. Über die Projekttage konnten in 2021 viele Schulklassen, Lehrende und Eltern erreicht werden. Zukünftig sollen weitere Schulen in Remscheid die Projekttage „Kleine Helden werden stark" übernehmen.

[1] https://www.uke.de/kliniken-institute/kliniken/kinder-und-jugendpsychiatrie-psychotherapie-und-psychosomatik/forschung/arbeitsgruppen/child-public-health/forschung/copsy-studie.html
[2] https://www.bib.bund.de/Publikation/2021/pdf/Belastungen-von-Kindern-Jugendlichen-und-Eltern-in-der-Corona-Pandemie.pdf?__blob=publicationFile&v=6
[3] https://www.dak.de/dak/bundesthemen/pandemie-sozial-benachteiligte-kinder-leiden-besonders-2564048.html#/

- Der Ausbau der kommunalen Koordination und Steuerung in den Ämtern konnte durch die LVR-Fördermittel zum Beispiel in Essen, Düren, Bonn, Duisburg, Leverkusen, Heinsberg, Köln, Remscheid, dem Oberbergischen Kreis, Rhein-Sieg-Kreis und der Städteregion Aachen vorangetrieben und intensiviert werden.
- Der flächendeckende Ausbau von ehrenamtlichen Patenmodellen, Gruppenangeboten und Lots*innendiensten wurde umgesetzt. Hier sei besonders der Ausbau und die Weiterentwicklung der Patenprojekte für Kinder und Jugendliche im Oberbergischen Kreis (OBK) genannt. Durch einen niedrigschwelligen Zugang werden dort durch 65 ehrenamtliche Paten aktuell 42 Kinder und Jugendliche betreut (Stand Juni 2022). Die LVR-Fachberatung hat an den Steuerungsgruppentreffen (Akteur*innen aus Jugend- und Gesundheitsämtern, Vertreter*innen des Patenprojekts umsetzenden Vereins Lebensfarben) im OBK teilgenommen und unterstützt die Akteur*innen in der Kommunikation bei politischen Gremien sowie mit zuständigen politischen Vertretern beratend und über schriftliche Stellungnahmen. Durch die Fördermittel des LVR ist im OBK ein flächendeckender Ausbau der Hilfen für Kinder und Jugendliche mit psychisch- und/oder suchterkrankten Eltern gelungen und die Vernetzung der Jugend- und Gesundheitshilfe wurde weiter ausgebaut. Aktuell steht die Klärung der Verstetigung der Maßnahmen an.
- Ein weiteres wichtiges Handlungsfeld in den geförderten Projekten war und ist die Fachöffentlichkeitsarbeit. So haben einzelne Kommunen die Erleichterung der Zugänge und Sichtbarmachung vorhandener Unterstützungsangebote über digitale Plattformen und Printmedien vorangetrieben. In Essen fanden fachöffentliche Aufklärungsangebote statt, zum Beispiel zum Thema „Depression". Unterstützt durch die LVR-Fachberatung, haben einzelne Kommunen bewährte Angebote in Artikeln, Interviews und Reportagen aufbereitet, die dann unter anderem im LVR-Jugendhilfe-Report und im LVR-Newsletter Kinder- und Jugendarmut veröffentlicht wurden.
- Die LVR-Fachberatung hat zwei „Netzwerktreffen der Patenprojekte" in 2021 und 2022 geplant und angeboten. An den virtuellen Treffen haben Kommunen aus ganz NRW teilgenommen (unter anderem Bielefeld, Bornheim, Münster, Detmold, Wiehl, Remscheid, Bonn, Grevenbroich, Hürth, Kerpen, Leverkusen, Düsseldorf, Aachen, Troisdorf, Köln). Themen der Netzwerktreffen waren, neben dem Erfahrungsaustausch, gute Praxisberichte und Wissenstransfer, inhaltliche Inputs zur Projektförderung über das Landesprogramms „KIPS Prävention NRW: Kinder psychisch kranker und suchtkranker Eltern stärken" sowie zum Thema „Kinderrechte im Schutzkonzept".
- Zur Stärkung der Zusammenarbeit der Ämter fanden am 15.06.2021, in Kooperation mit dem Landeszentrum Gesundheit NRW und dem LWL-Landesjugendamt Westfalen, Vernetzungstagungen für Jugendämter und Gesundheitsämter statt. Im Fokus stand die Frage, welche Unterstützungsleistungen Kinder und Jugendliche mit psychisch und/oder suchtkranken Eltern benötigen – und zwar insbesondere vor dem Hintergrund der Pandemie bedingten Einschränkungen. Die Tagungen haben sowohl den Bedarf an Angeboten für die Adressat*innen als auch eines kontinuierlichen Austauschs und der Vernetzung der Ämter und Kommunen deutlich gemacht.
- Zum interkommunalen Austausch zwischen den LVR-geförderten Projekten wurden in 2021 und 2022 zudem LVR-Werkstattgespräche (30.11.2021 und 14.06.2022) durchgeführt. Auf diesem Weg wurde der Kontakt zu den Jugend- und Gesundheitsämtern aufrechterhalten und der Wissenstransfer durch (überregionale) Fachbeiträge gefördert. Zudem ging es darum, von den guten Lösungen der Ämter über Best-Practice-Vorträge zu lernen und das gewonnene Wissen für andere Kommunen und die interessierte Fachöffentlichkeit aufzubereiten und zu verbreiten.
- Bei Besuchen der LVR-Fachberatung vor Ort (unter anderem in Düren, Essen, der StädteRegion Aachen und dem Oberbergischen Kreis) stand die gemeinsame Beratung von Gelingensbedingungen ebenso wie Hürden, zum Beispiel was die Zusammenarbeit von Jugendamt und Gesundheitsamt angeht, im Mittelpunkt. Neben der persönlichen Unterstützung der koordinierenden Fachkräfte ging es darum, Lösungsansätze zu finden und die Praxis in den Kommunen weiter zu optimieren.

- Die LVR-Fachberatung hat zudem an verschiedenen Inhouse-Veranstaltungen der geförderten Kommunen mitgewirkt, um auch auf diesem Weg die Vernetzungsleistung der Kommunen und den Handlungsbedarf im Themenfeld zu untermauern.
- Abschließend ist eine Fortbildung zum Thema „Resilienzförderung bei Kindern und Jugendlichen mit psychisch- und/oder suchtkranken Eltern" zu nennen, die die LVR-Fachberatung in der Koordinationsstelle Kinderarmut neu entwickelt und für verschiedene Zielgruppen angeboten hat. Neben Fachvorträgen gab es Beispiele aus der Praxis und wurde Raum für den Erfahrungs- und Wissenstransfer zur Verfügung gestellt.

3 Ausblick

Durch die Pandemie bedingten Einschränkungen sind die Projekte und Maßnahmen teilweise erst verzögert gestartet, so dass viele noch bis Ende 2022 laufen. Angesichts der skizzierten Entwicklungen und Erfahrungen aus der fachlichen Begleitung kann davon ausgegangen werden, dass die Angebote und Aktivitäten in der Regel wie geplant umgesetzt werden.

Eine Herausforderung stellt die anstehende Verstetigung der Angebote und Strukturen dar. Da es sich bei der LVR-Förderung um eine einmalige Initialförderung handelt, sind die Kommunen nun gefordert, alternative Finanzierungsmöglichkeiten zu finden. Die Förderung mit kommunalen Eigenmitteln ist hier natürlich die angestrebte Variante, angesichts der unter anderem durch die Belastungen der Pandemiebekämpfung belasteten Haushaltslagen jedoch nicht überall möglich.

Seitens der LVR-Fachberatung wird deshalb auch auf alternative Förderprogramme hingewiesen. Hierzu gehören insbesondere das Landesprogramm „kinderstark – NRW schafft Chancen", mit dem sowohl Kooperationsstrukturen der Ämter als auch aufsuchende Angebote für Kinder mit psychisch und/oder suchterkrankten Eltern finanziert werden können, sowie das 2021 neu aufgelegte Landesförderprogramm „KIPS Prävention NRW: Kinder psychisch kranker und suchtkranker Eltern stärken" des Gesundheitsministeriums NRW und der Gesetzlichen Krankenkassenverbände, mit dem die Umsetzung nachhaltiger Angebote zur Stärkung der Resilienz von Kindern psychisch und/oder suchterkrankter Eltern gefördert wird (www.kips.nrw). Zielsetzung ist die Etablierung einer Versorgungsstruktur präventiver Angebote zugunsten dieser Kinder. Die Abwicklung des Förderprogramms erfolgt über den Verein Bella Donna in Essen. Insgesamt 21 Kommunen und freie Träger haben hier bereits erfolgreich Anträge gestellt.

Losgelöst von der LVR-Förderung können die Jugendämter und Gesundheitsämter im Rheinland auch zukünftig auf die unterstützende Begleitung der LVR-Fachberatung „Kinder psychisch und/oder suchtkranker Eltern" zurückgreifen. Durch die Einbindung der Fachberatung in das Team der LVR-Koordinationsstelle Kinderarmut ist zudem sichergestellt, dass die Bedarfe und Lebenslagen dieser Kinder und Jugendlichen bei Entwicklungsprozessen in den Bereichen Kommunale Präventionsketten, Frühe Hilfen und Vernetzungen gegen Kinderarmut immer mitgedacht werden.

Auch im Bereich Fortbildung wird es zukünftig weitere bedarfsgerechte, themenspezifische Fortbildungen, Werkstattgespräche und Informationsveranstaltungen geben. In Zusammenarbeit zwischen Dezernat 4 und Dezernat 8 ist eine Kooperationsveranstaltung zum Thema „Zusammenwirken von Angeboten für Kinder von psychisch und /oder suchtkranken Eltern und der Kinder- und Jugendpsychiatrie" in Planung.

In Vertretung

L i m b a c h

Die Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland

Qualität für Menschen

Ergänzungsvorlage Nr. 15/1118/1

öffentlich

Datum: 31.08.2022
Dienststelle: Fachbereich 54
Bearbeitung: Herr Anders/Frau Dr. Silva

Gesundheitsausschuss	**09.09.2022**	**Kenntnis**

Tagesordnungspunkt:

Hilfen für vom Hochwasser 2021 betroffene Menschen in den OEG-Traumaambulanzen

Kenntnisnahme:

Der Bericht über die Inanspruchnahme der OEG-Traumaambulanzen wird gem. Vorlage Nr. 15/1118/1 zur Kenntnis genommen

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.	ja

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2025.	ja

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):

Produktgruppe:	
Erträge: Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan	Aufwendungen: /Wirtschaftsplan
Einzahlungen: Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:	Auszahlungen: /Wirtschaftsplan
Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:	
Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten	

In Vertretung

P r o f. D r. F a b e r

Zusammenfassung:

Vorlage Nr. 15/1118/1
Der Sozialausschuss hat in seiner Sitzung am 23. August 2022 beschlossen, dass die Vorlage Nr. 15/1118 auch dem Gesundheitsausschuss zur Kenntnis gegeben werden soll.

Vorlage Nr. 15/1118
Mit dieser Vorlage berichtet die Verwaltung über die Inanspruchnahme der OEG-Traumaambulanzen im Rheinland durch Betroffene der Hochwasserkatastrophe im Jahr 2021. Ferner wird zur bisherigen Inanspruchnahme des Angebots durch Geflüchtete aus der Ukraine informiert.

Die Hochwasserkatastrophe im Jahr 2021 hat nicht nur zu einer hohen Zahl an Todesopfern, sondern auch bei den Betroffenen zu speziellem Bedarf an psychotherapeutischer Unterstützung geführt.

Der LVR-Fachbereich Soziale Entschädigung konnte hier, in Abstimmung mit dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW als Kostenträger, Unterstützung in den OEG-Traumaambulanzen anbieten. Betroffene konnten, ohne vorherige Antragstellung, bis zu fünf Stunden psychotherapeutischer Sofortintervention in Anspruch nehmen.

Das Angebot wurde von 124 Menschen in Anspruch genommen, wobei insgesamt tatsächlich deutlich mehr Menschen Hilfen außerhalb des Angebots, über die Regelversorgung, in Anspruch genommen haben.

In den OEG-Traumaambulanzen im Rheinland wurden darüber hinaus, seit Ende April 2022, sieben Menschen behandelt, die aus der Ukraine seit dem Ausbruch des russischen Angriffskrieges geflüchtet sind. Die Verwaltung hatte mit Vorlage Nr. 15/981 über dieses Hilfsangebot berichtet. Ein Anstieg der Zahl der Inanspruchnahmen wird in den kommenden Monaten erwartet.

Begründung der Vorlage Nr. 15/1118/1:

Der Sozialausschuss hat in seiner Sitzung am 23. August 2022 beschlossen, dass die Vorlage Nr. 15/1118 auch dem Gesundheitsausschuss zur Kenntnis gegeben werden soll.

Begründung der Vorlage Nr. 15/1118:

Mit dieser Vorlage berichtet die Verwaltung über die Inanspruchnahme der OEG-Traumaambulanzen im Rheinland durch Betroffene der Hochwasserkatastrophe im Jahr 2021. Ferner wird zur bisherigen Inanspruchnahme des Angebots durch Geflüchtete aus der Ukraine informiert.

I.
Vor einem Jahr, am 14. Juli 2021, kamen 189 Menschen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz durch ein verheerendes Hochwasser ums Leben. Viele Menschen wurden traumatisiert, verloren ihr Hab und Gut, wenn nicht sogar ihre Existenz. Städte und Dörfer, ganze Regionen, wurden verwüstet. Die Schäden sind auch ein Jahr danach noch sichtbar. In Teilen wird der Wiederaufbau der Infrastruktur noch Jahre dauern.

Um den von der Flut betroffenen und traumatisierten Menschen schnell helfen zu können, hatte der LVR-Fachbereich Soziale Entschädigung (FB 54) unmittelbar nach der Katastrophe Kontakt mit dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW (MAGS NRW) aufgenommen. Dem Ministerium wurde vorgeschlagen, die OEG-Traumaambulanzen[1] für Betroffene zur Durchführung einer psychotherapeutischen Sofortintervention zu öffnen. Diese Abstimmung war erforderlich, da das MAGS NRW Kostenträger für das Angebot der OEG-Traumaambulanzen ist.

Die Zusage des MAGS NRW erfolgte schnell, und die Kliniken konnten am 21. Juli 2021 über das Angebot informiert werden, dass bis zu fünf Sitzungen im Einzelfall, auf der Basis der bestehenden Verträge, abgerechnet werden konnten. Wie auch beim regulären Angebot der OEG-Traumaambulanzen, war keine vorherige Antragstellung beim LVR notwendig. Betroffene konnten sich unmittelbar an die Kliniken wenden.

Das Angebot war bis zum 31. März 2022 befristet. Bis dahin wurden 124 Betroffene in 15 verschiedenen Kliniken behandelt. Die meisten Behandlungen (52) wurden in der LVR Klinik Bonn durchgeführt. Dies ist vermutlich auch mit der Nähe der Klinik zum Ahrtal und den dort durch die Flut ebenfalls weggebrochenen Strukturen zu begründen. In der LVR Klinik Köln erfolgen 25 Behandlungen und im Marien-Hospital Euskirchen 16 Behandlungen. Alle anderen Kliniken im Rheinland rechneten weniger als zehn Fälle ab. Aus den Rückmeldungen der Kliniken wurde allerdings deutlich, dass bereits die fünf Stunden psychotherapeutischer Unterstützung zu einer klinischen Besserung bei den Betroffenen führte.

[1] Es handelt sich hierbei um die Ambulanzen psychiatrischer bzw. psychosomatischer Abteilungen, z. B. an den LVR-Kliniken, in denen von Gewalt betroffenen Menschen entsprechende Hilfe angeboten wird. Die Bereitstellung dieses Angebotes erfolgt im Rahmen der Hilfen des Opferentschädigungsgesetzes (OEG).

Es ist davon auszugehen, dass die Zahlen nicht die tatsächliche Inanspruchnahme der Kliniken abbilden, diese war mit Sicherheit deutlich höher. Die besondere Situation mit vielen Hilfesuchenden in relativ kurzer Zeit führte zu einer Überlastung der Angebotsstruktur in einigen OEG-TA, so dass Behandlungen von Betroffenen der Hochwasserkatastrophe auch im Regelversorgungssystem erfolgten.
Dies führte allerdings dazu, dass diese Betroffenen keine spezifische psychotherapeutische Frühintervention erhielten, also eine Behandlungseinheit von 50 Minuten Länge zur Aktivierung der Selbstheilungskräfte und präventivem Schwerpunkt, sondern wahrscheinlich die übliche psychiatrische bzw. psychosomatische Behandlungseinheit mit einem kurativen Schwerpunkt.

Insgesamt zeigt sich, dass zentralen Herausforderungen, die sich in der Versorgung der oft akuten und damit ungleichmäßig auftretenden Nachfrage (z.B. Großschadensereignisse, Fluchtbewegungen nach Kriegsereignissen, Gewalttaten etc.) ergeben, aktuell noch nicht strukturell entgegengetreten werden kann. Gerade im Bereich der Akuttraumatisierung ist es jedoch wichtig, ambulante psychotherapeutische Versorgungsstrukturen vorzuhalten, die von betroffenen Menschen zeitnah und niedrigschwellig aufgesucht werden können.

Gemeinsam mit dem LVR-Fachbereich 84 „Planung, Qualitäts- und Innovationsmanagement" wird gegenwärtig eine Studie als Traineeprojekt durchgeführt mit dem Ziel, Best-Practice-Modelle zu identifizieren und strukturelle Verbesserungen vorzuschlagen. Hierzu wird den politischen Ausschüssen zu gegebener Zeit berichtet werden.

Die bisherigen Erfahrungen mit den Sonderprogrammen Hochwasserhilfe und Ukrainehilfe (s. u.) machen deutlich, dass derartige Zusatzprogramme mit begleitenden Informationen kommuniziert werden müssen. So sollen künftig konkrete Handreichungen für die Kliniken die Umsetzung begleiten.

Nach den dem Fachbereich 54 vorliegenden Informationen stellen sich auch aktuell noch Menschen in den Kliniken vor, die bei sich psychische Beeinträchtigung in Folge der Hochwasserkatastrophe wahrnehmen. Es zeigt sich hier, dass nicht nur, wie oben ausgeführt, der Aufbau der Infrastruktur noch Jahre dauern kann, sondern, dass die Katastrophe auch bei den Menschen Spuren hinterlassen hat, die lange oder länger behandelt werden müssen.

II.
Mit der Vorlage „Hilfen für geflüchtete Menschen aus der Ukraine" (Vorlage Nr. 15/981) wurde über das Hilfsangebot für Menschen informiert, die als Folge des russischen Angriffskriegs aus der Ukraine flüchteten.

Das Angebot wurde Ende April 2022 kommuniziert, die Inanspruchnahme selbst ist bisher allerdings noch gering. Insgesamt haben bisher sieben Menschen das Angebot in Anspruch genommen, davon waren fünf minderjährig.

Aus den Rückmeldungen der Kliniken kann entnommen werden, dass dort insgesamt kaum Vorstellungen psychisch beeinträchtigter Kriegsgeflüchteter aus der Ukraine

erfolgen. Dieses wird vor allem damit erklärt, dass diese Menschen aktuell noch damit beschäftigt seien, eine neue Existenz aufzubauen bzw. sich um die Deckung anderer Grundbedarfe zu kümmern. Es wird damit gerechnet, dass mehr Vorstellungen in der zweiten Jahreshälfte zu erwarten sind.

In Vertretung

P r o f. D r. F a b e r

Die Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland

Qualität für Menschen

Vorlage Nr. 15/984

öffentlich

Datum: 09.05.2022
Dienststelle: Fachbereich 12
Bearbeitung: Herr Schröder

Ausschuss für Personal und allgemeine Verwaltung	**30.05.2022**	**Kenntnis**
Ausschuss für den LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen	**18.08.2022**	**Kenntnis**
Betriebsausschuss LVR-Jugendhilfe Rheinland	**30.08.2022**	**Kenntnis**
Krankenhausausschuss 3	**05.09.2022**	**Kenntnis**
Krankenhausausschuss 2	**06.09.2022**	**Kenntnis**
Krankenhausausschuss 4	**07.09.2022**	**Kenntnis**
Krankenhausausschuss 1	**08.09.2022**	**Kenntnis**
Gesundheitsausschuss	**09.09.2022**	**Kenntnis**

Tagesordnungspunkt:

Befristete Beschäftigungsverhältnisse 2021

Kenntnisnahme:

Der Bericht zur Entwicklung und zum aktuellen Stand der befristeten Beschäftigungsverhältnisse wird gemäß Vorlage Nr. 15/984 zur Kenntnis genommen.

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.	nein

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2020.	ja

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):

Produktgruppe:	
Erträge: Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan	Aufwendungen: /Wirtschaftsplan
Einzahlungen: Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:	Auszahlungen: /Wirtschaftsplan
Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:	
Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten	

In Vertretung

L i m b a c h

Zusammenfassung:

Mit der Vorlage Nr. 15/984 wird die bisherige Berichterstattung zum Thema „Befristete Beschäftigungsverhältnisse" für das Jahr 2021 fortgeschrieben.

Es wird berichtet über

- die Rechtsgrundlage und den aktuellen Stand der Rechtsprechung (s. I.1 und Anlage 1),
- die Entwicklung der Prozentanteile befristeter Beschäftigungsverhältnisse in den letzten zehn Jahren (s. I.3.1 und Anlagen 2 und 3),
- die Anzahl der Befristungen mit bzw. ohne Sachgrund, Vergleich Stichtag 31.12.2020 zum Stichtag 31.12.2021 (s. I.3.2 und Anlage 4),
- die Sachgründe gemäß § 14 Abs. 1 TzBfG zum Stichtag 31.12.2021 (s. I.3.3),
- die Übernahme befristet Beschäftigter in ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis im Jahr 2021 (s. I.3.4 und Anlage 5).

Mit Vorlage Nr. 15/257 wurde im letzten Jahr berichtet, dass der Anteil befristeter Verträge bezogen auf den gesamten LVR von 2019 auf 2020 auf den bis dahin niedrigsten Wert seit elf Jahren gesunken war (6,0 %).

Dieser Wert ist im letzten Jahr wieder minimal angestiegen (6,1 %).

Auch geschlechterspezifisch haben wir eine ähnliche Entwicklung.

Die Gründe, die zum Abschluss befristeter Verträge führen, haben sich indes nicht geändert.
Es handelt sich nach wie vor hauptsächlich um Vertretung unbefristet beschäftigten Personals, vorübergehend erhöhten Bedarf und Projektarbeiten.

Es ist positiv, dass der Anteil der sachgrundlos befristet Beschäftigten beim Landschaftsverband Rheinland weiter gesunken ist, auf nur noch 1,2 %.

Die Zahl der Übernahmen befristet beschäftigten Personals in unbefristete Beschäftigung, Ausbildungsverhältnisse oder Qualifizierungsmaßnahmen liegt mit 361 niedriger als im Vorjahr.

Begründung der Vorlage Nr. 15/984:

Inhalt

Vorbemerkungen 3

I. Befristete Beschäftigung beim LVR im Jahr 2021 4

I.1 Rechtsgrundlage der befristeten Beschäftigungsverhältnisse 4

I.2 Auswertungssystematik 4

I.3 Entwicklung 5

I.3.1 Befristete Beschäftigungsverhältnisse seit 2010 5

I.3.2 Entwicklung befristeter Beschäftigung nach Rechtsgrundlage 9

I.3.3 § 14 Abs. 1 TzBfG – Einzelne Sachgründe 11

I.3.4 Übernahme befristet Beschäftigter in unbefristete Beschäftigung 12

II. Informationen aus Veröffentlichungen 13

II.1 Bundesministerium für Arbeit und Soziales 13

II.2 Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) 14

III. Fazit 16

Vorbemerkungen

Im Rahmen der Beratungen zum Stellenplanentwurf 2010 wurde die Verwaltung erstmalig um Erläuterungen zu den befristeten Beschäftigungsverhältnissen beim LVR gebeten. Dem ist die Verwaltung mit der Vorlage Nr. 13/499 für den PA am 12.07.2010 nachgekommen.

Die Verwaltung wurde beauftragt, regelmäßig Zahlen zu den befristeten Beschäftigungsverhältnissen vorzulegen. Dies erfolgte mit den Vorlagen

- 13/1296,
- 13/2346,
- 13/2483 (überarbeitete Fassung der Vorlage 13/2346)
- 13/3068,
- 14/417 und 14/417/1,
- 14/1277,
- 14/2006,
- 14/2733
- 14/3393
- 14/3966
- 15/257.

Mit der Vorlage Nr. 15/984 werden die in den oben genannten Vorlagen aufgeführten Daten für das Jahr 2021 fortgeschrieben.

Der Vorlage sind beigefügt:

- Anlage 1:
  Erläuterungen zur Rechtsgrundlage und zum aktuellen Stand der Rechtsprechung

- Anlage 2:
  Übersicht der Prozentanteile befristeter Beschäftigungsverhältnisse der letzten zehn Jahre nach Organisationseinheiten

- Anlage 3:
  Übersicht der Prozentanteile befristeter Beschäftigungsverhältnisse zum Stichtag 31.12.2021 nach Geschlecht und Organisationseinheit

- Anlage 4:
  Übersicht der Befristungen mit bzw. ohne Sachgrund, Vergleich 31.12.2020 zu 31.12.2021

- Anlage 5:
  Übersicht zur Übernahme befristet Beschäftigter in ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis für das Jahr 2021

I. Befristete Beschäftigung beim LVR im Jahr 2021

I.1 Rechtsgrundlage der befristeten Beschäftigungsverhältnisse

Im Stellenplan, der gemäß §§ 1 und 8 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung - KomHVO) Teil des Haushaltsplanes ist, wird die seitens der politischen Vertretung beschlossene Anzahl der Stellen für Beamtinnen, Beamte und der nicht nur vorübergehend Beschäftigten ausgewiesen. Diesem Beschluss voraus geht die verwaltungsseitige Ermittlung des künftigen Stellenbedarfs, die in den Entwurf des Stellenplans mündet.
Sofern im Zeitraum der Bewirtschaftung eines genehmigten Stellenplans als Teil der Haushaltssatzung zusätzliche temporäre Personalbedarfe entstehen, die nicht vom Stellenplan abgedeckt sind, können sogenannte Zahlungsmöglichkeiten eingerichtet werden. Wenn Personal für solche zusätzlichen befristet anfallenden Aufgaben oder beispielsweise als Vertretung für unbefristet Beschäftigte erforderlich ist, besteht die Möglichkeit einer befristeten Beschäftigung.
Rechtsgrundlage für den Abschluss befristeter Beschäftigungsverhältnisse ist § 14 des Gesetzes über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge (Teilzeit- und Befristungsgesetz – TzBfG).
Differenziert wird hier nach Befristungen mit (§ 14 Abs. 1 TzBfG) und ohne sachlichen Grund (§ 14 Abs. 2 und 3 TzBfG).
Durch Verfügungen wird innerhalb des LVR sichergestellt, dass alle Bereiche Informationen zur generellen Anwendung des TzBfG und zur aktuellen Rechtsprechung erhalten.

I.2 Auswertungssystematik

Für die Auswertungen werden folgende Daten zugrunde gelegt:

- Personalbestand zum 31. Dezember des Jahres = Anzahl der aktiven Mitarbeitenden zum Stichtag
  Nicht berücksichtigt sind Personen in Sonderurlaub ohne Bezüge (z. B. Elternzeit, Rente auf Zeit) und Personen während der Freistellungsphase der Altersteilzeit. Ebenfalls nicht berücksichtigt sind Auszubildende, Nachwuchskräfte, Volontär*innen, Praktikant*innen, studentische Hilfskräfte, sowie Ärzt*innen, mit denen ein befristeter Arbeitsvertrag gemäß ÄArbVtrG (Gesetz über befristete Arbeitsverträge mit Ärzten in der Weiterbildung) abgeschlossen wurde und so genannte Psychotherapeuten in Ausbildung (PiA) nach dem Psychotherapeutengesetz (PsychThG).
- Befristet Beschäftigte = Anzahl bzw. der Anteil aller befristet Beschäftigten zum Stichtag 31. Dezember des Jahres, unabhängig davon, ob das befristete Beschäftigungsverhältnis ggf. zu einem späteren Zeitpunkt in ein unbefristetes umgewandelt wurde und auch unabhängig vom Beschäftigungsumfang. Hier sind also auch geringfügig Beschäftigte mit einbezogen.
  Nicht berücksichtigt sind Auszubildende, Nachwuchskräfte, Volontär*innen, Praktikant*innen, studentische Hilfskräfte, sowie Ärzt*innen, mit denen ein befristeter Arbeitsvertrag gem. ÄArbVtrG (Gesetz über befristete Arbeitsverträge mit Ärzten in der Weiterbildung) abgeschlossen wurde und so genannte Psychotherapeuten in Ausbildung (PiA) nach dem Psychotherapeutengesetz (PsychThG).
- Für die Darstellungen nach Organisationseinheiten wird soweit wie möglich die am 31.12.2021 geltende Struktur zugrunde gelegt.

I.3 Entwicklung

I.3.1 Befristete Beschäftigungsverhältnisse seit 2010

Bezogen auf den Stichtag 31. Dezember eines jeden Jahres ist der Anteil der befristet Beschäftigten insgesamt ab 2011 zurückgegangen.
Eine Ausnahme bildete das Jahr 2016 mit einem minimalen Anstieg und das darauffolgende Jahr mit einem konstanten Niveau.




Abbildung 1: Anteil befristet Beschäftigter in Prozent; Frauen, Männer und Durchschnittswert (jeweils für den gesamten LVR)

Im Jahr 2021 kam es auf niedrigem Niveau zu einem minimalen Wiederanstieg um 0,1 Prozentpunkte.

Mit **Anlage 3** ist eine detaillierte Aufschlüsselung der befristeten Beschäftigungen nach Geschlecht und Organisationseinheit zum Stichtag 31.12.2021 beigefügt.

Ergänzend zur Abbildung 1 lassen sich die Entwicklungen in den einzelnen Dezernaten und sonstigen Organisationseinheiten der **Anlage 2** entnehmen. Dort ist eine tabellarische Übersicht über die Entwicklung der letzten zehn Jahre aufgeführt.

In den LVR-Dezernaten (NKF-Bereich) kam es in den letzten beiden Jahren zu einem gewissen Anstieg. Vom bisherigen Tiefstwert (4,9 %) im Jahr 2019 stieg die Befristungsquote zunächst in 2020 auf 6,0 Prozent und im letzten Jahr auf 8,0 %.
Der auffälligste Anstieg entfällt dabei auf das LVR-Dezernat Schulen, Inklusionsamt, Soziale Entschädigung, was sich – wie bereits im Vorjahr – auf den pandemiebedingt vergrößerten Personalbestand infolge der neuen Aufgaben des LVR auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) zurückführen lässt.

Im LVR-Dezernat Kultur und Landschaftliche Kulturpflege sind die befristeten Arbeitsverträge regelmäßig damit zu begründen, dass es viele drittmittelfinanzierte wissenschaftliche Projektarbeiten im Rahmen der Forschungstätigkeit der Kulturdienststellen des LVR gibt.
Die Zahlungsmöglichkeiten werden für ein in sich abgeschlossenes spezielles wissenschaftliches Projekt eingerichtet. Die Besetzung erfolgt ausgerichtet auf den Projektinhalt mit Wissenschaftler*innen, die sich möglichst schon während ihres Studiums in dieser Richtung Spezialkenntnisse angeeignet haben.
In einigen Fällen werden durch die Fördergeber (z. B. Deutsche Forschungsgemeinschaft, Thyssen-Stiftung) die einzustellenden Fachkräfte namentlich benannt, andere Fördergeber (z. B. das Land NRW) schließen die Förderung von unbefristet eingestelltem Personal durch entsprechende Bewilligungsbedingungen zum Förderbescheid aus.
Die Ergebnisse der Projektarbeiten ergänzen den Stand der wissenschaftlichen Forschung zusätzlich zu dem durch die Landschaftsverbandsordnung zugewiesenen kulturellen Forschungsauftrag. Die Ergebnisse werden oft in wissenschaftlichen Publikationen des LVR veröffentlicht.
Gezielte Maßnahmen, um die befristeten Verträge mit und ohne Sachgrund dauerhaft dezernatsbezogen zu reduzieren, werden für das LVR-Dezernat 9 nicht gesehen, da dann die fachlich inhaltliche Arbeit des Dezernates erheblich eingeschränkt werden würde. Mögliche drittmittelfinanzierte Forschungsprojekte und Mittel aus neuen Förderlinien des Landes oder des Bundes könnten nicht mehr beantragt werden.
Von zusätzlichen Forschungen im Rahmen aktueller gesellschaftlicher Fragestellungen, wie dem dramatischen Strukturwandel im rheinischen Braunkohlenrevier, den durch das Land geförderten Forschungsvolontariaten der Kunstmuseen NRW oder zusätzlichen Veranstaltungs- und Ausstellungsvorhaben im Rahmen von Jahrestagen oder Jubiläen wäre der LVR ausgeschlossen. Die Wahrnehmung des Verbandes in der Öffentlichkeit würde hierdurch erheblich beeinträchtigt.
Das Denkmalförderungsprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen für die Bodendenkmalpflege wäre ebenfalls betroffen. Der LVR ist in der Vergangenheit gegenüber dem Land immer wieder massiv dafür eingetreten, dass für diese vom Land an den LVR übertragene Aufgabe, auch Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden. Das Land kann allerdings aufgrund seiner Vorgaben zur Förderung nur befristetes Personal finanzieren. Wenn der LVR auf diese Fördermittel verzichten würde, wäre dies äußerst kontraproduktiv.

LVR-InfoKom:

LVR-InfoKom ist seit sechs Jahren auf einem konstant niedrigen Niveau zwischen 1,0 % und 1,7 % befristet Beschäftigter.

LVR-Krankenhauszentralwäscherei:

Die LVR-Krankenhauszentralwäscherei konnte die Quote der befristet Beschäftigten seit 2017 von 19,0 % auf 5,4 % senken. Allein von 2020 zu 2021 sank die Quote um 40 %.

LVR-Jugendhilfe Rheinland:

Die Befristungsquote der LVR-Jugendhilfe Rheinland pendelte in den letzten zehn Jahren zwischen 10 und 18 %. Nach zwei Jahren mit ca. 13 % ist die Quote im letzten Jahr wieder auf 16,8 % angestiegen.

Die LVR-Jugendhilfe Rheinland unterliegt sowohl in fachlicher, organisatorischer als auch wirtschaftlicher Hinsicht besonderen Rahmenbedingungen, die auch in Zukunft einen gewissen Teil an Stellen mit Sachgrundbefristungen notwendig machen.
Die LVR-Jugendhilfe Rheinland ist mit ihren Standorten Solingen, Tönisvorst, Euskirchen und Remscheid über einen sehr großen Flächenkreis im Rheinland tätig. Die Entfernungswege von Standort zu Standort betragen bis zu 90 Kilometer. Ein flexibler standortübergreifender Einsatz von Mitarbeitenden ist daher schwierig und verursacht hohe Kosten.
In jedem Einzelfall wird jedoch grundsätzlich geprüft, ob ein Arbeitsvertrag unbefristet ausgestellt werden kann, um Mitarbeitenden in der LVR-Jugendhilfe Rheinland eine langfristige Perspektive zu ermöglichen. Die LVR-Jugendhilfe Rheinland ist grundsätzlich daran interessiert, die Befristungsquote der Beschäftigten – insbesondere die sachgrundlosen Befristungen – so gering wie möglich zu halten.
Die Notwendigkeit von Sachgrundbefristungen ergibt sich bei der LVR-Jugendhilfe Rheinland vor allem aufgrund von:

- Elternzeit- und Krankheitsvertretungen
- Erschließung neuer Angebotsformen, Einzelpädagogische Maßnahmen, Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF), insbesondere auch mit Nichtfachkräften und Projekten
- Sonstige Befristungen, Abfederung von regelmäßig auftretenden Belegungsschwankungen und zeitlich befristeten Betreuungsmaßnahmen in Form von Fachleistungsstunden

Ein detaillierter Einblick in die Gründe für Befristungen der Jugendhilfe Rheinland kann der Vorlage Nr. 14/3104 entnommen werden.

LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen:

Der LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen konnte die niedrige Quote des Vorjahres noch einmal um 0,1 Prozentpunkte senken. Somit ist die Befristungsquote in den letzten zehn Jahren von 15,8 % auf 6,5 % gesunken.

LVR-Institut für Forschung und Bildung:

Das im letzten Jahr neugeründete LVR-Institut für Forschung und Bildung hat mit 40 % augenscheinlich die höchste Befristungsquote aller Organisationseinheiten. Diese lässt sich allerdings auf die Größe zurückführen. Bei nur 25 Mitarbeitenden zum Stichtag 31.12.2021 wirken sich zahlenmäßig wenige Befristungen prozentual sehr stark aus.
Vergleichszahlen aus den Vorjahren gibt es nicht. Die LVR-Akademie für seelische Gesundheit, welche in das Institut eingegliedert worden ist, war in den Vorjahren als Außendienststelle des LVR-Dezernates „Klinikverbund und Verbund Heilpädagogische Hilfen" in dessen Befristungsquote integriert. Die Quote des Dezernates 8 sank in der Folge von 4,6 % in 2020 auf 0,8 % im Jahr 2021.

LVR-Klinikverbund:

Im LVR-Klinikverbund kam es in sechs Kliniken zu einem Rückgang der befristeten Beschäftigungsverhältnisse, in vier Klinken zu einer Zunahme.

Insgesamt ist die Befristungsquote im Klinikverbund in den letzten zehn Jahren aber um mehr als Hälfte gesunken. Im letzten Jahr lag diese im Durchschnitt nur noch bei 4,9 %.




Abbildung 2: Altersstruktur der befristet Beschäftigten in absoluten Zahlen, aufgeteilt nach Geschlecht




Abbildung 3: Altersstruktur der befristet Beschäftigten nach Geschlecht; darüber der prozentuale Anteil der Altersgruppe an der Gesamtzahl der befristet Beschäftigten

Nach absoluten Zahlen sind mehr Frauen als Männer befristet beschäftigt. Die prozentuale Aufteilung auf die Geschlechter ist dabei jedoch die Gleiche wie im LVR insgesamt. Das Verhältnis Frauen zu Männern liegt im gesamten Verband etwa bei 2/3 zu 1/3.

65 % und somit knapp 2/3 aller befristet Beschäftigten entfallen auf die Gruppe der bis 40- jährigen.
Der mit 38 % größte Teil entfällt auf die Berufseinsteiger (21 bis 30 Jahre).

I.3.2 Entwicklung befristeter Beschäftigung nach Rechtsgrundlage

Unter Punkt I.1 und in der **Anlage 1** wurde bereits auf § 14 des Gesetzes über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge (TzBfG) eingegangen.
Differenziert wird nach Befristungen mit (§ 14 Abs. 1 TzBfG) und ohne sachlichen Grund (§ 14 Abs. 2 und 3 TzBfG).




Abbildung 4: Aufteilung der befristeten Beschäftigungsverhältnisse in solche mit bzw. ohne Sachgrund, in Prozent

Der Anteil der befristeten Beschäftigungsverträge ohne Sachgrund lag zwischen 2010 und 2018 stets auf einem relativ konstanten Niveau zwischen ca. 51 und 59 Prozent. (vgl. **Abbildung 4**).
In den letzten drei Jahren ist der Anteil der sachgrundlosen Befristungen auf weniger als 1/5 gesenkt worden (für die Aufschlüsselung nach Organisationseinheiten und die absoluten Zahlen vgl. **Anlage 4**).
Die Bemühungen der einzelnen Organisationseinheiten, den Anteil der ohne Sachgrund befristet Beschäftigten aufgrund der Vorgabe des Verwaltungsvorstandes zu reduzieren, ist somit deutlich erkennbar.

Vor dem Hintergrund der politischen Diskussionen über eine gesetzliche Reglementierung des Anteils sachgrundloser Befristungen auf maximal 2,5 % der Beschäftigten eines Betriebs (bei mehr als 75 Mitarbeitenden) und der zunehmenden Schwierigkeiten bei der Personalakquise hat der Verwaltungsvorstand bereits im Februar 2018 entschieden, den Anteil sachgrundloser Befristungen möglichst weit zu senken.
Organisationseinheiten mit einer Anzahl sachgrundlos befristeter Verträge oberhalb der immer wieder politisch diskutierten 2,5 %-Schwelle sind im letzten Jahr nur noch das LVR-Dezernat 9 mit seinen Kulturaußendienststellen, die LVR-Krankenhauszentralwäscherei sowie die LVR-Kliniken Bedburg-Hau.
Dem stehen die LVR-Dezernate 0, 2, 3, 4, 6, 7 und 8 sowie das LVR-Institut für Forschung und Bildung und die LVR-Klinik Mönchengladbach gegenüber, die keine sachgrundlos befristeten Mitarbeitenden beschäftigen.
Es ist fraglich, ob die von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil bereits in der letzten Legislaturperiode geplante und bereits für Mitte 2019 angekündigte Überarbeitung des TzBfG mit einer Beschränkung der sachgrundlosen Befristung auf 2,5 % sowie einer Begrenzung von sogenannten Kettenbefristungen in der neuen Regierungskoalition und unter den aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen noch kommen wird.
Im Koalitionsvertrag sieht die neue Bundesregierung von einer generellen Abschaffung der sachgrundlosen Befristungen ab. Nur beim Staat soll die Möglichkeit der Befristung aus Haushaltsgründen abgeschafft werden.
Falls es doch noch zu einer solchen Regelung kommt, ist das für den LVR verwaltungsseitig geplante Verfahren nach Inkrafttreten bereits in der Vorlage Nr. 14/2733 für die Sitzung des Ausschusses für Personal und allgemeine Verwaltung am 02.07.2018 beschrieben worden.
Aus Gerechtigkeits- und Praktikabilitätsgründen wird jede Organisationseinheit des LVR die Reduzierung der sachgrundlosen Befristungen auf die künftigen gesetzlichen Höchstwerte verfolgen müssen bzw. diese idealerweise dauerhaft unterschreiten.
Ferner wird ausgeschlossen, dass einzelne Organisationseinheiten den Anteil deutlich überschreiten, dieser jedoch durch ein gesetzeskonformes Gesamtbild über den LVR insgesamt nivelliert wird.
Ausnahmen können nur für das Kulturdezernat mit seinen zahlreichen fremdfinanzierten Projekten und die Krankenhauszentralwäscherei mit ihrer besonderen Aufgabenstruktur gelten, solange der Gesamt-LVR unter 2,5 % bleibt.
Um zu vermeiden, dass bei jeder Neueinstellung zunächst zu prüfen ist, ob mit diesem Arbeitsvertrag eventuell die Höchstgrenze überschritten wird, wird sich der Anteil sachgrundloser Beschäftigungsverhältnisse dauerhaft unter 2,5 % bewegen müssen.

Als Begründung für den Abschluss sachgrundlos befristeter Arbeitsverträge wird im Allgemeinen - nicht nur beim LVR - regelmäßig eine größere Rechtssicherheit im Vergleich zu einer Befristung mit Sachgrund angeführt.
Dies ist damit zu erklären, dass die Sachgründe für eine Befristung gemäß Teilzeit- und Befristungsgesetz vollumfänglich der arbeitsgerichtlichen Nachprüfbarkeit unterliegen.
Darüber hinaus bieten sachgrundlos befristete Arbeitsverträge die Möglichkeit, befristet eingestelltes Personal flexibler einzusetzen.
Insbesondere im Bereich der LVR-Kliniken erfolgt der Abschluss von befristeten Arbeitsverträgen ohne Sachgrund dann, wenn es sich nicht um Vertretungen im Einzelfall handelt, sondern generell Arbeitszeitreduzierungen des unbefristet beschäftigten Personals aufzufangen sind. So wird unter dem Gesichtspunkt „familienfreundlicher Arbeitgeber" den Anträgen unbefristet Beschäftigter auf Anpassung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit je nach familiärer Situation im Regelfall entsprochen.

Darüber hinaus wurde durch die zum 01.01.2019 eingeführte „Brückenteilzeit", welche zeitlich befristete Teilzeitarbeit mit einem Rückkehrrecht in die vorherige Arbeitszeit ermöglicht, den Mitarbeitenden ein hohes Maß an Flexibilität in der persönlichen Arbeitszeitgestaltung eingeräumt, auf die der Arbeitgeber bei der Planung entsprechend reagieren muss.
Es ist zutreffend, dass sich eine solche Flexibilität vor allem infolge der sachgrundlosen Beschäftigungsmöglichkeit ergibt. Zudem ist in beschäftigungspolitischer Hinsicht auch zu bedenken, dass ein sachgrundlos befristetes Arbeitsverhältnis typischerweise die Brücke in eine unbefristete Beschäftigung bedeuten kann. Würde der Gesetzgeber diesen Weg nicht anerkennen, müsste er in letzter Konsequenz die sachgrundlose Befristung in Gänze unterbinden.
Die Beschäftigungspolitik des LVR zeichnet sich neben einer Begrenzung derartiger befristeter Beschäftigungsverhältnisse auch dadurch aus, dass möglichst viele Mitarbeitende in eine unbefristete Beschäftigung oder in Ausbildungsverhältnisse oder Qualifizierungsmaßnahmen übernommen werden sollen (vgl. hierzu auch Gliederungspunkt **I.3.4** sowie **Anlage 5**).

Soweit aufgrund befristeter Personalbedarfslagen sogenannte Zahlungsmöglichkeiten eingerichtet werden, sieht die Personalpolitik des LVR vor, auch in diesen Konstellationen nach Möglichkeit auf eine Befristung des Arbeitsverhältnisses zu verzichten.
Dies setzt voraus, dass das Dezernat, in welchem die Zahlungsmöglichkeit eingerichtet wird, zusichert, dass die einzustellende Person auch nach Wegfall des befristeten Bedarfs dauerhaft - dann auf einer regulären Planstelle - beschäftigt werden kann.
Darüber hinaus besteht auch für auf Zahlungsmöglichkeiten geführte Mitarbeitende die Option, sich auf vakante Planstellen im LVR anderweitig zu bewerben.
Mit dieser Praxis wird der LVR seinem Anspruch als sozialer Arbeitgeber gerecht und versucht soweit möglich, insbesondere jüngeren Beschäftigten frühzeitig die Planungssicherheit eines unbefristeten Beschäftigungsverhältnisses zu verschaffen.

I.3.3 § 14 Abs. 1 TzBfG – Einzelne Sachgründe




Abbildung 5: Befristungen mit Sachgrund (§ 14 Abs. 1 TzBfG und § 21 BEEG) zum 31.12.2021; Verteilung nach den gesetzlich zur Verfügung stehenden Befristungsgründen

Von den zum 31.12.2021 vorhandenen befristeten Beschäftigungsverhältnissen erfolgte in 80,9 % (s. Punkt **I.3.2**) der Fälle - bei 881 Verträgen - der Vertragsabschluss gemäß § 14 Abs. 1 TzBfG oder § 21 BEEG[1], also mit Sachgrund.

Es wird deutlich, dass der Sachgrund „Vertretung" (sowohl nach § 14 Abs. 1 TzBfG als auch nach § 21 BEEG) bei Personalausfällen mit 29 % den wichtigsten Grund für die Befristung darstellt.
In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass zum 31.12.2021 von den 21.235 Mitarbeitenden des LVR 938 Personen als so genannte „Ruhend-Fälle" deklariert waren.
Darunter versteht man Personen, die zurzeit nicht zur Dienstleistung zur Verfügung stehen (Mitarbeitende in der Freizeitphase der Altersteilzeit, in Elternzeit oder sonstiger unbezahlter Freistellung). Dieser Personenkreis muss entsprechend vertreten werden und dies zum Teil eben nur zeitlich befristet.

Pandemiebedingt folgt auf Platz zwei mit 24 % ein vorübergehend erhöhter betrieblicher Bedarf. Es wird erwartet, dass dieser Befristungsgrund in den nächsten Jahren wieder abnehmen wird.

Auch der Sachgrund „Durchführung von Projekten" ist mit 15 % signifikant.

Zusammen machen die vorgenannten drei Gründe mehr als 2/3 der befristeten Beschäftigungsverhältnisse mit Sachgrund aus.

Immerhin 79 Verträge wurden im Jahr 2021 auf Wunsch der/des Beschäftigten nur befristet geschlossen.

I.3.4 Übernahme befristet Beschäftigter in unbefristete Beschäftigung

Wie der **Anlage 5** entnommen werden kann, wurden 361 Personen in ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis, in eine Ausbildung oder in eine Qualifizierungsmaßnahme übernommen.
In absoluten Zahlen sind dies 54 Personen weniger als in 2020 (415 Personen).

Übernahmequote

2017	32,0 %
2018	34,4 %
2019	34,4 %
2020	38,5 %
2021	35,3 %

[1] Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz – BEEG); § 21 BEEG regelt die befristete Beschäftigung mit Sachgrund aufgrund Mutterschutz- oder Elternzeitvertretung




Abbildung 6: Übernahme in unbefristete Beschäftigung/Ausbildung/Qualifizierungsmaßnahme im Jahr 2021

II.Informationen aus Veröffentlichungen

Pandemiebedingt ist das Thema „Befristete Beschäftigung" in den letzten beiden Jahren weder politisch noch gesellschaftlich nennenswert in Erscheinung getreten.

Zahlen für 2021 sind zum Zeitpunkt der Vorlagenerstellung noch nicht veröffentlicht worden. Hilfsweise werden daher die Zahlen von 2020 herangezogen.

II.1 Bundesministerium für Arbeit und Soziales

Die Zahl der sachgrundlos befristeten Arbeitsverträge ist im Jahr 2020 kaum gesunken, wie aus der Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine schriftliche Frage der Linken-Abgeordneten Susanne Ferschl hervorgeht.[2]

Demnach waren 2020 knapp 1,4 Millionen oder 55,5 Prozent der insgesamt 2,4 Millionen befristeten Arbeitsverträge ohne Angabe eines Sachgrunds durch die Arbeitgeber befristet.

[2] Frankfurter Allgemeine Zeitung: Artikel vom 17.12.2021

Im Jahr 2019 hatte das für rund 1,6 Millionen oder 59 Prozent von insgesamt 2,8 Millionen befristeten Arbeitsverträgen gegolten.

Den Zahlen des Arbeitsministeriums zufolge entfielen 2020 aber nur 74.000 sachgrundlose Befristungen auf den öffentlichen Sektor, während in der Privatwirtschaft mehr als eine Million Verträge ohne Sachgrund befristet waren.


II.2 Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB)

Auch bei der befristeten Beschäftigung zeigen sich die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie. 2020 nahm die Bedeutung der befristeten Beschäftigung insgesamt weiter ab und es wurden deutlich weniger befristet Beschäftigte in ein unbefristetes Vertragsverhältnis übernommen.

Sowohl die Zahl als auch der Anteil der befristeten Beschäftigung sind das zweite Jahr in Folge zurückgegangen. Waren 2018 noch etwa 3,2 Millionen beziehungsweise 8,3 Prozent aller Beschäftigungsverhältnisse befristet, waren es Mitte 2020 nur noch 2,4 Millionen oder 6,3 Prozent. Bedingt ist das hauptsächlich durch die sinkende Zahl der Neueinstellungen: Sowohl unbefristete als auch befristete Verträge wurden weniger häufig neu geschlossen.

Abb. 1: Entwicklung befristeter Beschäftigung, 2001 bis 2020

in Prozent und absolut




Anmerkung: Der Anteil der befristeten Beschäftigungsverhältnisse bezieht sich auf die betriebliche Gesamtbeschäftigung ohne Auszubildende. Sie umfasst neben sozialversicherungspflichtig Beschäftigten auch nicht sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Beamte/Beamtenanwärter, tätige Inhaber und mithelfende Familienangehörige) sowie geringfügige und sonstige Beschäftigte. Die Daten wurden jeweils zum 30.06. erhoben.

Quelle: IAB-Betriebspanel 2001–2020, hochgerechnete Werte. © IAB

Gegenüber 2019 sank der Anteil der Übernahmen in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis von 44 auf 39 Prozent. Der Anteil der nicht verlängerten Verträge ging von 31 auf 29 Prozent leicht zurück. Der Anteil der Personen, die den Betrieb nach Auslaufen ihres Vertrags verlassen haben, stieg signifikant von 25 auf 32 Prozent. Besonders deutlich zeigt sich dieses

Muster im Verarbeitenden Gewerbe, im Gastgewerbe und in der Nahrungs- und Genussmittelindustrie.



Das IAB führt dazu aus, dass sich Befristungen für die Beschäftigten vor allem in Krisenzeiten als Problem darstellen, weil sie dann deutlich seltener als Brücke in unbefristete Beschäftigung dient. Bei einem erneuten konjunkturellen Aufschwung sei aber zu erwarten, dass Befristungen wieder an Bedeutung gewinnen und in der Folge auch die Übernahmen in unbefristete Beschäftigung erneut zulegen werden.

Die Analysen basieren auf Daten des IAB-Betriebspanels vom Sommer 2020.[3] Die Anteile der befristeten Beschäftigungsverhältnisse beziehen sich auf die betriebliche Gesamtbeschäftigung ohne Auszubildende. Sie umfasst neben sozialversicherungspflichtig Beschäftigten auch nicht sozialversicherungspflichtig Beschäftigte sowie geringfügig und sonstige Beschäftigte.

[3] https://www.iab-forum.de/befristungen-im-zweiten-jahr-in-folge-ruecklaeufig/

III. Fazit

Mit Vorlage 15/257 wurde im letzten Jahr berichtet, dass der Anteil befristeter Verträge bezogen auf den gesamten LVR von 2019 auf 2020 auf den bis dahin niedrigsten Wert seit elf Jahren gesunken war (6,0 %).

Dieser Wert ist im letzten Jahr wieder minimal angestiegen (6,1 %).

Auch geschlechterspezifisch haben wir eine ähnliche Entwicklung.

Die Gründe, die zum Abschluss befristeter Verträge führen, haben sich indes nicht geändert.
Es handelt sich nach wie vor hauptsächlich um Vertretung unbefristet beschäftigten Personals, vorübergehend erhöhten Bedarf und Projektarbeiten.

Es ist positiv, dass der Anteil der sachgrundlos befristet Beschäftigten beim Landschaftsverband Rheinland weiter gesunken ist, auf nur noch 1,2 %.

Die Zahl der Übernahmen befristet beschäftigten Personals in unbefristete Beschäftigung, Ausbildungsverhältnisse oder Qualifizierungsmaßnahmen liegt mit 361 niedriger als im Vorjahr.

In Vertretung

L i m b a c h

§ 14 des Gesetzes über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge (Teilzeit- und Befristungsgesetz - TzBfG)

- **§ 14 Abs. 1 TzBfG - Befristungen mit sachlichem Grund**

  Nach dem Grundsatz des § 14 Abs. 1 TzBfG ist für die Befristung des Arbeitsverhältnisses ein sachlicher Grund erforderlich. Dahinter steht die Überlegung, dass durch die Befristung nicht die zwingenden Kündigungsschutzvorschriften umgangen werden dürfen.
  Das Gesetz nennt - nicht abschließend - sachliche Gründe:

  1. den nur vorübergehenden betrieblichen Bedarf der Arbeitsleistung;
  2. Übernahme nach Ausbildung/Studium, um den Übergang in eine Anschlussbeschäftigung zu erleichtern;
  3. Vertretung (zum Beispiel für die Dauer eines Beschäftigungsverbotes nach dem Mutterschutzgesetz, für die Dauer einer Elternzeit);
  4. die Befristung rechtfertigende Eigenart der Arbeitsleistung;
  5. Erprobung;
  6. in der Person des Arbeitnehmers/der Arbeitnehmerin liegende Gründe;
  7. Beschäftigung aus Haushaltsmitteln, die haushaltsrechtlich für eine befristete Beschäftigung bestimmt sind;
  8. gerichtlicher Vergleich.

- **§ 14 Abs. 2 TzBfG - Befristungen ohne sachlichen Grund**

  Gemäß § 14 Abs. 2 TzBfG ist ausnahmsweise eine Befristung ohne sachlichen Grund (sog. erleichterte Befristung) zulässig. Ein solcher Arbeitsvertrag kann bis zu einer Gesamtdauer von zwei Jahren dreimal verlängert werden.
  Sachgrundlose Befristungen sind möglich, wenn es sich um eine Neueinstellung handelt, d. h. der/die Mitarbeitende vorher weder befristet noch unbefristet bei demselben Arbeitgeber beschäftigt war.
  Vorherige andere Vertragsverhältnisse - z. B. als Auszubildende/r, Praktikant/in - stehen einer sachgrundlosen Befristung eines Arbeitsverhältnisses nicht entgegen.

  Wurde dieses sogenannte Vorbeschäftigungsverbot aufgrund des Wortlauts der Vorschrift zunächst als zeitlich unbeschränktes Anschlussverbot angesehen, hat das Bundesarbeitsgericht (BAG) 2011 seine Rechtsprechung dahingehend geändert, dass nur Vorbeschäftigungen innerhalb der letzten drei Jahre einer erneuten sachgrundlosen Befristung entgegenstehen.
  Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat 2018 (Beschluss vom 6. Juni 2018, Az. 1 BvL 7/14 und Az. 1 BvR 1375/14) dieser Auslegung widersprochen und entschieden, dass sachgrundlose Befristungen zwischen denselben Vertragsparteien auf die erstmalige Begründung eines Arbeitsverhältnisses beschränkt sind.
  Nach diesem Urteil des BVerfG musste das BAG seine Rechtsprechung zu § 14 Abs. 2 TzBfG ändern. Diese Gelegenheit bot sich erstmals am 23.01.2019 (7 AZR 733/16). Leider bringt auch diese Neujustierung für die Praxis nicht die erwünschte Rechtssicherheit, da das BVerfG und – ihm nun folgend – das BAG das Vorbeschäftigungsverbot in verfassungskonformer Auslegung des § 14 Abs. 2 Satz 2 TzBfG nicht für absolut

halten. Vielmehr seien Ausnahmefälle denkbar, bei denen eine sachgrundlose Befristung trotz Vorbeschäftigung zulässig sein könne. Zum Beispiel, wenn eine Vorbeschäftigung sehr lange zurückliegt, ganz anders geartet war oder von sehr kurzer Dauer gewesen ist. Ab wann eine Vorbeschäftigung „sehr lange zurückliegt", lassen die Gerichte leider offen.
Durch die Entscheidung des BVerfG ist also lediglich in der Beziehung Rechtssicherheit eingekehrt, dass „zuvor" nicht pauschal auf einen Zeitraum von drei Jahren beschränkt werden könne. Es kann aus der Entscheidung des BVerfG hingegen nicht herausgelesen werden, dass ein „zuvor" immer im Sinne von „niemals zuvor" zu verstehen ist.

Im Anschluss an das Urteil des BVerfG wurden beim LVR vorsorglich alle Beschäftigungsverhältnisse, die aufgrund § 14 Abs. 2 TzBfG geschlossen wurden, überprüft und im Falle einer vorherigen Tätigkeit beim LVR angepasst bzw. umgewandelt.

Näheres regelt die Verfügung vom 08.10.2014 (Az.: 12.30-044-05/31/2322).

- **§ 14 Abs. 3 TzBfG – Befristete Arbeitsverträge mit älteren Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen**

  Die kalendermäßige Befristung eines Arbeitsvertrages **ohne Vorliegen eines sachlichen Grundes** ist bis zu einer Dauer von fünf Jahren zulässig, wenn der Arbeitnehmer/die Arbeitnehmerin bei Beginn des befristeten Arbeitsverhältnisses das 52. Lebensjahr vollendet hat und unmittelbar vor Beginn des befristeten Arbeitsverhältnisses mindestens vier Monate beschäftigungslos im Sinne des § 138 Absatz 1 Nummer 1 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch gewesen ist, Transferkurzarbeitergeld bezogen oder an einer öffentlich geförderten Beschäftigungsmaßnahme nach dem Zweiten oder Dritten Buch Sozialgesetzbuch teilgenommen hat.

  Mit Urteil vom 28.05.2014 (Az.: 7 AZR 360/12) entschied das BAG, dass die Regelung des § 14 Abs. 3 TzBfG in der ab dem 01.05.2007 geltenden Fassung, jedenfalls soweit es um die erstmalige Anwendung zwischen denselben Arbeitsvertragsparteien geht, mit Unionsrecht und nationalem Verfassungsrecht vereinbar ist.
  Eine wiederholte Inanspruchnahme der Befristungsmöglichkeit des § 14 Abs. 3 TzBfG ist, auch wenn sie durch einen gesetzlichen Befristungstatbestand gedeckt sein sollte, im Interesse der Rechtssicherheit zu vermeiden (vgl. Verfügung vom 06.10.2015, Az.: 12.30-044-05/29/2355).

Anteil der befristeten Beschäftigungsverhältnisse zum 31.12. der Jahre 2012 bis 2021

(alle Angaben ohne Auszubildende, Nachwuchskräfte, Volontariate, Praktika, stud. Hilfskräfte, Freiw. soz. bzw. ökolog. Jahr u.ä.; Ärztinnen/Ärzte in Weiterbildung, AT Vertrag befristet)[1]

		Befristete Beschäftigung in %									
LVR-Dezernate/wie Eigenbetriebe geführte Einrichtungen		**31.12.2012**	**31.12.2013**	**31.12.2014**	**31.12.2015**	**31.12.2016**	**31.12.2017**	**31.12.2018**	**31.12.2019**	**31.12.2020**	**31.12.2021**
0	Organisationsbereich LVR-Direktorin	3,1	2,1	2,2	3,0	3,1	3,1	1,0	1,0	0,0	1,0
1	Personal und Organisation[2]	4,8	3,5	3,3	4,7	2,9	2,1	1,7	2,0	2,3	1,0
2	Finanzmanagement, Kommunalwirtschaft und Europaangelegenheiten	1,2	1,6	1,0	1,4	0,6	0,0	0,0	0,6	0,7	0,0
3	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, Umwelt, Energie, Bauen für Menschen GmbH				2,0	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0
4	Kinder, Jugend und Familie	5,6	7,0	6,9	7,0	5,6	6,7	6,4	6,6	7,1	10,3
5	Schulen, Inklusionsamt, Soziale Entschädigung	12,3	10,9	11,6	11,9	10,4	11,2	9,2	5,6	9,6	14,3
6	Digitalisierung, IT-Steuerung, Mobilität und technische Innovation								0,0	0,0	0,0
7	Soziales	1,7	3,0	3,0	1,5	2,4	1,4	2,3	1,8	0,9	1,1
8	Klinikverbund und Verbund Heilpädagogischer Hilfen[3]	16,2	8,0	7,0	5,3	5,9	2,5	2,6	4,0	4,6	0,8
9	Kultur und Landschaftliche Kulturpflege	16,9	17,7	13,7	15,7	14,1	13,8	9,1	10,0	9,9	11,7
	Durchschnitt LVR-Dezernate	**8,5**	**8,3**	**7,4**	**8,3**	**7,6**	**7,4**	**5,8**	**4,9**	**6,0**	**8,0**
13	**LVR-InfoKom**	**12,9**	**11,5**	**9,1**	**5,0**	**1,7**	**1,2**	**1,4**	**1,0**	**1,4**	**1,4**
241	**LVR-Krankenhauszentralwäscherei**	**17,6**	**20,8**	**11,2**	**11,0**	**15,4**	**19,0**	**12,9**	**10,7**	**9,0**	**5,4**
499	**LVR-Jugendhilfe Rheinland**	**10,2**	**11,5**	**10,9**	**12,1**	**17,7**	**18,1**	**15,4**	**13,2**	**13,4**	**16,8**
820	**LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen**	**15,8**	**15,3**	**15,5**	**13,0**	**12,5**	**12,2**	**13,0**	**8,1**	**6,6**	**6,5**
840	**LVR-Institut für Forschung und Bildung**										**40,0**
LVR-Klinikverbund											
850	Bedburg-Hau	16,2	17,0	13,5	11,4	13,4	14,8	9,5	9,6	8,9	5,9
851	Bonn	5,5	3,7	4,3	4,0	4,9	3,3	3,6	4,3	3,8	4,1
852	Düren	8,1	8,1	6,3	3,7	4,0	5,9	5,6	2,7	1,9	2,2
853	Düsseldorf	20,3	16,8	13,6	12,6	12,6	10,2	12,3	8,5	6,2	5,4
854	Langenfeld	7,5	6,8	7,8	6,1	5,9	7,0	6,4	4,3	4,1	3,3
855	Viersen	10,7	8,2	7,6	8,9	9,7	9,1	11,3	7,9	6,9	5,3
862	Essen	15,2	13,8	16,0	10,5	10,6	12,4	14,9	7,8	7,4	7,9
863	Köln	5,2	4,0	4,7	3,5	5,6	7,1	6,2	6,1	5,3	5,0
864	Mönchengladbach	7,9	10,4	10,7	13,7	11,9	5,6	5,3	5,8	6,4	6,2
884	Orthopädie Viersen	10,3	6,3	10,0	14,2	11,4	5,3	4,7	3,7	4,8	7,3
	Durchschnitt LVR-Klinikverbund	**11,1**	**10,0**	**9,2**	**7,9**	**8,7**	**8,7**	**8,3**	**6,5**	**5,7**	**4,9**
Summen/Durchschnitt Gesamt-LVR		**11,3**	**10,6**	**9,9**	**8,9**	**9,1**	**9,1**	**8,5**	**6,4**	**6,0**	**6,1**

[1] nur "Aktive" (inkl. Tarifbeschäftigte SER): Zu den "Aktiven" zählen nicht Personen in unbezahlter Beurlaubung (z.B. Elternzeit), Rente auf Zeit und Personen während der Freistellungsphase der Altersteilzeit.

[2] Zeitverträge in Dezernat 1 inklusive "JSB-Pool" - Zeitverträge mit schwerbehinderten Jugendlichen (zum 31.12.2021: 2 Personen)

[3] Dezernat 8: In 2011 und 2012 erhöhter Anteil befristet Beschäftigter wegen ThUG (Therapieunterbringungsgesetz)

Anteil der befristeten Beschäftigungsverhältnisse zum 31.12.2021 nach Geschlecht

(alle Angaben ohne Auszubildende, Nachwuchskräfte, Volontariate, Praktika, stud. Hilfskräfte, Freiw. soz. bzw. ökolog. Jahr u.ä.; Ärztinnen/Ärzte in Weiterbildung, AT Vertrag befristet)[1]

LVR-Dezernate/wie Eigenbetriebe geführte Einrichtungen		% Frauen	% Männer	% gesamt
0	Organisationsbereich LVR-Direktorin	1,4%	0,0%	1,0%
1	Personal und Organisation[2]	0,0%	2,5%	1,0%
2	Finanzmanagement, Kommunalwirtschaft und Europaangelegenheiten	0,0%	0,0%	0,0%
3	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, Umwelt, Energie, Bauen für Menschen GmbH	0,0%	0,0%	0,0%
4	Kinder, Jugend und Familie	11,3%	8,0%	10,3%
5	Schulen, Inklusionsamt, Soziale Entschädigung	12,8%	17,9%	14,3%
6	Digitalisierung, IT-Steuerung, Mobilität und technische Innovation	0,0%	0,0%	0,0%
7	Soziales	1,3%	0,8%	1,1%
8	Klinikverbund und Verbund Heilpädagogischer Hilfen	1,2%	0,0%	0,8%
9	Kultur und Landschaftliche Kulturpflege	16,0%	7,2%	11,7%
	Summe/Durchschnitt LVR-Dezernate	**8,4%**	**7,2%**	**8,0%**
13	**LVR-InfoKom**	**0,8%**	**1,7%**	**1,4%**
241	**LVR-Krankenhauszentralwäscherei**	**8,8%**	**1,6%**	**5,4%**
499	**LVR-Jugendhilfe Rheinland**	**14,9%**	**19,8%**	**16,8%**
820	**LVR-Verbund Heilpädagogische Hilfen**	**5,8%**	**8,4%**	**6,5%**
840	**LVR-Institut für Forschung und Bildung**	**44,4%**	**28,6%**	**40,0%**
LVR-Klinikverbund				
850	Bedburg-Hau	6,5%	4,9%	5,9%
851	Bonn	4,1%	4,0%	4,1%
852	Düren	2,2%	2,2%	2,2%
853	Düsseldorf	4,8%	6,4%	5,4%
854	Langenfeld	2,8%	4,1%	3,3%
855	Viersen	6,4%	3,2%	5,3%
862	Essen	9,4%	4,4%	7,9%
863	Köln	5,4%	4,3%	5,0%
864	Mönchengladbach	7,5%	2,5%	6,2%
884	Orthopädie Viersen	4,7%	14,0%	7,3%
	Summe/Durchschnitt LVR-Klinikverbund	**5,2%**	**4,3%**	**4,9%**
Summe/Durchschnitt Gesamt-LVR		**6,3%**	**5,8%**	**6,1%**

[1] nur "Aktive" (inkl. Tarifbeschäftigte SER):
Zu den "Aktiven" zählen nicht Personen in unbezahlter Beurlaubung (z.B. Elternzeit), Rente auf Zeit und Personen während der Freistellungsphase der Altersteilzeit.

[2] Zeitverträge in Dezernat 1 inkl. "JSB-Pool" - Zeitverträge mit 2 schwerbehinderten Jugendlichen.

Zahl der befristeten Beschäftigungsverhältnisse

hier: Vergleich der Rechtsgrundlagen zum Stand 31.12.2020 und zum Stand 31.12.2021

(alle Angaben ohne Auszubildende, Nachwuchskräfte, Volontariate, Praktika, stud. Hilfskräfte, Freiw. soz. bzw. ökolog. Jahr u.ä.; Ärztinnen/Ärzte in Weiterbildung, AT Vertrag befristet)[1]

	LVR-Dezernate/wie Eigenbetriebe geführte Einrichtungen	Personal-bestand 31.12.2020	mit Sachgrund[2]	ohne Sachgrund[3]	mit Sachgrund	ohne Sachgrund	Personal-bestand 31.12.2021	mit Sachgrund[2]	ohne Sachgrund[3]	mit Sachgrund	ohne Sachgrund
0	Organisationsbereich LVR-Direktorin	101	0	0	0,00%	0,00%	101	1	0	0,99%	0,00%
1	Personal und Organisation	308	3	4	0,97%	1,30%	311	2	1	0,64%	0,32%
2	Finanzmanagement, Kommunalwirtschaft und Europaangelegenheiten	150	1	0	0,67%	0,00%	145	0	0	0,00%	0,00%
3	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, Umwelt, Energie, Bauen für Menschen GmbH	179	1	0	0,56%	0,00%	183	0	0	0,00%	0,00%
4	Kinder, Jugend und Familie	295	21	0	7,12%	0,00%	340	35	0	10,29%	0,00%
5	Schulen, Inklusionsamt, Soziale Entschädigung	1.136	98	11	8,63%	0,97%	1.291	173	11	13,40%	0,85%
6	Digitalisierung, IT-Steuerung, Mobilität und technische Innovation	12	0	0	0,00%	0,00%	19	0	0	0,00%	0,00%
7	Soziales	753	7	0	0,93%	0,00%	790	9	0	1,14%	0,00%
8	Klinikverbund und Verbund Heilpädagogischer Hilfen	131	4	2	3,05%	1,53%	121	1	0	0,83%	0,00%
9	Kultur und Landschaftliche Kulturpflege	796	53	26	6,66%	3,27%	815	64	31	7,85%	3,80%
	Durchschnitt LVR-Dezernate	**3.861**	**188**	**43**	**4,87%**	**1,11%**	**4.116**	**285**	**43**	**6,92%**	**1,04%**
13	**LVR-InfoKom**	**418**	**5**	**1**	**1,20%**	**0,24%**	**424**	**4**	**2**	**0,94%**	**0,47%**
241	**LVR-Krankenhauszentralwäscherei**	**133**	**6**	**6**	**4,51%**	**4,51%**	**129**	**3**	**4**	**2,33%**	**3,10%**
499	**LVR-Jugendhilfe Rheinland**	**447**	**55**	**5**	**12,30%**	**1,12%**	**464**	**73**	**5**	**15,73%**	**1,08%**
820	**LVR-Verbund Heilpädagogische Hilfen**	**2.561**	**160**	**8**	**6,25%**	**0,31%**	**2.603**	**163**	**7**	**6,26%**	**0,27%**
840	**LVR-Institut für Forschung und Bildung**						**25**	**10**	**0**	**40,00%**	**0,00%**
LVR-Klinikverbund											
850	Bedburg-Hau	1.628	97	48	5,96%	2,95%	1.712	50	51	2,92%	2,98%
851	Bonn	1.376	41	11	2,98%	0,80%	1.415	41	17	2,90%	1,20%
852	Düren	1.079	17	3	1,58%	0,28%	1.132	15	10	1,33%	0,88%
853	Düsseldorf	1.045	44	21	4,21%	2,01%	1.077	36	22	3,34%	2,04%
854	Langenfeld	996	22	19	2,21%	1,91%	1.061	19	16	1,79%	1,51%
855	Viersen	1.329	37	55	2,78%	4,14%	1.363	48	24	3,52%	1,76%
862	Essen	692	50	1	7,23%	0,14%	708	55	1	7,77%	0,14%
863	Köln	1.044	48	7	4,60%	0,67%	1.056	49	4	4,64%	0,38%
864	Mönchengladbach	295	13	6	4,41%	2,03%	305	19	0	6,23%	0,00%
884	Orthopädie Viersen	147	7	0	4,76%	0,00%	177	11	2	6,21%	1,13%
	Durchschnitt LVR-Klinikverbund	**9.631**	**376**	**171**	**3,90%**	**1,78%**	**10.006**	**343**	**147**	**3,43%**	**1,47%**
Summen/Durchschnitt Gesamt-LVR		**17.051**	**790**	**234**	**4,63%**	**1,37%**	**17.767**	**881**	**208**	**4,96%**	**1,17%**

nachrichtlich: Aufteilung nach Geschlecht

davon Frauen:	584	142	5,09%	1,24%
davon Männer:	297	66	4,71%	1,05%

[1] nur "Aktive" (inkl. Tarifbeschäftigte SER): Zu den "Aktiven" zählen nicht Personen in unbezahlter Beurlaubung (z.B. Elternzeit), Rente auf Zeit und Personen während der Freistellungsphase der Altersteilzeit.

[2] Befristungen mit sachlichem Grund gemäß § 14 Abs. 1 TzBfG und § 21 BEEG

[3] Befristungen ohne sachlichen Grund gemäß § 14 Abs. 2 und 3 TzBfG

Übernahme von befristet Beschäftigten in ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis in 2021

(alle Angaben ohne Auszubildende, Nachwuchskräfte, Volontariate, Praktika, stud. Hilfskräfte, Freiw. soz. bzw. ökolog. Jahr u.ä.; Ärztinnen/Ärzte in Weiterbildung, AT Vertrag befristet)[1]

In Einzelfällen erfolgte eine unbefristete Übernahme nicht in dem Dezernat/dem Eigenbetrieb, in dem zuvor ein befristes Beschäftigungsverhältnis bestand. Entsprechendes gilt für die Übernahme in Ausbildung/Qualifizierungsmaßnahme.

		Übernahmen in		
LVR-Dezernate/wie Eigenbetriebe geführte Einrichtungen		**unbefristete Beschäftigungs-verhältnisse**	**Ausbildungs- oder Qualifizierungs-verhältnisse[2]**	**Gesamt**
LVR-Dezernate				
0	Organisationsbereich LVR-Direktorin			
1	Personal und Organisation	2		2
2	Finanzmanagement, Kommunalwirtschaft und Europaangelegenheiten			
3	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, Umwelt, Energie, Bauen für Menschen GmbH			
4	Kinder, Jugend und Familie	7		7
5	Schulen, Inklusionsamt, Soziale Entschädigung	24		24
6	Digitalisierung, IT-Steuerung, Mobilität und technische Innovation	2		2
7	Soziales	4		4
8	Klinikverbund und Verbund Heilpädagogischer Hilfen	1		1
9	Kultur und Landschaftliche Kulturpflege	10	1	11
13	**LVR-InfoKom**	2		2
241	**LVR-Krankenhauszentralwäscherei**	6		6
499	**LVR-Jugendhilfe Rheinland**	10	2	12
820	**LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen**	49	2	51
840	**LVR-Institut für Forschung und Bildung**	1		1
LVR-Klinikverbund				
850	Bedburg-Hau	71	6	77
851	Bonn	14		14
852	Düren	5	1	6
853	Düsseldorf	17	8	25
854	Langenfeld	26		26
855	Viersen	52	1	53
862	Essen	7	2	9
863	Köln	11	8	19
864	Mönchengladbach	6	1	7
884	Orthopädie Viersen	2		2
Summen/Durchschnittswert		**329**	**32**	**361**

[1] nur "Aktive" (inkl. Tarifbeschäftigte SER): Zu den "Aktiven" zählen nicht Personen in unbezahlter Beurlaubung (z.B. Elternzeit), Rente auf Zeit und Personen während der Freistellungsphase der Altersteilzeit.

[2] Dazu zählen Ausbildungsverhältnisse, Praktika, Volontariate, "Arzt in Weiterbildung".

TOP 9 Maßregelvollzug

Die Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland

Qualität für Menschen

Vorlage Nr. 15/1060

öffentlich

Datum:	27.07.2022
Dienststelle:	Fachbereich 82
Bearbeitung:	Herr Lüder

Krankenhausausschuss 4	**07.09.2022**	**Kenntnis**
Gesundheitsausschuss	**09.09.2022**	**Kenntnis**

Tagesordnungspunkt:

Bericht zum Ausbau forensischer Neubauten in der LVR-Klinik Bedburg-Hau (Campus II)

Kenntnisnahme:

Der Bericht zum Ausbau forensischer Neubauten in der LVR-Klinik Bedburg-Hau (Campus II) wird gemäß Vorlage Nr. 15/1060 zur Kenntnis genommen.

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.	ja

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2025.	nein

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):

Produktgruppe:	
Erträge: Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan	Aufwendungen: /Wirtschaftsplan
Einzahlungen: Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:	Auszahlungen: /Wirtschaftsplan
Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:	
Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten	

In Vertretung

W e n z e l - Ja n k o w s k i

Zusammenfassung:

Zwischen dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS) und dem Landschaftsverband Rheinland sind die Neubaumaßnahmen abgestimmt, mittels derer alte abgängige Bausubstanz (insbesondere die Häuser 5, 25 und 28) durch zeitgemäße Stations- und Therapiegebäude ersetzt werden sollen. Die Planungen sind mit der Gemeinde Bedburg-Hau abgestimmt.

Auf dem Südteil des Klinikgeländes soll ein sogenannter Campus II entstehen mit drei neuen Stationsgebäuden mit jeweils 69 Behandlungsplätzen sowie weiteren Gebäuden für Arbeits-, Sport- und Gartentherapie. Darüber hinaus sollen in den zwei Bestandsgebäuden (26 und 36) Büroräume, Räumlichkeiten für Kreativtherapie und zwei Sozialzentren entstehen.

Der Campus II soll durch einen 5,5 m hohen Sicherheitszaun umgeben werden. Der Zugang erfolgt ausschließlich durch ein zentrales Pfortengebäude, welches gleichfalls neu errichtet wird.

Das MAGS hat die Planungen sowohl Vertreter*innen des Rates der Gemeinde Bedburg-Hau wie auch dem Forensikbeirat vorgestellt.

Auszüge aus der PowerPoint-Präsentation des Landes sind dieser Vorlage als Anlage mit entsprechenden Erläuterungen beigefügt.

Begründung der Vorlage Nr. 15/1060:

Die Verwaltung hatte mit Vorlage Nr. 15/61 zu Beginn der Legislaturperiode über die aktuelle Situation im Maßregelvollzug berichtet und bezüglich der anstehenden Bauvorhaben in den LVR-Kliniken informiert.

Der Ausbau der Forensik in der LVR-Klinik Bedburg-Hau erfolgt in zwei Schritten.

Bezüglich der LVR-Klinik Bedburg-Hau war ausgeführt, dass in einem ersten Schritt ein Gebäude mit 69 Plätzen für Frauen neben einem Pfortengebäude errichtet wird. Diese Gebäude werden im 4. Quartal an den LVR zur Nutzung übergeben.

Darüber hinaus wurde berichtet, dass in einem zweiten Schritt als Ersatz für die abgängigen Gebäude 25 und 28 zwei weitere Stationsgebäude mit jeweils 69 Plätzen sowie weitere Gebäude für die Arbeits- und Sporttherapie errichtet werden – der sogenannte Campus II.

Unter der Federführung des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS), welches bei forensischen Neubauvorhaben die Funktion des Bauherrn innehat, gab es verschiedene Abstimmungsgespräche zur Entwicklung der Zielplanung für den Maßregelvollzug in der LVR-Klinik Bedburg-Hau.

An den Gesprächen waren Vertreter*innen der LVR-Klinik Bedburg-Hau, des Dez. 8 aus der Verbundzentrale und der Gemeinde Bedburg-Hau beteiligt.

Zwischenzeitlich hat der Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes NRW (BLB) im Auftrag des MAGS ein Architekturbüro mit der Planung der weiteren Gebäude beauftragt.

Das Architekturbüro hat in Abstimmung mit dem MAGS, der LVR-Klinik Bedburg-Hau und dem Fachbereich 82 der Verbundzentrale die Planung des sogenannten Campus II begonnen und den städtebaulichen Entwurf abgestimmt.

Das MAGS hat die Planungsüberlegungen am 06.04.2022 Vertreter*innen der Gemeindeverwaltung Bedburg-Hau und am 08.06.2022 im Forensikbeirat der LVR-Klinik Bedburg-Hau vorgestellt.

Mittels dieser Vorlage soll der aktuelle Planungsstand den Mitgliedern des KA 4 und des GA vorgestellt werden. Dabei wird auf Folien aus der PowerPoint-Präsentation des MAGS zurückgegriffen, die am 08.06.2022 im Forensikbeirat gehalten wurde.

Die Folien sind als Anlage beigefügt und nummeriert:

Folie 1 zeigt ein Luftbild der Gebäude, die im ersten Schritt zurzeit erstellt werden.

Im Vordergrund am unteren Bildrand ist die neue Pforte zu erkennen. Dahinter die Bestandsgebäude 27 und 26 sowie neben ihnen der dreigeschossige Neubau mit Staffelgeschoss, in dem 69 Behandlungsplätze für Frauen, die gem. § 126a StPO bzw.

§ 63 StGB untergebracht sind.

Alle drei Gebäude sind von einem 5,5 Meter hohen Sicherheitszaun umgeben. Der gesicherte Bereich kann lediglich durch das Pfortengebäude am unteren Bildrand betreten werden.

In Haus 27 werden auf zwei Stationen männliche Patienten und weibliche Patientinnen gem. § 64 StGB behandelt.

Im Haus 26 entstehen Büros und ein Sozial- und Therapiezentrum für Frauen.

Der Neubau und das Haus 27 werden durch Ordnungszäune voneinander getrennt, so dass es zu keiner Vermischung von Männern und Frauen kommt, bzw. von Patient*innen die gem. § 63 und § 64 StGB untergebracht sind.

Folie 2 zeigt die Außenansicht des Neubaus mit 69 Behandlungsplätzen. Zurzeit findet der Innenausbau statt.

Die Übergabe an den LVR ist für das vierte Quartal 2022 geplant.

Folien 3a und 3b zeigen die Zaunanlage, die um den ersten Bauabschnitt errichtet wird. Von der Konstruktion und Funktion her entspricht er der Zaunanlage, die um den ersten Neubau (Campus I) entstanden ist.

Folie 4 zeigt aus der Obersicht den städtebaulichen Entwurf, wie er sich nach Fertigstellung des Campus II darstellt.

Rechts oben sind die Gebäude 26, 27 und der Neubau für die Frauenforensik zu erkennen.

Am unteren Bildrand, aufgereiht am südlichen Rundweg sind die Gebäude dargestellt, die innerhalb des Campus II für Zwecke des Maßregelvollzugs genutzt werden.

Links beginnend mit Haus 32, in dem 26 Behandlungsplätze für männliche Patienten gem. § 64 StGB entstehen sollen. Die Herrichtung des Gebäudes erfolgt durch die LVR-Klinik Bedburg-Hau.

Dann folgt am südlichen Rundweg das Haus 36, das für Zwecke der Kreativtherapie und als Sozialzentrum für die Patienten gem. § 64 StGB hergerichtet werden soll.

Nördlich von Haus 36 sollen die beiden Stationsgebäude mit jeweils 69 Plätzen für männliche Patienten gem. § 64 StGB entstehen.

Am rechten Rand des Grundstücks sollen am südlichen Rundweg die Sport- und Arbeitstherapiehallen entstehen.

Zwischen der Arbeitstherapiehalle und dem sogenannten „Frauenhaus" soll im Rahmen der Arbeitstherapie ein Gebäude für das Angebot der Gartentherapie entstehen.

Der gesamte Bereich des Campus II wird dann von einem Sicherheitszaun umgeben, wie er zurzeit im Rahmen des ersten Ausbauschritts entsteht.

Der zentrale Zugang erfolgt durch das Pfortengebäude, welches zurzeit errichtet wird.

In dem außerhalb des Campus II am südlichen Rundweg gelegenen Haus 38 sollen die beiden forensischen Überleitungs- und Nachsorgeambulanzen untergebracht werden. Dazu wird das Gebäude, in dem aktuell männliche Patienten gem. § 64 StGB untergebracht sind, nach Fertigstellung des Neubaus freigezogen und von der LVR-Klinik für die neuen Aufgaben hergerichtet.

Die Folien 5a–f zeigen die Grundrisse und Ansichten der Therapiegebäude für Sport, Arbeitstherapie und Gartenbau.

In Vertretung

W e n z e l - J a n k o w s k i

Ministerium für Arbeit,
Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Neubau 69er Gebäude und Pforte




Patientinnengebäude (F8)



Ministerium für Arbeit,
Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen


Sicherheitszaunanlage im Bereich Gebäude 27





Ministerium für Arbeit,
Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Sicherheitszaunanlage




Einsetzen der Polycarbonat Platten



Zusätzlich Crapal-Wellengitter (h = 3,50 m)


Ministerium für Arbeit,
Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Geplante Belegung der Gebäude




Ministerium für Arbeit,
Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Sporthalle (Grundriss ca. 32 m x 20 m)




Ministerium für Arbeit,
Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Sporthalle Ansichten (Höhe ca. 5,80 m)



Ministerium für Arbeit,
Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Arbeitstherapie Grundriss




Ministerium für Arbeit,
Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Arbeitstherapie - Ansichten und Schnitt



Ansicht Süd




Schnitt A-A



Ansicht Ost


Ministerium für Arbeit,
Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Gartenbau - Grundriss




Ministerium für Arbeit,
Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Gartenbau - Ansichten und Schnitte



Schnitt A-A



Schnitt B-B



Ansicht Süd



Ansicht Ost



Schnitt C-C



Ansicht West





Hörstel Gewächshaus

Die Direktorin des Landschaftsverbandes
LVR-Klinik Langenfeld

Qualität für Menschen

Vorlage Nr. 15/1166

öffentlich

Datum: 15.08.2022
Dienststelle: LVR-Klinik Langenfeld
Bearbeitung: Frau Beyer

Krankenhausausschuss 2	**06.09.2022**	**Kenntnis**
Gesundheitsausschuss	**09.09.2022**	**Kenntnis**

Tagesordnungspunkt:

Erweiterung des forensischen Fachbereiches um eine Abteilung Forensik III

Kenntnisnahme:

Die Erweiterung des forensischen Fachbereiches in der LVR-Klinik Langenfeld um eine Abteilung Forensik III wird gemäß Vorlage Nr. 15/1166 zur Kenntnis genommen.

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.	nein

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2025.	nein

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):

Produktgruppe:	
Erträge: Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan	Aufwendungen: /Wirtschaftsplan
Einzahlungen: Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:	Auszahlungen: /Wirtschaftsplan
Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:	
Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten	

Für den Klinikvorstand:

T h e w e s
Vorsitzender des Vorstands


Zusammenfassung:

Die Erweiterung des forensischen Fachbereiches in der LVR-Klinik Langenfeld um eine Abteilung Forensik III ab 01.09.2022 wird gemäß Vorlage Nr. 15/1166 zur Kenntnis genommen.


Begründung der Vorlage Nr. 15/1166:

Ausgangssituation

Der forensische Fachbereich der LVR-Klinik Langenfeld beinhaltet zurzeit die Abteilungen I und II mit dem Schwerpunkt zur Behandlung von gemäß § 63 StGB untergebrachten Patienten. Die Behandlung der gemäß § 64 StGB untergebrachten Patienten ist organisatorisch der Abteilung für Abhängigkeitserkrankungen der LVR-Klinik Langenfeld zugeordnet. Auf der Station 40a werden forensische Patienten mit einer stark ausgeprägten geistigen Behinderung behandelt. Diese Station ist deswegen eingebunden in das „Behandlungszentrum für Inklusive Medizin" der AP1.



Die Patientenzahl der gemäß § 64 StGB untergebrachten Patienten ist seit dem Jahr 2020 stark steigend. Die hierfür eingerichtete Station 11/12a wird oberärztlich geleitet. Die im Bettenplan vorgesehenen 20 Betten sind z.Zt. zu rd. 200% ausgelastet.



Gründe für die Neuorganisation zum 01. September 2022

Zum 1. Juli 2022 wurde die Chefarztposition der Abteilung für Abhängigkeitserkrankungen der LVR-Klinik Langenfeld neu besetzt. Das wurde zum Anlass genommen, die organisatorische Zuordnung der gemäß § 64 StGB untergebrachten Patienten zu überdenken.

Angesichts der weiter zunehmenden Unterbringungszahlen im Bereich der gemäß § 64 StGB untergebrachten Patienten und damit einhergehend auch zunehmender Zahl von beurlaubten und ambulant zu behandelnden Patienten steigt auch in diesem Bereich die Gefahr von Komplikationen (Entweichungen, Rückführungen). Dies führt zu der Planung, diesen Bereich zu einem eigenständigen und chefärztlich geleiteten Ressort umzustrukturieren. Es würde damit ermöglicht werden, die bewährten Kommunikationsstrukturen des bisherigen forensischen Fachbereichs auszuweiten und die Behandlung gemäß § 64 StGB in strategische und inhaltliche Planungen mit einzubeziehen, die mittlerweile im Rahmen von gesetzlichen Änderungen und Vorgaben des Ministeriums beständig anzupassen sind.

Vor dem Hintergrund der Planungen für einen neuen MRV-Standort in Wuppertal, der als spezielle § 64 Einrichtung geplant wird, kann damit auch konzeptionell unterstützt werden.


Neue Abteilungsstruktur ab dem 01. September 2022

Die zukünftige Struktur wird zum 01.09.2022 umgesetzt und hat folgende Struktur:

Die Abteilung Forensik I ist weiterhin zuständig für die Fachbereichsleitung und für die Spezialbereiche Intelligenzminderungen, Persönlichkeitsstörung, Entlassungsvorbereitung, Ambulanz und Nachsorge (68 stationäre Plätze plus ca. 80 Plätze für beurlaubte und entlassene Patienten). Sie wird chefärztlich durch die Ärztliche Direktorin Frau Jutta Muysers geleitet. Zu der Abteilung unter der OE-Ziffer 45.00 gehören 5 Stationen.

Die Abteilung Forensik II bleibt zuständig für die Aufnahme, Erstdiagnostik und erste Risikoeinschätzung und besitzt den Spezialbereich Behandlung von schizophrenen Erkrankungen (96 stationäre Patienten). Sie wird chefärztlich durch Frau Dr. Asiye Temur-Görgülü geleitet. Zu der Abteilung unter der OE-Ziffer 46.00 gehören 6 Stationen.

Die neue Abteilung Forensik III ist zuständig für die Behandlung von Abhängigkeitserkrankung mit dem Spezialbereich illegale Drogen, für die Beurlaubung, Entlassungsvorbereitung, Ambulanz und Nachsorge (20 stationäre Betten plus ca. 40 Plätze für beurlaubte und entlassene Patienten).



Die neue Abteilung Forensik III wird chefärztlich durch Herrn Martin Rinder, der bisher oberärztlich für die Station 11/12a zuständig war, geleitet. Er verfügt über eine langjährige Erfahrung in der Behandlung von Suchterkrankungen und ist gut mit Kooperationspartnern in der Suchthilfe vernetzt. Die pflegerische Leitung wird vorübergehend weiterhin durch die Pflegedienstleitung der Abteilung für Abhängigkeitserkrankungen, Frau Heike Lützenkirchen, wahrgenommen.

Gleichzeitig wird die Bettenzahl auf 40 erhöht werden. Dies entspricht bereits den heute vorhandenen untergebrachten Patienten. Die 40 Betten sind aus Sicht der LVR-Klinik Langenfeld als Maximalzahl zu verstehen. Weitere Überbelegungen, über die Zahl hinaus, sind nicht darstellbar.

Im MRV-Budget werden entsprechende zusätzliche Mittel für die Chefärztliche Leitung, die Pflegedienstleitung sowie ein gemeinsames Sekretariat vorgesehen.

Nach Fertigstellung der geplanten forensischen Klinik für 150 psychisch kranke und straffällig gewordene Männer im Landgerichtsbezirk Wuppertal ist für die LVR-Klinik Langenfeld vorstellbar, dass dort nach § 64 StGB Untergebrachte behandelt werden. Die Abteilung Forensik III wäre dann nur zeitlich befristet bis zur Inbetriebnahme des neuen Standortes am Standort Langenfeld implementiert.

Für den Klinikvorstand:

T h e w e s
Vorsitzender des Vorstandes

Klinikbelegung mit forensischen Patienten in 2021/2022

															davon:	gegendert		zusätzlich:			
																			davon		
		Aug 21	Sep 21	Okt 21	Nov 21	Dez 21	Jan 22	Feb 22	Mrz 22	Apr 22	Mai 22	Jun 22	Jul 22	**1. Aug. 22**	**in AP**	**♀**	**♂**	**langfristig beurlaubte**	**♀**	**langfr. beurlaubte in %**	**Behand-lungsplätze**
Forensische Kliniken																					
Bedburg-Hau	§ 63	202	202	200	203	200	200	200	197	205	200	202	198	**196**	**0**	**69**	**127**	**70**	**34**	**35,71%**	216
	§ 64	199	209	211	213	213	212	212	195	193	197	205	210	**217**	**7**	**17**	**200**	**70**	**8**	**32,26%**	182
	§ 126a	14	15	14	13	15	14	15	21	27	24	20	25	**25**	**0**	**21**	**4**				
	§ 81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**				
	sonstige *	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**				
	§ 46 StVollzG NRW**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**				
	Summe	415	427	426	430	428	426	427	413	425	421	427	433	**438**	**7**	**107**	**331**	**140**	**42**	**31,96%**	**398**
Düren	§ 63	217	216	220	220	222	225	222	223	223	221	218	219	**217**	**2**	**2**	**215**	**25**	**2**	**11,52%**	**218**
	§ 64	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**		
	§ 126a	15	14	13	13	13	14	17	16	14	12	9	11	**10**	**0**	**0**	**10**				
	§ 81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**				
	sonstige *	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	**2**	**0**	**0**	**2**				
	§ 46 StVollzG NRW**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**				
	Summe	236	234	237	237	239	242	242	243	240	237	231	234	**230**	**2**	**2**	**228**	**25**	**2**	**10,87%**	**218**
Langenfeld	§ 63	160	161	155	156	156	157	155	156	156	157	155	160	**163**	**0**	**0**	**163**	**36**	**0**	**22,09%**	171
	§ 64	38	39	38	39	38	37	37	38	34	39	39	39	**41**	**0**	**0**	**41**	**24**	**0**	**58,54%**	20
	§ 126a	7	6	6	5	6	5	6	8	9	13	14	11	**12**	**0**	**0**	**12**				
	§ 81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**				
	sonstige *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**				
	§ 46 StVollzG NRW**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**				
	Summe	205	206	199	200	200	199	198	202	199	209	208	210	**216**	**0**	**0**	**216**	**60**	**0**	**27,78%**	**191**
Viersen	§ 63	165	168	167	166	164	168	165	164	165	165	162	161	**163**	**6**	**0**	**163**	**20**	**0**	**12,27%**	166
	§ 64	39	39	41	42	41	40	40	39	38	45	46	45	**41**	**11**	**0**	**41**	**7**	**0**	**17,07%**	18
	§ 126a	5	3	3	4	4	5	7	9	9	7	8	11	**10**	**0**	**0**	**10**				
	§ 81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**0**	**0**	**0**	**0**				
	sonstige *	0	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	**0**	**0**	**0**	**0**				
	§ 46 StVollzG NRW**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**				
	Summe	209	211	212	213	210	214	213	214	213	218	218	218	**214**	**17**	**0**	**214**	**27**	**0**	**12,62%**	**184**
Köln	§ 63	210	208	205	207	214	211	212	216	214	213	214	211	**224**	**0**	**0**	**224**	**43**	**0**	**19,20%**	210
	§ 64	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**2**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**		
	§ 126a	11	9	9	8	7	6	7	7	8	11	10	9	**7**	**0**	**0**	**7**				
	§ 81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**				
	sonstige *	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	2	**1**	**0**	**0**	**1**				
	§ 46 StVollzG NRW**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**				
	Summe	222	218	216	217	223	219	220	224	223	226	226	223	**234**	**0**	**0**	**234**	**43**	**0**	**18,38%**	**210**
Essen	§ 63	14	10	11	12	6	5	3	4	1	2	3	2	**3**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**		
	§ 64	3	2	0	2	0	0	3	2	5	3	3	4	**3**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**		
	§ 126a	36	39	41	41	48	50	46	47	50	49	48	46	**48**	**0**	**0**	**48**				54
	§ 81	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**				
	sonstige *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**				
	§ 46 StVollzG NRW**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**				
	Summe	53	51	52	55	54	55	53	54	56	54	54	52	**54**	**0**	**0**	**54**	**0**	**0**	**0,00%**	**54**

*sonstige: § 453c StPO - Vorläufige Sicherungsmaßnahme im Widerrufsverfahren

§ 73 JGG - Unterbringung zur Beobachtung

**§ 46 StVollzG / § 24 UVollzG NRW - Interkurente Behandlung von Strafgefangenen aus der JVA / U-Haft

Klinikbelegung mit forensischen Patienten in 2021/2022

		Aug 21	Sep 21	Okt 21	Nov 21	Dez 21	Jan 22	Feb 22	Mrz 22	Apr 22	Mai 22	Jun 22	Jul 22	1. Aug. 22	davon: in AP	gegendert ♀	gegendert ♂	zusätzlich: langfristig beurlaubte	davon ♀	langfr. beurlaubte in %	Behand-lungsplätze
Allgemeinpsychiatrien																					
Bonn	§ 63	29	33	34	37	38	37	40	36	37	36	35	37	**36**	**36**	**1**	**35**	**14**	**0**	**38,89%**	**39**
	§ 64	0	1	1	1	1	2	1	0	0	0	1	1	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**		
	§ 126a	3	5	6	4	3	4	3	4	3	4	6	4	**4**	**4**	**0**	**4**				
	§ 81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**				
	sonstige *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**				
	§ 46 StVollzG NRW**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**				
	Summe	32	39	41	42	42	43	44	40	40	40	42	42	**41**	**41**	**1**	**40**	**14**	**0**	**34,15%**	**39**
Düsseldorf	§ 63	19	20	19	20	20	23	22	22	22	21	19	19	**19**	**19**	**0**	**19**	**10**	**0**	**52,63%**	**20**
	§ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	§ 126a	4	3	2	1	0	0	1	1	1	1	2	1	**2**	**2**	**0**	**2**				
	§ 81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**				
	sonstige *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**				
	§ 46 StVollzG NRW**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**				
	Summe	23	23	21	21	20	23	23	23	23	22	21	20	**21**	**21**	**0**	**21**	**10**	**0**	**47,62%**	**20**
Mönchengladbach	§ 63	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**		
	§ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	§ 126a	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**				
	§ 81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**				
	sonstige *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**				
	§ 46 StVollzG NRW**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**				
	Summe	2	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**

Gesamtbelegung LVR		Aug 21	Sep 21	Okt 21	Nov 21	Dez 21	Jan 22	Feb 22	Mrz 22	Apr 22	Mai 22	Jun 22	Jul 22	1. Aug. 22							
Summe	§ 63	1016	1018	1011	1021	1020	1027	1020	1019	1024	1016	1009	1008	**1022**	**63**	**72**	**949**	**218**	**36**	**21,33%**	**1040**
	§ 64	282	293	294	300	296	294	296	278	273	287	297	302	**306**	**19**	**17**	**289**	**101**	**8**	**33,01%**	**220**
	§ 126a	97	94	94	89	96	98	102	113	121	121	117	118	**118**	**6**	**21**	**97**	**0**			**54**
	§ 81	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
	sonstige *	2	4	5	5	4	3	2	3	2	4	4	5	**3**	**0**	**0**	**3**	**0**			
	§ 46 StVollzG NRW**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
Zwischensumme LVR	**ohne langfr. beurlaubte**	1397	1409	1404	1415	1416	1422	1421	1414	1420	1428	1428	1433	**1449**	**88**	**110**	**1338**	**319**	**44**	**22,02%**	**1314**
Zwischensumme LVR	**mit langfr. beurlaubten**	1700	1712	1715	1728	1731	1731	1741	1749	1749	1762	1758	1756	**1768**							
Zwischensumme LVR	**Beurlaubte**	303	303	311	313	315	309	320	335	329	334	330	323	**319**							

*sonstige: § 453c StPO - Vorläufige Sicherungsmaßnahme im Widerrufsverfahren
§ 73 JGG - Unterbringung zur Beobachtung

**§ 46 StVollzG / § 24 UVollzG NRW - Interkurente Behandlung von Strafgefangenen aus der JVA / U-Haft

Klinikbelegung mit forensischen Patienten in 2021/2022

		Aug 21	Sep 21	Okt 21	Nov 21	Dez 21	Jan 22	Feb 22	Mrz 22	Apr 22	Mai 22	Jun 22	Jul 22	**1. Aug. 22**	davon: **in AP**	**gegendert** ♀	**gegendert** ♂	**zusätzlich:** langfristig beurlaubte	**zusätzlich:** davon ♀	**zusätzlich:** langfr. beurlaubte in %	**Behand-lungsplätze**
Kliniken anderer Träger																					
NTZ-Duisburg	§ 64	101	100	101	101	100	101	102	101	103	101	100	97	**101**	**0**	**0**	**101**	**40**	**0**	**39,60%**	**100**
	Summe	101	100	101	101	100	101	102	101	103	101	100	97	**101**	**0**	**0**	**101**	**40**	**0**	**39,60%**	**100**
Fachklinik Im Deerth	§ 64	9	9	9	9	9	10	10	10	13	13	13	13	**13**	**13**	**0**	**13**	**3**	**0**	**23,08%**	**0**
	Summe	9	9	9	9	9	10	10	10	13	13	13	13	**13**	**13**	**0**	**13**	**3**	**0**	**23,08%**	**0**

Gesamtbelegung Kliniken anderer Träger		Aug 21	Sep 21	Okt 21	Nov 21	Dez 21	Jan 22	Feb 22	Mrz 22	Apr 22	Mai 22	Jun 22	Jul 22	**1. Aug. 22**	davon: **in AP**	**gegendert** ♀	**gegendert** ♂	**zusätzlich:** langfristig beurlaubte	**zusätzlich:** davon ♀	**zusätzlich:** langfr. beurlaubte in %	**Behand-lungsplätze**
Summe	§ 64	110	109	110	110	109	111	112	111	116	114	113	110	**114**	**13**	**0**	**114**	**43**	**0**	**37,72%**	**100**
Zwischensumme andere Träger	**ohne langfr. beurlaubte**	110	109	110	110	109	111	112	111	116	114	113	110	**114**	**13**	**0**	**114**	**43**	**0**	**37,72%**	**100**
Zwischensumme andere Träger	**mit langfr. beurlaubten**	147	150	151	154	151	154	157	157	159	159	158	157	**157**	**13**	**0**	**214**	**43**	**0**		
Zwischensumme andere Träger	**Beurlaubte**	37	41	41	44	42	43	45	46	43	45	45	47	**43**							

*sonstige: § 453c StPO - Vorläufige Sicherungsmaßnahme im Widerrufsverfahren

§ 73 JGG - Unterbringung zur Beobachtung

**§ 46 StVollzG / § 24 UVollzG NRW - Interkurente Behandlung von Strafgefangenen aus der JVA / U-Haft

Klinikbelegung mit forensischen Patienten in 2021/2022

		Aug 21	Sep 21	Okt 21	Nov 21	Dez 21	Jan 22	Feb 22	Mrz 22	Apr 22	Mai 22	Jun 22	Jul 22	1. Aug. 22	davon: in AP	gegendert ♀	gegendert ♂	zusätzlich: langfristig beurlaubte	zusätzlich: davon ♀	zusätzlich: langfr. beurlaubte in %	Behand-lungsplätze
Gesamtbelegung Rheinland																					
Summe	§ 63	1016	1018	1011	1021	1020	1027	1020	1019	1024	1016	1009	1008	**1022**	**63**	**72**	**949**	**218**	**36**	**21,33%**	**1040**
	§ 64	392	402	404	410	405	405	408	389	389	401	410	412	**420**	**32**	**17**	**403**	**144**	**8**	**34,29%**	**320**
	§ 126a	97	94	94	89	96	98	102	113	121	121	117	118	**118**	**6**	**21**	**97**				**54**
	§ 81	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	**0**	**0**	**0**	**0**				
	sonstige *	2	4	5	5	4	3	2	3	2	4	4	5	**3**	**0**	**0**	**3**				
	§ 46 StVollzG NRW**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**				
Gesamtsumme	**ohne langfr. beurlaubte**	1507	1518	1514	1525	1525	1533	1533	1525	1536	1542	1541	1543	**1563**	**101**	**110**	**1452**	**362**	**44**	**23,16%**	**1414**
Gesamtsumme	**mit langfr. beurlaubten**	1847	1862	1866	1882	1882	1885	1898	1906	1908	1921	1916	1913	**1925**							
	Beurlaubte	340	344	352	357	357	352	365	381	372	379	375	370	**362**							
Aufnahmen gem. § 63 StGB		6	12	5	10	13	9	9	6	10	11	12	1		**Gesamt:**		**104**				
Entlassungen gem. § 63 StGB		11	11	8	5	10	11	9	11	9	14	13	8		**Gesamt:**		**120**				

Warteliste	Aug 21	Sep 21	Okt 21	Nov 21	Dez 21	Jan 22	Feb 22	Mrz 22	Apr 22	Mai 22	Jun 22	Jul 22	1. Aug. 22	gegendert ♀	gegendert ♂	davon sofort	davon ♀
§ 63	18	18	18	18	19	19	22	20	19	20	19	20	**22**	**0**	**22**	**5**	**0**
§ 64 Alkohol	27	27	28	24	24	25	23	23	23	24	22	23	**21**	**3**	**18**	**16**	**3**
§ 64 Drogen	203	185	188	198	189	185	181	194	210	208	208	211	**220**	**12**	**208**	**148**	**10**
Summe	248	230	234	240	232	229	226	237	252	252	249	254	**263**	**15**	**248**	**169**	**13**

§ 63 StGB - Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus
§ 64 StGB - Unterbringung in einer Entziehungsanstalt
§ 126a StPO - Anordnung der einstweiligen Unterbringung
§ 81 StPO - Unterbringung zur Beobachtung
*sonstige: § 453c StPO - Vorläufige Sicherungsmaßnahme im Widerrufsverfahren
§ 73 JGG - Unterbringung zur Beobachtung
**§ 46 StVollzG / § 24 UVollzG NRW - Interkurente Behandlung von Strafgefangenen aus der JVA / U-Haft

TOP 10 Anträge und Anfragen

LVR-Klinik Viersen

LVR Qualität für Menschen

LVR-Klinikverbund

LVR-Klinik Viersen · Johannisstraße 70 · 41749 Viersen

Vorsitzende der Krankenhausausschüsse 1-4
und des Gesundheitsausschusses

Mitglieder und stellvertretende Mitglieder
der Krankenhausauschüsse 1-4 und des Gesundheitsausschusses

nachrichtlich:
Geschäftsführung der Fraktionen und
Gruppe in der Landschaftsversammlung
Rheinland

über Stabstelle 00.200

Datum und Zeichen bitte stets angeben

04.05.2022
855/13.00 CC Lebensmittel

Klinikvorstand
Kaufmännische Direktorin
Dorothee Enbergs

Frau Holthausen
Tel 02162 96-3500
Fax 02162 67759
Sabine.Holthausen@lvr.de

Beantwortung der Anfrage 15/31 „Modellprojekt Bio-Lebensmittel in LVR-Kliniken" der Fraktion Die Linke.

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Anfrage 15/31 wird wie folgt beantwortet:

1. Ist es möglich, zumindest innerhalb eines Modellprojektes, einzelne Stationen innerhalb einer Klinik aus dieser Zentralversorgung (halbindustriellen Fertigung) herauszulösen und durch eine dezentrale Essensproduktion zu ersetzen – mit dem Ziel, dass die Patient:innen auf den Stationen sich selbst versorgen, ein Budget hierfür erhalten, womit sie frische Lebensmittel einkaufen gehen und in der Stationsküche, soweit vorhanden, selbst kochen können? Wenn nein, warum nicht? Ein solches Modellprojekt hätte sogar einen therapeutischen Wert und könnte die Patient:innen auf dem Weg zu mehr Selbständigkeit unterstützen.

Im Rahmen der therapeutischen Angebote gibt es bereits jetzt Kochgruppen-Angebote für Patient:innen, die dazu in der Lage sind. Diese kaufen –von Therapeut:innen begleitet – frische (Bio-)Lebensmittel selber ein und bereiten diese in Stationsküchen selber zu. Hierfür wird ein entsprechendes Budget zur Verfügung gestellt. Die Herauslösung ganzer Stationen aus der Zentralversorgung ist zurzeit personell, finanziell, technisch und organisatorisch nicht umsetzbar. Zum Beispiel würde dann

Mitglied im Erfolgsfaktor Familie Unternehmensnetzwerk

EMAS Geprüftes Umweltmanagement

Ihre Meinung ist uns wichtig!
Die LVR-Geschäftsstelle für Anregungen und Beschwerden erreichen Sie hier:
E-Mail: anregungen@lvr.de oder beschwerden@lvr.de, Telefon: 0221 809-2255

die Stationsküche zu einer Produktionsküche mit HACCP-Auflagen werden. Patient:innen dürften dann nur unter Einhaltung der Hygieneauflagen mitkochen. Die Vorgaben zur Lagerung, Zubereitung und Ausgabe der Speisen wären wesentlich höher. Die Küchen müssten technisch ertüchtigt werden, der Personalbedarf müsste angepasst werden.
Insofern ist zurzeit nur das Modell der Kochgruppen für geeignete Patient:innen machbar, welches häufig und regelmäßig im Rahmen der Therapie eingesetzt wird.

2. Ist es möglich, im Rahmen eines solchen Modellprojektes die Beschaffung noch weiterer als der bisherigen Produkte aus dem zentralen EU-Ausschreibeverfahren herauszulösen und diese – soweit gesetzlich möglich – im Rahmen freihändiger Vergaben und beschränkter Ausschreibungen zu beschaffen, wie es beim LWL bereits praktiziert wird? Wenn nein, warum nicht?

Dies ist grundsätzlich möglich. Jede Einrichtung müsste dann eigene Sachbearbeiter:innen für die Beschaffung der Lebensmittel beschäftigen, die das öffentliche Vergaberecht beachten müssen. Dies führt zu Mehrkosten für Personal, die zurzeit nicht finanziert sind. Der LVR hat sich vor Jahren unter Beachtung der Vergabegesetze zur Bündelung der Bedarfe in einem Competence Center Lebensmittel entschieden, um Personal- und Sachkosten einzusparen. Hierzu wurde auch der Speiseplan für alle selbstkochenden Einrichtungen optimiert. Durch diese Maßnahmen konnten in den vergangenen Jahren durchgängig günstige Konditionen im Großverbraucherbereich erzielt werden.
Für die Durchführung von Kochgruppen ist ein solches Vorgehen nicht zielführend, da hier nur Kleinmengen im örtlichen Einzelhandel eingekauft werden.

Die Beschaffung von Lebensmitteln für die selbstkochenden Einrichtungen des LVR erfolgt auf Basis bestehender Beschlüsse, die unter Mitwirkung einer Unternehmensberatung seinerzeit gefasst wurden. Eine Änderung bedürfte einer gutachterlichen Untersuchung oder einer erneuten externen Begleitung mit entsprechenden Kosten. Dies müsste dann beantragt werden.

Für den Vorstand

E n b e r g s
Vorsitzende des Vorstandes

LVR-Dezernat Personal und Organisation

Qualität für Menschen

LVR · Dezernat 1 · 50663 Köln

Datum und Zeichen bitte stets angeben

Vorsitzende der Kommission
Gleichstellung

23.05.2022
10.04

Mitglieder und stellvertretende Mitglieder
der Kommission Gleichstellung

Sabine Brinkmann
Tel.: 0221-809-3582
Sabine.Brinkmann@lvr.de

nachrichtlich:
Geschäftsführungen der Fraktionen und Geschäftsführung der Gruppe
in der Landschaftsversammlung Rheinland

über Stabsstelle 00.200

Beantwortung der Anfrage Nr. 15/30- Ansprechpartner*innen für Gleichstellung in den Kliniken – der Fraktion „Bündnis 90/DIE GRÜNEN"

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Klemm,

nachfolgend beantwortet die Verwaltung die Anfrage zum Thema Ansprechpartner*innen für Gleichstellung in den LVR-Kliniken.

1. **Wie viele Anfragen / Meldungen sind aus dem Bereich der Kliniken in den vergangenen Jahren an die Gleichstellungsstelle des LVR herangetragen worden?**

Die in der LVR-Stabsstelle Gleichstellung und Gender Mainstreaming eingehenden Anfragen und Meldungen werden nicht spezifisch nach den jeweiligen LVR-Dienststellen erfasst. In den Jahren 2020 und 2021 gab es innerhalb der Stabsstelle circa 400 individuelle Anfragen von Mitarbeitenden und Führungskräften zu Themen im Bereich der Gleichstellung der Geschlechter.

EMAS Geprüftes Umweltmanagement

Mitglied im Erfolgsfaktor Familie Unternehmensnetzwerk

Ihre Meinung ist uns wichtig!
Die LVR-Geschäftsstelle für Anregungen und Beschwerden erreichen Sie hier:
E-Mail: anregungen@lvr.de oder beschwerden@lvr.de, Telefon: 0221 809-2255

LVR – Landschaftsverband Rheinland
Dienstgebäude in Köln-Deutz, Horion-Haus, Hermann-Pünder-Straße 1
Pakete: Dr.-Simons-Str. 2, 50679 Köln
LVR im Internet: www.lvr.de
USt-IdNr.: DE 122 656 988, Steuer-Nr.: 214/5811/0027

Bankverbindung:
Helaba
IBAN: DE84 3005 0000 0000 0600 61, BIC: WELADEDDXXX
Postbank
IBAN: DE95 3701 0050 0000 5645 01, BIC: PBNKDEFF370

2. Um welche Themen ging es bei diesen Anfragen / Meldungen (bitte nach Häufigkeit benennen)?

Auch hierzu erfolgt keine statistische Erfassung der einzelnen Themen bezogen auf die LVR-Dienststellen. Insgesamt meldeten sich Mitarbeitende und Führungskräfte im Wesentlichen zu den Themen:

- Gendergerechte Sprache
- Vereinbarkeit von Beruf und Familie und Pflege
- Elternzeit- und Elterngeld/ Alterssicherung
- Teilzeitbeschäftigung/Anträge zur Teilzeitbeschäftigung nach Rückkehr aus der Elternzeit
- Kinderbetreuung
- Sexualisierte Belästigung am Arbeitsplatz
- Personalwicklung und Förderung von Frauen
- Diskriminierung aufgrund des Geschlechts

Es ist darauf hinzuweisen, dass die Kommunikation der LVR-Stabsstelle Gleichstellung und Gender Mainstreaming mit einer Vielzahl an Aktivitäten für und mit den Führungskräften und Personalverantwortlichen, auch mit den Verantwortlichen in den LVR-Kliniken, erfolgt, da die Führungskräfte vor Ort für die Umsetzung und Realisierung der Gleichstellungsziele verantwortlich sind und darüber hinaus gegenüber den Mitarbeitenden, auch in den LVR-Kliniken, als Multiplikator*innen fungieren. Hierzu wirkt die LVR-Stabsstelle Gleichstellung und Gender Mainstreaming - wie in LVR-Gleichstellungsberichten 2014 – 2016 und 2017 - 2020 ausführlich dargelegt - beratend und initiativ mit. Wie den Berichten zudem zu entnehmen ist, bietet die LVR-Stabsstelle Gleichstellung und Gender Mainstreaming darüber hinaus einschlägige – zurzeit vorwiegend digitale – Informationsveranstaltungen an. Broschüren mit internen und externen Kontaktdaten dienen den Führungskräften und Personalverantwortlichen in den LVR-Kliniken der Unterstützung und Weitergabe an die Mitarbeitenden. Im Wesentlichen sind das zurzeit folgende Materialien:

- *Nein heißt Nein!*
  Keine Akzeptanz von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz

- *Poster*
  Haben Sie sexuelle Belästigung erfahren? – interne und externe Anlauf- und Beratungsstellen

- *Fair in der Sprache*
  Geschlechtergerechte Sprache einfach umsetzen

- *Eltern werden*
  Praxisratgeber für angehende Väter und Mütter im LVR

- *FAIR-rentet!?*
  Informationen zur Rentenauswirkung bei Teilzeit und Erwerbsunterbrechung

- *Ja zur Gleichstellung*
  Image- und Angebotsflyer der LVR-Stabsstelle GGM

- *Begrüßungsflyer für junge Auszubildende*
  Zusammenfassung der Aufgaben der LVR-Stabsstelle GGM

- *Handreichung für Führungskräfte*
  zur Gleichstellung, Familienfreundlichkeit und Gender Mainstreaming

3. Wie werden die Anfragen / Meldungen bearbeitet? Digital oder im persönlichen Gespräch vor Ort? Wie oft wird ein persönliches Gespräch gewünscht?

Die Anfragen und Meldungen kommen sowohl per E-Mail, telefonisch oder auch persönlich zum Beispiel im Rahmen von Arbeitskreisen, einschlägigen Gremien und Auswahlverfahren sowie durch Multiplikator*innen des LVR-Dezernats 8, der Personalräte und der Führungskräfte in den LVR-Kliniken. Generell bietet die LVR-Stabsstelle Gleichstellung und Gender Mainstreaming allen Mitarbeitenden ihre Unterstützung vor Ort in den LVR-Kliniken an. Die Anzahl der gewünschten persönlichen Gespräche wurde bisher statistisch nicht erfasst, da grundsätzlich alle gewünschten persönlichen Gespräche zeitnah in der jeweiligen LVR-Klinik realisiert werden und damit keine Notwendigkeit besteht, diese gesondert zu erfassen. Das zeitweilige verfügte Dienstreiseverbot der LVR-Mitarbeitenden während der Corona-Pandemie galt zur Sicherstellung der Aufgaben nach dem Landesgleichstellungsgesetz NRW nicht für die Gleichstellungsbeauftragte. Sie hat daher auch während der Corona-Pandemie individuelle Beratungsgespräche in den jeweiligen LVR-Kliniken geführt. Damit konnten gewünschte persönliche Gespräche in den LVR-Kliniken durchgängig sichergestellt werden.

4. Wie häufig sind Mitarbeitende der Gleichstellungsstelle in den Kliniken vor Ort? Sind die Angebote der Gleichstellungsstelle den Mitarbeitenden in den Kliniken bekannt?

Die Mitarbeitenden der LVR-Stabsstelle Gleichstellung und Gender Mainstreaming sind regelmäßig in den LVR-Kliniken vor Ort, beispielsweise im Rahmen der Beteiligung an Personal-Auswahlverfahren sowie zu persönlichen Gesprächen mit Mitarbeitenden, Führungskräften, Vertreter*innen des Personalrates sowie im Rahmen der Mentoring-Programme und damit verbundenen Fortbildungs- und Vernetzungsveranstaltungen. Auf Wunsch nimmt die LVR-Stabsstelle Gleichstellung und Gender Mainstreaming neben telefonischen Gesprächen, Video-Konferenzen und per E-Mail Termine persönlich vor Ort in der jeweiligen Klinik wahr und diese werden den Mitarbeitenden auch aktiv angeboten. In der Regel wird das Angebot eines persönlichen Gesprächs gerne angenommen.

Die LVR-Stabsstelle Gleichstellung und Gender Mainstreaming informiert alle Beschäftigten des LVR regelmäßig, mindestens zwei Mal jährlich, in Form eines E-Mail-Newsletters

über aktuelle Angebote und Aktivitäten. Zusätzlich werden Meldungen der Stabsstelle auf allen LVR-Intranet-Seiten (Informationsflyer, externe Beratungsstellen, Veranstaltungen etc.) eingestellt, somit werden alle Mitarbeitenden, auch in den LVR-Kliniken, erreicht und informiert.

5. Gibt es unabhängige Stellen innerhalb der Kliniken, an die sich Mitarbeitende im Falle von (sexueller) Belästigung wenden können?

Für betroffene Mitarbeitende stehen grundsätzlich die jeweiligen Vorgesetzten im Rahmen der arbeitgeberseitigen Fürsorgepflicht, die Mitarbeitenden im Rahmen der kollegialen Ersthilfe, die örtlichen Personalräte sowie der arbeitsmedizinische Dienst als Ansprechpersonen in den jeweiligen LVR-Kliniken zur Verfügung.

Darüber hinaus kann sich jede Mitarbeitende vertraulich an die Gleichstellungsbeauftragte und ihre Vertreterin wenden, die weitere konkrete Hilfe- und Unterstützungsmöglichkeiten anbieten. Zudem wird auf externe, unabhängige Beratungsstellen verwiesen. Im Rahmen der Unterstützung und Beratung wird bedarfsorientiert und im Sinne einer Lotsinnenfunktion auf regionale und örtliche Beratungs- und Anlaufstellen für Frauen, Männern und LSBTIQ* Personen hingewiesen. Die Kontaktdaten dieser einschlägigen Beratungsstellen stehen zudem im Intranet flächendeckend allen Beschäftigten im LVR zur Verfügung. Betroffene erhalten dadurch Gelegenheit, sich direkt an externe Beratungs- und Anlaufstellen, wie zum Beispiel an das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen", zu wenden.

Im LVR-Gleichstellungsbericht 2017 – 2020 sind die Angebote und Maßnahmen des LVR ausführlich dargelegt und die auch für die Mitarbeitenden der LVR-Kliniken gelten und in Anspruch genommen werden können.

6. Welche Möglichkeiten sind den Mitarbeitenden bekannt, externe Beratungsangebote in Anspruch zu nehmen? Wie häufig wird davon Gebrauch gemacht?

Hierzu liegen dem LVR keine Daten vor.

7. Wie häufig werden Fortbildungsangebote z. B. zur Prävention sexualisierter Gewalt in Anspruch genommen?

Die Anzahl der Teilnehmenden aus LVR-Kliniken an Fortbildungsveranstaltungen und Personalentwicklungsprogrammen ist differenziert nach Geschlecht für den Zeitraum 2017 bis 2020 im LVR-Gleichstellungsbericht (Vorlage Nr. 15/847) dargelegt.

Die LVR-Stabsstelle Gleichstellung und Gender Mainstreaming bietet regelmäßig Mittagspausenveranstaltungen an, die im Intranet und in den Intranet-Portalen der LVR-Kliniken bekannt gegeben werden, sodass auch den Mitarbeitenden in den LVR-Kliniken die Mög-

lichkeit geboten wird, teilzunehmen. Zu den Veranstaltungen werden keine dienststellenbezogenen Daten erhoben und die personenbezogenen Anmeldungen werden aufgrund des Datenschutzes zeitnah gelöscht. Insgesamt haben an den unten aufgeführten Veranstaltungen 249 LVR-Beschäftigte teilgenommen.

In den Jahren 2020, 2021 und 2022 wurden insgesamt folgende vorwiegend virtuelle Mittagspausenveranstaltungen („Wissens-Lunch", ehemals „Pausenknüller") angeboten:

- "Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz" für Mitarbeiterinnen, Referentin: Lena Löwen, Frauenberatungsstelle Düsseldorf
- Brustkrebsprävention. „Vorbeugung und moderne Behandlungsmöglichkeiten der Brustkrebserkrankung" für Kolleg*innen"
- Prostatakrebsvorsorge: „Vorbeugung und moderne Behandlungsmöglichkeiten der "Prostatakrebserkrankung" für Kollegen"
- Umgang mit Stress zwischen Büro und Kinderzimmer
- „Geschlechtersensible Medienerziehung und (übermäßige) Mediennutzung" / „Mediennutzung in Corona-Zeiten"
- „Umgang mit Trauer im beruflichen Alltag"
- „Vasektomie, eine Frage der Männlichkeit?"
- Altersvorsorge: „Frauen leben länger – aber wovon?"
- „m_w_d & Co., Vielfalt im Arbeitsalltag/IDAHOBIT*"

Im Rahmen des „Transkulturellen Mentorings für Frauen*" wurden bisher acht Veranstaltungen jeweils mit 10 bis 20 Teilnehmenden aus LVR-Kliniken durchgeführt.

Im LVR-Väterbeirat engagieren sich fünf Väter aus LVR-Kliniken.

Darüber hinaus unterstützt die LVR-Stabsstelle Gleichstellung und Gender Mainstreaming auf Anfrage themenspezifische Informations- und Fortbildungsveranstaltungen. In 2021 wurde in Zusammenarbeit mit dem LVR-Kompetenzzentrum Migration ein Webinar zum Thema weibliche Genitalbeschneidung (FGM/C) angeboten, welches vom Verein LOBBY FÜR MÄDCHEN durchgeführt wurde. An dem Seminar nahmen 15 Mitarbeitende aus LVR-Kliniken teil.

Für September und November 2022 plant die Wilhelm-Griesinger-Schule für Pflegeberufe Köln eine Tagesfortbildung für die Auszubildenden in der Pflege (fünf Kurse mit jeweils 12 bis 22 Auszubildenden) und für die Lehrkräfte zum Thema sexuelle Belästigung. Die LVR-Stabsstelle Gleichstellung und Gender Mainstreaming wird einen Impulsvortrag halten und ihre Angebote zum Thema vorstellen.

8. Wie weit ist die Gleichstellungsstelle in die Personalentwicklung in den Kliniken eingebunden?

Die LVR-Stabsstelle Gleichstellung und Gender Mainstreaming wirkt an den Konzepten und an den strukturierten Auswahlverfahren der Personalentwicklungsprogramme des Dezernats 8 mit. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Programme:

- Traineeprogramm für das Management im LVR-Klinik-Verbund und im Verbund Heilpädagogischer Hilfen,
- Fach- und Karriere-Messe „LIKE Psychiatrie",
- das Personalentwicklungsprogramm „Fit für die Pflegedienstleitung",
- Führungskräftenachwuchsprogramm (FND) sowie
- das Führungskräfteentwicklungsprogramm (FEP).

Darüber hinaus führt die LVR-Stabsstelle Gleichstellung und Gender Mainstreaming zurzeit ein Transkulturelles Mentoring für Frauen in sieben LVR-Kliniken mit 11 Mentees und 11 Mentor*innen durch und ab Herbst 2022 erfolgt der vierte Durchlauf des Cross-Mentorings „Führung leben im Pflegedienst - FLiP".

Die LVR-Stabsstelle Gleichstellung und Gender Mainstreaming wirkt zudem maßgeblich an Stellenbesetzungsverfahren des Dezernats 8 und in den LVR-Klinken, vornehmlich bei Unterrepräsentanz von Frauen, mit und gibt Stellungnahmen im Rahmen des Landesgleichstellungsgesetzes nach § 18 Abs. 2 LGG NRW.

9. Im Gleichstellungsplan ist von einem Ausbau der dezentralen Beratungsangebote die Rede, um eine möglichst niedrigschwellige Erreichbarkeit zu gewährleisten. Welche Angebote sind hier konkret für die Kliniken geplant?

Ab 2023 ist vorgesehen, in den LVR-Kliniken offene Sprechstunden für Beschäftigte und Führungskräfte zu gleichstellungsrelevanten Themen anzubieten. Darüber hinaus können im Rahmen der Sprechstunden individuelle Termine vereinbart werden. Hierzu werden die Gleichstellungsbeauftragte, ihre Vertreterin und Mitarbeitende aus dem Team der Gleichstellungsbeauftragten in die Kliniken reisen und dort Beratungssprechstunden anbieten.

10. Gibt es einen Erfahrungsaustausch der Gleichstellungsstelle des LVR mit Gleichstellungsbeauftragten in anderen Kliniken?

Die LVR-Stabsstelle Gleichstellung und Gender Mainstreaming ist aktives Mitglied im bundesweiten Netzwerk der Gleichstellungsbeauftragten kommunaler Krankenhäuser. In dem Netzwerk wird durch die für die LVR-Kliniken zuständige Mitarbeiterin seit vielen Jahren ein regelmäßiger Erfahrungsaustausch gepflegt.

Darüber hinaus findet in regelmäßigen Abständen, in der Regel viermal jährlich, der Arbeitskreis „Gender" des Dezernats 8 statt, in dem auch die LVR-Stabsstelle Gleichstellung und Gender Mainstreaming seit Jahren mit eingebunden ist.

Neben dem zuvor genannten Netzwerk gibt es ein durch die LVR-Stabsstelle Gleichstellung und Gender Mainstreaming und die Kliniken der Stadt Köln und dem Klinikum Solingen ein gemeinsam organisiertes Cross-Mentoring-Programm. Auch hierbei stehen die zuständige Mitarbeiterin der LVR-Stabsstelle und die Gleichstellungsbeauftragten der anderen organisierenden Kliniken in einem regelmäßigen Austausch miteinander. Anlassbezogen findet zudem ein Erfahrungsaustausch mit der Gleichstellungsbeauftragten des LWL und den zuständigen Mitarbeiterinnen der LWL-Kliniken statt.

Mit freundlichen Grüßen
Die Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland
In Vertretung

L i m b a c h
Erster Landesrat
LVR-Dezernent Personal und Organisation

Anfrage Nr. 15/33

öffentlich

Datum: 04.05.2022
Anfragesteller: AfD

Krankenhausausschuss 3	**05.09.2022**	**Kenntnis**
Krankenhausausschuss 2	**06.09.2022**	**Kenntnis**
Krankenhausausschuss 4	**07.09.2022**	**Kenntnis**
Krankenhausausschuss 1	**08.09.2022**	**Kenntnis**
Gesundheitsausschuss	**09.09.2022**	**Kenntnis**

Tagesordnungspunkt:

Stärkung Sorgearbeit

Fragen/Begründung:

Thema im Gesundheitsausschuss des LVR war zuletzt die „Schaffung von Arbeitsplätzen für Männer und Frauen, die Sorgearbeit leisten."

Die AfD-Fraktion bittet deshalb um die Beantwortung folgender Fragen:

• Gibt es Kitas für die Kinder von LVR-Bediensteten und wenn ja: welche LVR-Klinik und welche sonstige Einrichtungen des LVR können Kitas vorweisen?

•Wie bewertet die Verwaltung grundsätzlich die Notwendigkeit von eigenen Kitas für die Kinder von LVR-Bediensteten?

•Können in den Kliniken des LVR zusätzliche Arbeitsmodelle geschaffen werden, um Angestellte, die Sorgearbeit leisten, zu unterstützen? Gibt es bereits solche Modelle oder sind welche geplant? Falls „Ja": Wie sehen diese im Detail aus?

gez. Yannick Noe
(Fraktionsvorsitzender)

LVR-Dezernat
Klinikverbund und Verbund Heilpädagogischer Hilfen
LVR-Fachbereich Personelle und organisatorische Steuerung

Qualität für Menschen

LVR · Dezernat 8 · 50663 Köln

Vorsitzende der Krankenhausausschüsse 1-4 und des Gesundheitsauschusses

Mitglieder und stellvertretende Mitglieder der Krankenhausausschüsse 1-4 und des Gesundheitsausschusses

nachrichtlich:
Geschäftsführung der Fraktionen und Gruppe in der Landschaftsversammlung Rheinland

Vorsitzende der Landschaftsversammlung Rheinland

Mitglieder des Verwaltungsvorstandes

über Stabstelle 00.200

Datum und Zeichen bitte stets angeben

14.06.2022
81.10

Frau Groner
Tel 0221 809-6930
marit.groner@lvr.de

Beantwortung der Anfrage Nr. 15/33 "Stärkung der Sorgearbeit", der AfD Fraktion

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Anfrage wird wie folgt beantwortet:

1. **Gibt es Kitas für die Kinder von LVR-Bediensteten und wenn ja: welche LVR-Klinik und welche sonstige Einrichtungen des LVR können Kitas vorweisen?**

In der Vorlage-Nr. 14/3137 werden die Angebote zur Kinderbetreuung zusammengefasst, die je nach Bedarf der Mitarbeitenden und Bedarf und Angeboten der umliegenden Kommunen unterschiedlich sind.

2. **Wie bewertet die Verwaltung grundsätzlich die Notwendigkeit von eigenen Kitas für die Kinder von LVR-Bediensteten?**

Die Verwaltung befürwortet das Vorhalten von Kinderbetreuungsangeboten. Die Positionierung als Familienfreundlicher Arbeitgeber ist ein wichtiges Anliegen für den LVR-Klinikverbund. Demensprechend wird die Entwicklung der LVR-Kliniken als Familienfreundliche Arbeitgeber unterstützt. Der LVR-Klinikverbund hat gemeinsam

EMAS Geprüftes Umweltmanagement

Mitglied im Erfolgsfaktor Familie Unternehmensnetzwerk

Ihre Meinung ist uns wichtig!
Die LVR-Geschäftsstelle für Anregungen und Beschwerden erreichen Sie hier:
E-Mail: anregungen@lvr.de oder beschwerden@lvr.de, Telefon: 0221 809-2255

LVR – Landschaftsverband Rheinland
Dienstgebäude in Köln-Deutz, Landeshaus, Kennedy-Ufer 2
Pakete: Dr.-Simons-Str. 2, 50679 Köln
LVR im Internet: www.lvr.de
USt-IdNr.: DE 122 656 988, Steuer-Nr.: 214/5811/0027

Bankverbindung:
Helaba
IBAN: DE84 3005 0000 0000 0600 61, BIC: WELADEDDXXX
Postbank
IBAN: DE95 3701 0050 0000 5645 01, BIC: PBNKDEFF370

mit der LVR-Stabsstelle Gleichstellung und Gender Mainstreaming ein Rahmenkonzept zur Stärkung der Familienfreundlichkeit im LVR-Klinikverbund entwickelt. Dieses enthält die als wichtig identifizierten Handlungsfelder und Entwicklungsoptionen für eine verbesserte Familienfreundlichkeit (Vorlagen Nr. 13/3378 und 14/1700).
Die LVR-Kliniken sind Mitglieder in entsprechenden Netzwerken, so u.a. im bundesweiten Netzwerk „Erfolgsfaktor Familie" oder in der Initiative „Familienfreundliches Krankenhaus" des Marburger Bundes.

3. **Können in den Kliniken des LVR zusätzliche Arbeitsmodelle geschaffen werden, um Angestellte, die Sorgearbeit leisten, zu unterstützen? Gibt es bereits solche Modelle oder sind welche geplant? Falls „Ja": Wie sehen diese im Detail aus?**

Beschäftigten im Schichtdienst werden zahlreiche unterschiedliche Arbeitszeitmodelle angeboten, um auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf dieser Beschäftigtengruppe größtmöglich zu gewährleisten. Diese machen es den Mitarbeitenden möglich, Sorgearbeit und Erwerbsarbeit miteinander zu vereinbaren, soweit es im Rahmen der Bedürfnisse der Patientenorientierung möglich ist. Eine Übersicht über die existierenden Arbeitszeitmodelle liegt nicht vor.

Mit freundlichen Grüßen
Die Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland
In Vertretung

W e n z e l – J a n k o w s k i

Anfrage Nr. 15/34

öffentlich

Datum: 04.05.2022
Anfragesteller: AfD

Krankenhausausschuss 3	**05.09.2022**	**Kenntnis**
Krankenhausausschuss 2	**06.09.2022**	**Kenntnis**
Krankenhausausschuss 4	**07.09.2022**	**Kenntnis**
Krankenhausausschuss 1	**08.09.2022**	**Kenntnis**
Gesundheitsausschuss	**09.09.2022**	**Kenntnis**

Tagesordnungspunkt:

Optimierung des Berufsbildes in der „Gesundheits- und Krankenpflege"

Fragen/Begründung:

Das Thema Personalbindung und attraktivere Gestaltung der Pflegeberufe im LVR sowie ein sehr gutes Gesundheitsmanagement sollten im LVR Priorität haben.

Die AfD-Fraktion bittet deshalb um die Beantwortung folgender Fragen:

• Was plant der LVR in 2022 und 2023 werbestrategisch, um diesen Beruf als attraktiven Beruf vorzustellen?

• Welche Alleinstellungsmerkmale bietet der LVR für das Berufsbild der Fachkrankenpflege?

• Welche Anreize hat der LVR bisher geschaffen und wird er künftig schaffen damit sich Fachpflegepersonal vermehrt bewirbt?

• Wäre die Gründung einer Betriebskrankenkasse nicht eine sinnvolle Ergänzung für ein Alleinstellungsmerkmal, vor allem mit niedrigen Beiträgen und sehr guten Leistungen gegenüber den gesetzl. KK und den Ersatzkassen?

• Welche innerbetrieblichen Maßnahmen werden im Sinne des betrieblichen Gesundheitsmanagements von Seiten des LVR in den eigenen Betrieben bzw. Standorten angeboten?

• Gibt es im LVR ein nachhaltiges betriebliches Gesundheitsmanagement? Falls „Ja",: Kann das betriebliche Gesundheitsmanagement weiter ausgebaut werden und was ist hier konkret aktuell und in den nächsten zwei Jahren geplant?

• Welche Personalbindungssysteme wurden bisher im LVR implementiert, um nachhaltig Mitarbeiter zu halten und welche sind für 2022/ 2023 geplant?

• Gibt es ein Incentive-Programm „Mitarbeiter wirbt Mitarbeiter"? Falls „Ja": Mit welcher Erfolgsquote?

gez. Yannick Noe (Fraktionsvorsitzender)

LVR-Dezernat
Klinikverbund und Verbund Heilpädagogischer Hilfen
LVR-Fachbereich Personelle und organisatorische Steuerung

Qualität für Menschen

LVR · Dezernat 8 · 50663 Köln

Vorsitzende der Krankenhausausschüsse 1-4 und des Gesundheitsauschusses

Mitglieder und stellvertretende Mitglieder der Krankenhausausschüsse 1-4 und des Gesundheitsausschusses

nachrichtlich:
Geschäftsführung der Fraktionen und Gruppe in der Landschaftsversammlung Rheinland

Vorsitzende der Landschaftsversammlung Rheinland

Mitglieder des Verwaltungsvorstandes

über Stabstelle 00.200

Datum und Zeichen bitte stets angeben

14.06.2022
81.10

Frau Groner
Tel 0221 809-6930
marit.groner@lvr.de

Beantwortung der Anfrage Nr. 15/34 „Optimierung des Berufsbildes in der Gesundheits- und Krankenpflege" der AfD-Fraktion

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Anfrage wird wie folgt beantwortet:

1. **Was plant der LVR in 2022 und 2023 werbestrategisch, um diesen Beruf als attraktiven Beruf vorzustellen?**

Alle LVR-Kliniken engagieren sich in der Zusammenarbeit mit Schulen, Ausbildungsstätten und Fachhochschulen oder Angeboten im Rahmen des Girls' Day und des Boys' Day zur Bewerbung der Berufsfelder insbesondere beim potentiellen Nachwuchs.
Weitere Bemühungen und Planungen sind in der Vorlage Nr. 15/275, „Personalgewinnung, –bindung und -entwicklung im LVR-Klinikverbund" beschrieben.

EMAS Geprüftes Umweltmanagement

Mitglied im Erfolgsfaktor Familie Unternehmensnetzwerk

Ihre Meinung ist uns wichtig!
Die LVR-Geschäftsstelle für Anregungen und Beschwerden erreichen Sie hier:
E-Mail: anregungen@lvr.de oder beschwerden@lvr.de, Telefon: 0221 809-2255

LVR – Landschaftsverband Rheinland
Dienstgebäude in Köln-Deutz, Landeshaus, Kennedy-Ufer 2
Pakete: Dr.-Simons-Str. 2, 50679 Köln
LVR im Internet: www.lvr.de
USt-IdNr.: DE 122 656 988, Steuer-Nr.: 214/5811/0027

Bankverbindung:
Helaba
IBAN: DE84 3005 0000 0000 0600 61, BIC: WELADEDDXXX
Postbank
IBAN: DE95 3701 0050 0000 5645 01, BIC: PBNKDEFF370

2. **Welche Alleinstellungsmerkmale bietet der LVR für das Berufsbild der Fachkrankenpflege? Welche Anreize hat der LVR bisher geschaffen und wird er künftig schaffen damit sich Fachpflegepersonal vermehrt bewirbt?**

Einen Überblick über die Alleinstellungsmerkmale des LVR-Klinikverbundes ist in der Vorlage Sachstandsbericht zur Arbeitgeberattraktivität des LVR-Klinikverbund (Nr. 14/3137) beschrieben. Der LVR-Klinikverbund hält zielgruppenspezifische Angebote für (angehendes) Pflegefachpersonal bereit. Insbesondere ist hier auf die vielfältigen Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen des LVR-Instituts für Forschung und Bildung (IFUB) hinzuweisen, die zum Teil berufsgruppenübergreifend angeboten werden oder gezielt für Pflegefachpersonal.
Eine Maßnahme, um die ca. 825 pflegerischen Auszubildenden für eine anschließende Beschäftigung in einer LVR-Klinik zu begeistern, ist der jährlich stattfindende Pflegeausbildungskongress „Du im LVR", der im Jahr 2016 etabliert wurde. Dieser richtet sich an die Krankenpflegeschüler*innen des 2. Ausbildungsjahres und ermöglicht den Auszubildenden einen Einblick in das breitgefächerte Beschäftigungsangebot des LVR-Klinikverbundes.
LVR-weite Programme wie beispielsweise „Flextime" werden Berufsgruppen übergreifend genutzt, um die Arbeitgeberattraktivität auf einem hohen Niveau zu halten.

3. **Wäre die Gründung einer Betriebskrankenkasse nicht eine sinnvolle Ergänzung für ein Alleinstellungsmerkmal, vor allem mit niedrigen Beiträgen und sehr guten Leistungen gegenüber den gesetzl. KK und den Ersatzkassen?**

Die Gründung einer Betriebskrankenkasse ist nicht geplant. In den 90er Jahren gab es bereits eine Betriebskrankenkasse beim LVR. Diese fusionierte aus wirtschaftlichen Gründen dann mit anderen kleineren Kassen.
Seit Einführung der Kassenwahlfreiheit 1996 ist deutschlandweit die Anzahl der Betriebskrankenkassen jährlich stetig zurückgegangen, vor allem durch Zusammenschlüsse kleiner Kassen. Für Beamt*innen stellt die Betriebskrankenkasse aufgrund der Beihilfeberechtigung darüber hinaus kein attraktives Angebot dar.
Die Maßnahmen, die für einen Arbeitgeber im Rahmen des BGM bzw. im Sinne von Prävention interessant sind, werden den Mitarbeitenden im LVR-Klinikverbund und LVR-HPH Verbund durch Kooperationen mit verschiedenen Krankenversicherungen ermöglicht.

4. **Welche innerbetrieblichen Maßnahmen werden im Sinne des betrieblichen Gesundheitsmanagements von Seiten des LVR in den eigenen Betrieben bzw. Standorten angeboten?**

In den Kliniken existieren sowohl im verhältnis- als auch im verhaltenspräventiven Bereich vielfältige Angebote der Gesundheitsförderung. So finden zum Beispiel

regelmäßige Gesundheitstage oder Gesundheitswochen, die häufig in Kooperationen mit Krankenkassen ausgerichtet werden, statt. Außerdem bieten die Kliniken ihren Mitarbeitenden Maßnahmen aus allen vier Präventionsfeldern (Ernährung, Bewegung, Stressprävention und Sucht) an. Siehe dazu die Vorlage Nr. 15/275 „Personalgewinnung, -bindung und -entwicklung im LVR-Klinikverbund".

5. **Gibt es im LVR ein nachhaltiges betriebliches Gesundheitsmanagement? Falls „Ja: Kann das betriebliche Gesundheitsmanagement weiter ausgebaut werden und was ist hier konkret aktuell und in den nächsten zwei Jahren geplant?**

BGM ist seit 2015 über eine Dienstvereinbarung in den Strukturen und Prozessen des LVR verankert.
Als ganzheitlicher Ansatz ist BGM darauf ausgerichtet, die Arbeitsbedingungen im LVR gesundheitsförderlich zu gestalten sowie die Leistungs- beziehungsweise Arbeitsfähigkeit der Mitarbeitenden zu erhalten. Der LVR orientiert sich dabei an einem umfassenden Gesundheitsbegriff, der sich an der „Luxemburger Deklaration zur betrieblichen Gesundheitsförderung in der Europäischen Union" orientiert.
Eine ausführliche Beschreibung ist in der Vorlage „Weiterentwicklung der Strukturen und Angebote des Betrieblichen Gesundheitsmanagements" Nr. 14/3806 zu finden.
Die LVR-Verbundzentrale übernimmt unter dem dort beschriebenen Gefüge die Steuerung für den LVR-Klinikverbund, den LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen, das LVR-IFUB sowie die LVR-Krankenhauszentralwäscherei.
Auf Basis der Befragungsergebnisse der aktuell laufenden Befragung zu psychischen Belastungen am Arbeitsplatz mittels COPSOQ Fragebogen, die zusammen mit der Freiburger Forschungsstelle für Arbeitswissenschaften (FFAW) durchgeführt wird, werden Gesundheitszirkel und Maßnahmenplanung für die kommenden zwei Jahre fußen.

6. **Welche Personalbindungssysteme wurden bisher im LVR implementiert, um nachhaltig Mitarbeiter zu halten und welche sind für 2022/ 2023 geplant?**

Die Gewinnung und Bindung von Fachpersonal stellt sich als zunehmend schwierig dar. Die LVR-Kliniken und die LVR-Verbundzentrale setzen daher zahlreiche Maßnahmen zur Gewinnung von Personal, zu deren Aus-, Fort- und Weiterbildung, zur Entwicklung von Führungskräften und zur Gestaltung der Arbeitsbedingungen um, die im Bericht der Verwaltung zur Personalgewinnung, -bindung und -entwicklung gemäß Vorlage Nr. 15/275 erläutert wurden. Die einzelnen Bereiche und Instrumente greifen hierbei eng ineinander.





7. Gibt es ein Incentive-Programm „Mitarbeiter wirbt Mitarbeiter"? Falls „Ja": Mit welcher Erfolgsquote?

Einige LVR-Kliniken und der LVR-Verbund HPH zahlen Prämien an Mitarbeitende die Mitarbeitende werben. Eine verbundweite digitale Anwendung wird derzeit geprüft. Die Erfolgsquote der einzelnen Maßnahmen ist nicht bekannt.

Mit freundlichen Grüßen
Die Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland
In Vertretung

W e n z e l – J a n k o w s k i



Beschlüsse des Gremiums Gesundheitsausschuss
öffentlich offene Beschlüsse

Vorlage / Antrag / Anfrage	TOP / Betreff	Gremium / Datum	federführende DST	Beschluss / Auftrag Fachausschussbezogene Ergänzung	Zu erled. bis	Beschlussausführung	
15/850/1	LVR-Gleichstellungsplan 2025	GA / 18.03.2022 PA / 28.03.2022 Inklusion / 31.03.2022 **LA / 04.04.2022**	05	Der Umsetzung des LVR-Gleichstellungsplans 2025 mit den dazu gehörigen Zielen und Maßnahmen wird gemäß der Vorlage Nr. 15/850/1 zugestimmt.	31.12.2022	Die im LVR-Gleichstellungsplan 2025 definierten Ziele und Maßnahmen werden im Wege einer Dienstanweisung bis zum Jahresende 2022 umgesetzt.	
15/763	Studien- und Informationsreise des Gesundheitsausschusses im Jahr 2022	GA / 04.02.2022 ÄR / 14.02.2022 **LA / 14.02.2022**	84	Der Studien- und Informationsreise des Gesundheitsausschusses nach München und Klingenmünster im Jahr 2022 wird gemäß Vorlage Nr. 15/763 zugestimmt.	30.10.2022	Die Studien- und Informationsreise des Gesundheitsausschusses nach München und Klingenmünster wird vom 17.10. - 20.10.2022 durchgeführt.	
15/57	Finanzierungs- und Umsetzungsplanung für das Forum Psychiatrie - Dezentrale Begegnungsstätten zur Geschichte und Gegenwart der Psychiatrie im Rheinland	Ku / 24.02.2021 Bau- und VA / 01.03.2021 KA 3 / 08.03.2021 KA 2 / 09.03.2021 KA 4 / 10.03.2021 KA 1 / 11.03.2021 GA / 12.03.2021 Fi / 17.03.2021 **LA / 19.03.2021**	8	Der Landschaftsausschuss beauftragt die Verwaltung, auf der Grundlage der Finanzierungs- und Umsetzungsplanung gemäß Vorlage 15/57, mit der Durchführung der in der Planung aufgeführten Teilmaßnahmen: 1) Umsetzung der „Route der Psychiatriegeschichte" • Aufbau und fortlaufende Erweiterung einer gemeinsamen Web-Präsenz aller LVR-Kliniken und sonstigen Erinnerungsorte • Aufbau einer digitalen, webbasierten Objektdatenbank • Umsetzung des Konzepts der Ausstellungs- und Begegnungsstätte in Haus 5 der LVR-Klinik Düren • Umsetzung des Konzepts der Ausstellungs- und Begegnungsstätte in der Klinik-Kirche der LVR-Klinik Langenfeld.	31.12.2025	Die Teilmaßnahmen werden sukzessive umgesetzt.	
15/57	Finanzierungs- und Umsetzungsplanung für das Forum Psychiatrie - Dezentrale Begegnungsstätten zur Geschichte und Gegenwart der Psychiatrie im Rheinland	Ku / 24.02.2021 Bau- und VA / 01.03.2021 KA 3 / 08.03.2021 KA 2 / 09.03.2021 KA 4 / 10.03.2021 KA 1 / 11.03.2021	8	2) Der Umbau- und Sanierungsmaßnahme von Haus 5 zur Aufnahme der Ausstellungs- und Begegnungsstätte wird dem Grunde nach zugestimmt. Die Verwaltung wird mit der Planung beauftragt.	31.12.2025	Der Vergabe der Architektenleistung (Vorlage Nr.: 15/352 B) zur Planung der Erweiterung der Nutzung von Haus 5 wurde am 19.07.2021 im Bau- und Vergabeausschuss zugestimmt. Im nächsten Schritt folgt die Erstellung der HU-Bau und Vorlage des Durchführungsbeschlusses bis voraussichtlich Ende 2022.	

Selektionskriterien:
alle öffentlichen offenen Beschlüsse





Legende: **Gremium** = Beschlussgremium

Beschlüsse des Gremiums Gesundheitsausschuss
öffentlich offene Beschlüsse

Vorlage / Antrag / Anfrage	TOP / Betreff	Gremium / Datum	federführende DST	Beschluss / Auftrag Fachausschussbezogene Ergänzung	Zu erled. bis	Beschlussausführung	
		GA / 12.03.2021 Fi / 17.03.2021 **LA / 19.03.2021**					
15/57	Finanzierungs- und Umsetzungsplanung für das Forum Psychiatrie - Dezentrale Begegnungsstätten zur Geschichte und Gegenwart der Psychiatrie im Rheinland	Ku / 24.02.2021 Bau- und VA / 01.03.2021 KA 3 / 08.03.2021 KA 2 / 09.03.2021 KA 4 / 10.03.2021 KA 1 / 11.03.2021 GA / 12.03.2021 Fi / 17.03.2021 **LA / 19.03.2021**	8	3) Die Verwaltung wird beauftragt, über den Fortgang dieses Projektes regelmäßig zu berichten.	31.12.2025	Es erfolgt ein regelmäßiger Zwischenbericht.	
15/37 CDU, SPD	Haushalt 2022/2023 Begleitbeschluss zum Doppelhaushalt 2022/2023	HPH / 12.11.2021 GA / 19.11.2021 Um / 24.11.2021 Ju / 25.11.2021 PA / 06.12.2021 Fi / 09.12.2021 LA / 14.12.2021	1	4.4) 4. Handlungsschwerpunkt IV; Bauen und Umwelt 4.4 Berücksichtigung regionaler Produkte (448-456)	31.12.2023	Das Thema „Einsatz regionaler Lebensmittel" ist seit langem Gegenstand fortlaufender Überlegungen im für den Lebensmitteleinkauf beim LVR zuständigen Competence Center in der LVR-Klinik Viersen. Soweit rechtlich möglich und abhängig von der jeweiligen regionalen und jahreszeitlichen Verfügbarkeit wird in jedem Ausschreibungszyklus der Lebensmittelrahmenverträge der Bezug regionaler Produkte in geeigneten Warengruppen ermöglicht. Die an die Rahmenverträge angeschlossenen selbstkochenden Einrichtungen (Kliniken) des LVR entscheiden selbständig, welche Produkte sie regional beziehen. Dies erfolgt unter Berücksichtigung der jeweiligen technischen Produktionsmöglichkeiten und der benötigten Großverbrauchermengen. Aktuell führen Lieferkettenprobleme und Preissteigerungen zu verstärkter Nachfrage nach regionalen Produkten. Die Verwaltung prüft die vorhandenen Flächen im Bereich aller Dienststellen auf deren Eignung zur Erzeugung von Nahrungsmitteln bzw. die aktuelle Nutzung als landwirtschaftliche Fläche und erstellt eine Gesamtübersicht. Die Ergebnisse werden der	

Legende: **Gremium** = Beschlussgremium






Beschlüsse des Gremiums Gesundheitsausschuss
öffentlich offene Beschlüsse

Vorlage / Antrag / Anfrage	TOP / Betreff	Gremium / Datum	federführende DST	Beschluss / Auftrag Fachausschussbezogene Ergänzung	Zu erled. bis	Beschlussausführung	
						politischen Vertretung im Laufe des Jahres 2023 vorgestellt.	
15/37 CDU, SPD	Haushalt 2022/2023 Begleitbeschluss zum Doppelhaushalt 2022/2023	Schul / 08.11.2021 Soz / 09.11.2021 HPH / 12.11.2021 GA / 19.11.2021 Ju / 25.11.2021 Inklusion / 02.12.2021 PA / 06.12.2021 Fi / 09.12.2021 LA / 14.12.2021	0	7.3) 7. Handlungsschwerpunkt VII; Soziales und Inklusion 7.3 Menschenrechte/Diversität/Gewaltschutz und Schutz von Menschen mit Behinderung mit hohem Unterstützungsbedarf sowie besonderen Lebenslagen (619-627)	01.12.2022	Im September 2021 hat der LVR erstmals ein verbandsweit übergreifend geltendes Grundsatzpapier „Gewaltschutz im LVR" vorgelegt (vgl. Vorlage Nr. 15/300). Es ist beabsichtigt, der politischen Vertretung in der Sitzung des Ausschusses für Inklusion gemeinsam mit seinem Beirat für Inklusion und Menschenrechte am 01.12.2022 – gut ein Jahr nach Vorlage des Grundsatzpapieres – einen ersten Monitoring-Bericht zum Umsetzungsstand zur Kenntnis zu bringen.	
15/37 CDU, SPD	Haushalt 2022/2023 Begleitbeschluss zum Doppelhaushalt 2022/2023	Schul / 08.11.2021 Soz / 09.11.2021 GA / 19.11.2021 Fi / 09.12.2021 LA / 14.12.2021	8	7.4) 7. Handlungsschwerpunkt VII; Soziales und Inklusion 7.4 Traumaambulanzen (629-633)	31.12.2023	Die Angebote in den Traumaambulanzen für Geflüchtete, insbesondere mit Beeinträchtigungen, werden ausgebaut/verstetigt. Eine Initiative zur Kostenübernahme hierfür durch den Bund wurde initiiert.	
15/37 CDU, SPD	Haushalt 2022/2023 Begleitbeschluss zum Doppelhaushalt 2022/2023	HPH / 12.11.2021 KA 3 / 15.11.2021 KA 2 / 16.11.2021 KA 4 / 17.11.2021 KA 1 / 18.11.2021 GA / 19.11.2021 Bau- und VA / 22.11.2021 Fi / 09.12.2021 LA / 14.12.2021	8	9.1) 9. Handlungsschwerpunkt IX; Gesundheit + Heilpädagogische Hilfen 9.1 Investitionsprogramm (774-786)	31.12.2023	Die Investitionspläne der Kliniken werden überarbeitet sowie ein Zeit-, Maßnahmen- und Kostenplan erstellt.	
15/37 CDU, SPD	Haushalt 2022/2023 Begleitbeschluss zum Doppelhaushalt 2022/2023	HPH / 12.11.2021 KA 3 / 15.11.2021 KA 2 / 16.11.2021 KA 4 / 17.11.2021 KA 1 / 18.11.2021 GA / 19.11.2021 Fi / 09.12.2021 LA / 14.12.2021	8	9.2) 9. Handlungsschwerpunkt IX; Gesundheit + Heilpädagogische Hilfen 9.2 Ausbau Peer counseling (788-794)	31.12.2023	Die in den SPZ bereits etablierten Angebote des Peer counseling sowie deren Inanspruchnahme werden mit Unterstützung des IFuB (Sparte Forschung) evaluiert. Auf dieser Grundlage wird seitens der Verwaltung eine Empfehlung für die zukünftige Förderung erarbeitet, die passgenau eingesetzt und am Bedarf orientiert verstetigt wird.	

Selektionskriterien:
alle öffentlichen offenen Beschlüsse

Legende: **Gremium** = Beschlussgremium


Beschlüsse des Gremiums Gesundheitsausschuss
öffentlich offene Beschlüsse

Vorlage / Antrag / Anfrage	TOP / Betreff	Gremium / Datum	federführende DST	Beschluss / Auftrag Fachausschussbezogene Ergänzung	Zu erled. bis	Beschlussausführung	
15/37 CDU, SPD	Haushalt 2022/2023 Begleitbeschluss zum Doppelhaushalt 2022/2023	HPH / 12.11.2021 KA 3 / 15.11.2021 KA 2 / 16.11.2021 KA 4 / 17.11.2021 KA 1 / 18.11.2021 GA / 19.11.2021 Fi / 09.12.2021 LA / 14.12.2021	8	9.3) 9. Handlungsschwerpunkt IX; Gesundheit + Heilpädagogische Hilfen 9.3 Wohnangebote für Menschen in Besonderen Wohnformen (796-817)	31.12.2023	Die Bedarfe des Klientel des LVR-Verbund HPH hinsichtlich der Beschaffenheit und der architektonischen Gestaltung von Wohnraum sind identifiziert und als Grundlage für weitere Planungen nutzbar.	
15/37 CDU, SPD	Haushalt 2022/2023 Begleitbeschluss zum Doppelhaushalt 2022/2023	HPH / 12.11.2021 KA 3 / 15.11.2021 KA 2 / 16.11.2021 KA 4 / 17.11.2021 KA 1 / 18.11.2021 GA / 19.11.2021 DiMA / 08.12.2021 Fi / 09.12.2021 LA / 14.12.2021	8	9.4) 9. Handlungsschwerpunkt IX; Gesundheit + Heilpädagogische Hilfen 9.4 Digitalisierung (819-838)	31.12.2023	Der Bedarf an personellen, materiellen und fachlichen Ressourcen zur Realisierung einer adressatengerechten Digitalen Teilhabe im LVR-Verbund HPH wird im Rahmen eines Gesamtkonzeptes dargestellt und finanziell beziffert.	
15/23 GRÜNE	Antrag: Fachtagung zu ASS bei Mädchen/Frauen	KA 3 / 15.11.2021 KA 2 / 16.11.2021 KA 4 / 17.11.2021 KA 1 / 18.11.2021 GA / 19.11.2021 Fi / 09.12.2021 LA / 14.12.2021 Ko Gleichstellung / 16.12.2021 **LVers / 17.12.2021**	8	"Die Verwaltung wird beauftragt zu prüfen, inwieweit die Voraussetzungen für die Durchführung einer Fachtagung zum Thema "Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) bei Mädchen/Frauen" gegeben sind."	31.12.2023	Der Durchführung einer Fachtagung zum Thema "Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) bei Mädchen/Frauen" ist in der Sitzung des Gesundheitsausschusses am 13.05.2022 gemäß Vorlage Nr. 15/973 zugestimmt worden.	
14/4116	Weiterführung des Stipendienprogramms für Medizinstudierende im LVR-Klinikverbund	KA 3 / 31.08.2020 KA 2 / 01.09.2020 KA 4 / 02.09.2020 KA 1 / 07.09.2020 **GA / 08.09.2020**	81	Die Verwaltung wird gemäß Vorlage Nr. 14/4116 beauftragt, das Stipendienprogramm zur Förderung von Medizinstudierenden für den LVR-Klinikverbund weitere vier Jahre ab dem 01.01.2021 fortzuführen.	31.12.2024	Zweimal jährlich startet eine neue Gruppe von Stipendiat*innen.	
14/3736	Seelische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen stärken durch integrierte Behandlung und Rehabilitation durch Kinder- und	GA / 22.11.2019 Inklusion / 28.11.2019 Fi / 03.12.2019 **LA / 09.12.2019**	84	"1. Der Bericht zur Umsetzung des Haushaltsbeschlusses 14/225 „Seelische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen stärken durch integrierte Behandlung und Rehabilitation durch	30.06.2025	Der Abschlussbericht über die Modellförderung wird nach Ende der Projektphase vorgelegt. Mit Vorlage 15/250 ist in der Sitzung des Gesundheitsausschusses am 15.06.2021 ein Zwischenbericht vorgelegt worden.	

Selektionskriterien:
alle öffentlichen offenen Beschlüsse

Legende: **Gremium** = Beschlussgremium


Beschlüsse des Gremiums Gesundheitsausschuss
öffentlich offene Beschlüsse

Vorlage / Antrag / Anfrage	TOP / Betreff	Gremium / Datum	federführende DST	Beschluss / Auftrag Fachausschussbezogene Ergänzung	Zu erled. bis	Beschlussausführung	
	Jugendpsychiatrie in den Regionen	Ju / 07.02.2020		Kinder und Jugendpsychiatrie und Jugendhilfe in den Regionen" wird zur Kenntnis genommen. 2. Zur Umsetzung des Haushaltsbeschlusses 14/225 „Seelische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen stärken durch integrierte Behandlung und Rehabilitation durch Kinder und Jugendpsychiatrie und Jugendhilfe in den Regionen; Haushalt 2019" werden fünf Modellregionen gemäß Vorlage 14/3736 gefördert. Dazu werden in den folgenden vier Haushaltsjahren Haushaltsmittel im Umfang von 1.499.950,- €. bereitgestellt."			
14/3006	Konzeption zur Unterstützung von Psychiatrischen Kliniken und Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen im (ost-)europäischen Raum	Ko Europa / 04.12.2018 Fi / 12.12.2018 **LA / 14.12.2018** GA / 08.02.2019 Schul / 11.02.2019	2	"Der Landschaftsverband Rheinland bekennt sich zu einer verstärkten Unterstützung von Psychiatrischen Kliniken und Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen im (ost-) europäischen Raum und beschließt erste Schritte zur Umsetzung gemäß Vorlage Nr. 14/3006. Der Stabsstelle 20.01 werden ab 2019 bis vorerst einschließlich 2023 jährlich 25.000 € an Haushaltsmitteln zur Projektförderung zur Verfügung gestellt."	31.12.2023	- Satzung und Richtlinien der LVR-Europa-Projektförderung (Vorlagen 14/3440 und 14/3443) wurden von der politischen Vertretung im Juli 2019 beschlossen - drei Anträge auf Projektförderung wurden bereits politisch beschlossen (vgl. Vorlage 14/3647, 14/3330 und 14/3846/2) - Sondierung weiterer Projekte (zuletzt bzgl. einer Kooperation zw. der LVR-Klinik Düren und einem ostbelgischen Partner aus St. Vith) sowie förderbezogene Informationssarbeit (zuletzt im Zuge der LVR-Woche der Begegnung im Rahmen eines Digital-Seminars am 07.06.2022) erfolgt kontinuierlich - ggf. (ab 5.000 € beantragtem Projektzuschuss) Erstellung von Beschlussvorlagen für den Finanz- und Wirtschaftsausschuss sowie Landschaftsausschuss - regelmäßige Berichterstattung über Fördermittelverwendung im Finanz- und Wirtschaftsausschuss sowie in der Kommission Europa, zuletzt bzgl. des LVR-Europa-Förderprojektes „Hellas" (15/576) in der Sitzung am 23.05.2022	




Selektionskriterien:
alle öffentlichen offenen Beschlüsse

Legende: **Gremium** = Beschlussgremium

Beschlüsse des Gremiums Gesundheitsausschuss
öffentlich offene Beschlüsse

Vorlage / Antrag / Anfrage	TOP / Betreff	Gremium / Datum	federführende DST	Beschluss / Auftrag Fachausschussbezogene Ergänzung	Zu erled. bis	Beschlussausführung	
						- spätestens 31.12.2023 Evaluierung des Gesamtkonzeptes	
14/2893	Umsetzung des BTHG beim LVR - hier: Aufbau von Beratung und Unterstützung nach § 106 SGB IX n.F. sowie Weiterentwicklung der Kontakt-, Koordinierungs- und Beratungsstellen (KoKoBe) unter Berücksichtigung von Peer Counseling	GA / 07.09.2018 Soz / 11.09.2018 Ju / 13.09.2018 HPH / 14.09.2018 Inklusion / 20.09.2018 PA / 24.09.2018 Fi / 26.09.2018 **LA / 01.10.2018**	74	3) "3. Für den Personenkreis der erwachsenen Menschen mit Behinderungen wird das Modell der kooperativen Bedarfsermittlung mit Mitarbeitenden der Leistungsanbieter/Freien Wohlfahrtspflege weiterentwickelt, so dass die Bedarfserhebung bei Erstanträgen mittelfristig und bei ausreichenden Personalressourcen durch Mitarbeitende des LVR erfolgt. Die Bedarfserhebung bei Folgeanträgen wird weiterhin durch die Leistungsanbieter durchgeführt."	31.12.2020	Aufgrund der Corona-Pandemie und des sich noch in Durchführung befindlichen Teilprojekts "SEIB BTHG 106+" konnte die Bedarfserhebung bei Erstanträgen durch LVR-eigene Mitarbeitende rheinlandweit nur sukzessive umgesetzt werden. Die Schulung des Fallmanagement 72 und 73 werden kontinuierlich fortgesetzt. Das Qualifizierungsangebot wurde weiter ausdifferenziert. Das Fallmanagement ist in den „Wegweiser 106" eingeführt worden. Nach Abschluss des SEIB –Projekts Ende 2022 werden die Erkenntnisse der Pilotregionen ausgewertet und auf das gesamte Rheinland sukzessive ausgeweitet.	


Beschlüsse des Gremiums Gesundheitsausschuss
öffentlich erledigte Beschlüsse

Vorlage / Antrag / Anfrage	TOP / Betreff	Gremium / Datum	federführende DST	Beschluss / Auftrag Fachausschussbezogene Ergänzung	Zu erled. bis	Beschlussausführung	
15/732	Änderung der Geschäftsordnung für die Planungsbeiräte der forensischen Einrichtungen im Gebiet des Landschaftsverbandes Rheinland	KA 2 / 01.02.2022 KA 4 / 02.02.2022 **GA / 04.02.2022**	82	Die Änderung der Geschäftsordnung für die Planungsbeiräte der forensischen Einrichtungen im Gebiet des Landschaftsverbandes Rheinland wird gemäß Vorlage Nr. 15/732 beschlossen.	04.02.2022	Die Geschäftsordnung ist mit Beschlussfassung im Gesundheitsausschuss am 04.02.2022 in Kraft getreten.	
15/497	Erneuerung der gemeinsamen Erklärung zur Zusammenarbeit zwischen dem Landschaftsverband Rheinland und der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens	Ko Europa / 27.09.2021 **LA / 01.10.2021** Schul / 08.11.2021 Soz / 09.11.2021 Ku / 10.11.2021 GA / 19.11.2021 Um / 24.11.2021 Ju / 25.11.2021 PA / 06.12.2021 DiMA / 08.12.2021	2	Dem Entwurf zur Erneuerung der gemeinsamen Erklärung zur Zusammenarbeit zwischen dem Landschaftsverband Rheinland und der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens wird gemäß Vorlage Nr. 15/497 zugestimmt und die Verwaltung beauftragt, die erforderlichen Schritte zur Unterzeichnung vorzunehmen.	31.12.2022	Wie zuletzt im Rahmen der Sitzung der LVR-Kommission Europa am 13.12.2021 erörtert, prüft die Verwaltung gegenwärtig, ob eine Unterzeichnung der allg. Erklärung - ggf. gemeinsam mit weiteren Vereinbarungen (s. Vorlage 15/645) - vor dem Hintergrund der Pandemie-Entwicklung im Zuge einer auswärtigen Kommissionssitzung in Eupen im Frühjahr 2022 erfolgen kann. Zwischenzeitlich ist die Unterzeichnung der allg. Erklärung gemeinsam mit weiteren Vereinbarungen (s. Vorlage 15/645) im Rahmen eines Besuches des LVR-Ältestenrates am 06.05.2022 in Eupen erfolgt.	
15/397	Fortführung und weiterer Ausbau der „Peer-Beratung bei den Koordinierungs-, Kontakt-, und Beratungsstellen (KoKoBe)" ab dem Jahr 2022	GA / 03.09.2021 Soz / 07.09.2021 Inklusion / 16.09.2021 Fi / 24.09.2021 **LA / 01.10.2021**	74	1. Ab dem Jahr 2022 werden gemäß Vorlage Nr. 15/397 drei weitere Standorte für Peer-Beratung bei der KoKoBe mit einer jährlichen Förderung von 40.000 Euro pro Standort aufgebaut. Das gesamte Fördervolumen erhöht sich dadurch auf insgesamt 600.000 Euro für 13 Peer-Beratungsstandorte sowie Aufwendungen für Schulungen und Öffentlichkeitsarbeit. 2. Die Förderung der ab 2022 insgesamt 13 Standorte „Peer-Beratung bei der KoKoBe" einschließlich von Aktivitäten zur Öffentlichkeitsarbeit und Schulungen wird gemäß Vorlage Nr. 15/397 in einem Umfang von jährlich 600.000 Euro bis einschließlich 2027 fortgesetzt.	30.06.2022	zu 1. Die Förderbescheide für drei weitere Standorte wurden erstellt. Peer-Beratung bei der KoKoBe wird seit dem 1.4.2022 in Düsseldorf und Kreis Düren gefördert, seit dem 1.6.2022 im Kreis Kleve. zu 2. Schulungen und Öffentlichkeitsarbeit finden kontinuierlich statt. Erledigt am 1.6.2022.	

Selektionskriterien:
alle öffentlichen erledigten Beschlüsse, erledigt ab 06.01.2022

Legende: **Gremium** = Beschlussgremium

Beschlüsse des Gremiums Gesundheitsausschuss
öffentlich erledigte Beschlüsse

Vorlage / Antrag / Anfrage	TOP / Betreff	Gremium / Datum	feder-führende DST	Beschluss / Auftrag Fachausschussbezogene Ergänzung	Zu erled. bis	Beschlussausführung	
14/300 SPD, CDU	Aktualisierung Versor-gungskonzepte LVR-Klini-ken Haushalt 2020/2021	KA 3 / 18.11.2019 KA 2 / 19.11.2019 KA 4 / 20.11.2019 KA 1 / 21.11.2019 GA / 22.11.2019 Fi / 03.12.2019 LA / 09.12.2019 **LVers / 16.12.2019**	8	Die LVR-Kliniken werden gebeten, die von Ihnen im Jahr 2016 vorgelegten gerontopsychiatrischen Versorgungs-konzepte zu aktualisieren unter beson-derer Berücksichtigung der anstehen-den Krankenhausbedarfsplanung und der Optimierung der Vernetzung in Ko-operation mit den somatischen Kran-kenhäusern und niedergelassenen Haus- und Fachärzten der Region.	31.12.2021	Die gerontopsychiatrischen Versorgungskonzepte der LVR-Kliniken liegen in aktualisierter Version vor. Hierbei wurden Entwicklungen der standort-spezifischen Ausgangslagen berücksichtigt und bei Bedarf Modifizierungen des patientenorientier-ten Behandlungsangebotes im Sinne einer ganz-heitlichen Versorgung psychiatrisch-alterskranker Menschen vorgenommen. Die Vorlage Nr. 15/1089 ist für die Sitzungsrunde der Kranken-hausaussschüsse und des Gesundheitsausschus-ses im September 2022 erstellt worden.	

Selektionskriterien:
alle öffentlichen erledigten Beschlüsse, erledigt ab 06.01.2022

Legende: **Gremium** = Beschlussgremium

TOP 12 Bericht aus der Verwaltung

TOP 13 Verschiedenes

Die Direktorin des Landschaftsverbandes
LVR-Institut für Forschung und Bildung

Qualität für Menschen

Vorlage Nr. 15/1021

öffentlich

Datum: 24.08.2022
Dienststelle: LVR-Institut für Forschung und Bildung
Bearbeitung: Herr Thewes

Gesundheitsausschuss	**09.09.2022**	**Beschluss**

Tagesordnungspunkt:

Jahresabschluss 2021 des LVR-Institut für Forschung und Bildung

Beschlussvorschlag:

1. Der Gesundheitsausschuss nimmt den Jahresabschluss 2021 des LVR-Institut für Forschung und Bildung gemäß Vorlage Nr. 15/1021 zur Kenntnis.

2. Er empfiehlt dem Landschaftsausschuss, den Jahresabschluss an die Landschaftsversammlung mit folgender Beschlussempfehlung weiterzuleiten:
2.1. Die Landschaftsversammlung stellt den Jahresabschluss 2021 des LVR-Institut für Forschung und Bildung fest. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 hat das LVR-Institut für Forschung und Bildung einen Jahresüberschuss in Höhe von EUR 11.459,72 erwirtschaftet.
2.2 Mit dem Jahresüberschuss zum 31.12.2021 in Höhe von EUR 11.459,72 wird ein Bilanzgewinn erzielt. Der Bilanzgewinn in Höhe von EUR 11.459,72 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

3. Dem Institutsvorstand des LVR-Institut für Forschung und Bildung wird gem. § 16 Abs. 4 Ziff. 13 der Betriebssatzung Entlastung erteilt.

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.	nein

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2025.	nein

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):

Produktgruppe:			
Erträge: Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan	keine nein	Aufwendungen: /Wirtschaftsplan	keine nein
Einzahlungen: Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:	keine nein	Auszahlungen: /Wirtschaftsplan	keine nein
Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:			
Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten			

Für den Vorstand:

T H E W E S
Vorsitzender des Vorstandes

Zusammenfassung:

Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von EUR 11.459,72 ab. Mit dem Jahresüberschuss zum 31.12.2021 in Höhe von EUR 11.459,72 wird ein Bilanzgewinn erzielt, der auf neue Rechnung vorgetragen wird.

Begründung der Vorlage Nr. 15/1021:

Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 des LVR-Institut für Forschung und Bildung ist als Anlage beigefügt.

Für den Vorstand

T H E W E S
Vorsitzender des Vorstandes

LVR-Institut für
Forschung und Bildung

Jahresabschluss

2021

LVR-Institut für Forschung und Bildung

(wie ein Eigenbetrieb geführte Einrichtung)

in Trägerschaft des

Landschaftsverband Rheinland, Köln

LVR
Qualität für Menschen

Bilanz
zum 31. Dezember 2021

Aktiva	31.12.2021 EUR	01.01.2021 EUR
A. Anlagevermögen		
II. Sachanlagen		
5. Einrichtungen und Ausstattungen	19.221,16	15.999,72
	19.221,16	15.999,72
B. Umlaufvermögen		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2. Forderungen an den Krankenhausträger	1.867.316,81	83.343,22
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		
7. Sonstige Vermögensgegenstände	52.725,30	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		
	1.920.042,11	83.343,22
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	251,06	657,06
	1.920.293,17	84.000,28
D. Rechnungsabgrenzungsposten		
2. andere Abgrenzungsposten	400,00	0,00
	400,00	0,00
	1.939.914,33	**100.000,00**

Passiva	31.12.2021 EUR	01.01.2021 EUR
A. Eigenkapital		
1. Festgesetztes Kapital	25.000,00	25.000,00
2. Kapitalrücklagen	75.000,00	75.000,00
5. Bilanzgewinn	11.459,72	0,00
	111.459,72	100.000,00
C. Rückstellungen		
3. sonstige Rückstellungen	484.925,64	0,00
	484.925,64	0,00
D. Verbindlichkeiten		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	27.545,92	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 27,545,92 (Vorjahr EUR 0,00)		
5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger und anderen Trägereinrichtunge	1.218.625,06	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.218.625,06 (Vorjahr EUR 0,00)		
10. sonstige Verbindlichkeiten	97.357,99	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 97.357,99 (Vorjahr EUR 0,00)		
	1.343.528,97	0,00
	1.939.914,33	**100.000,00**

Gewinn- und Verlustrechnung

	2021 EUR
1. Umsatzerlöse	1.206.900,22
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.885.381,59
- davon Auflösung von Sonderposten EUR 0,00	
5. Materialaufwand	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	22.728,61
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	41.584,47
6. Personalaufwand	
a) Löhne und Gehälter	1.711.525,72
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	339.429,24
- davon für Altersversorgung EUR 99.511,37	
7. Abschreibungen	
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.165,39
b) auf Vermögensgegenstände des Umlagevermögens, soweit diese die im	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	960.390,27
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,61
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00	
- davon aus der Aufzinsung EUR 0,00	
12. Ergebnis nach Steuern	11.459,72
13. sonstige Steuern	0,00
14. Jahresüberschuss	**11.459,72**
19. Bilanzgewinn	**11.459,72**

Anhang zum Jahresabschluss vom 01. Januar bis 31. Dezember 2021

I. Allgemeine Angaben

Mit dem Grundsatzbeschluss 14/3573 vom 11.10.2019 hat der Landschaftsausschuss des LVR beschlossen, zum 01.01.2021 das LVR-Institut für Versorgungsforschung (LVR-IVF) und die Akademie für Seelische Gesundheit (LVR-Akademie) zu einem wie-Eigenbetrieb mit dem Namen LVR-Institut für Forschung und Bildung zusammenzuführen. Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 ist damit der erste Jahresabschluss. In der Bilanz werden statt der Vorjahresangaben die Eröffnungsbilanzwerte zum 01.01.2021 ausgewiesen. Andere Vorjahresangaben liegen wegen des Betriebsbeginns 2021 nicht vor.

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW), der Krankenhausbuchführungsverordnung (KHBV) in Verbindung mit den einschlägigen Bestimmungen des Handelsgesetzbuchs (HGB) aufgestellt.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgt unter Annahme der Unternehmensfortführung (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB).

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte aufgrund der Einbindung in den LVR-Klinikverbund nach den Vorschriften der KHBV und wurde gem. § 265 Abs. 5 HGB in Verbindung mit der KHBV erweitert. In der Gewinn- und Verlustrechnung wurden die Davon-Vermerke zu den sonstigen betrieblichen Erträgen um die Angabe der Ausgleichsbeträge für frühere Geschäftsjahre sowie zu den sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge um eine Angabe zu den Erträgen aus Abzinsungen erweitert und die Zinsen und ähnliche Aufwendungen um eine Angabe zu den Aufzinsungen ergänzt.

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Ansatz- und Bewertungsmethoden wurden unverändert angewandt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, verrechnet über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer, bewertet, diese entsprechen grundsätzlich den amtlichen AfA-Tabellen. Bei Vorliegen einer voraussichtlich dauernden Wertminderung wird außerplanmäßig abgeschrieben.

Das übrige Sachanlagevermögen ist mit Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Der Abnutzung wird durch planmäßige lineare Abschreibungen über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer (diese entspricht grundsätzlich den amtlichen AfA-Tabellen)

Rechnung getragen. Für Geringwertige Anlagegüter wird ein Sammelposten gebildet und zeitanteilig über die Nutzungsdauer von 5 Jahren linear abgeschrieben.

Die Nutzungsdauer beträgt durchschnittlich für:

• immaterielle Vermögensgegenstände	10 Jahre
• Betriebsgebäude	25 Jahre
• technische Anlagen und Maschinen	10 Jahre
• Betriebs- und Geschäftsausstattung	10 Jahre

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit dem Nennwert oder mit ihren Anschaffungskosten angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken bei zweifelhaften Forderungen werden durch entsprechende Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Uneinbringliche Forderungen werden auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

Unter dem aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind Zahlungen vor dem Bilanzstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, ausgewiesen.

Die Bilanz wird unter Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.

Bei dem LVR-IFuB besteht über die Rheinische Zusatzversorgungskasse (RZVK), Köln, mittelbare Pensionsverpflichtungen gegenüber tarifgebundenen Beschäftigten. Die Ausgestaltung der einzelnen Versorgungszusagen richtet sich nach der Satzung der RZVK. Das System ist umlagefinanziert. Der Gesamtbetrag der umlagepflichtigen Gehälter betrug im Berichtsjahr EUR 1.297.396,99.

Der derzeitige Umlagesatz in Höhe von 4,25 % zuzüglich 3,50 % Sanierungsgeld (= Gesamtfinanzierungssatz in Höhe von 7,75 % der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte) wird aller Voraussicht nach bis einschließlich des Geschäftsjahres 2023 unverändert bleiben. Für den am 01.01.2024 in dem von der RZVK praktizierten gleitenden Deckungsabschnittsverfahren neu beginnenden Deckungsabschnitt wird der Gesamtfinanzierungsbedarf im umlagefinanzierten Abrechnungsverband I der RZVK Ende 2023 durch Einholung eines versicherungsmathematischen Gutachtens überprüft und ggf. neu festgestellt. Die Überprüfung des Finanzbedarfs im gleitenden Deckungsabschnittsverfahren erfolgt turnusmäßig alle fünf Jahre. Nach Einschätzung der RZVK sind zurzeit in Bezug auf den am 01.01.2024 neu beginnenden Deckungsabschnitt für die dann folgenden fünf Jahre keine nennenswerten Veränderungen des Gesamtfinanzierungssatzes (7,75 % der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte) im umlagefinanzierten Abrechnungsverband I zu erwarten. Auf eine Bilanzierung dieser mittelbaren Pensionsverpflichtungen wird in Ausübung des Wahlrechts des Art. 28 Abs. 1 S. 2 EGHGB verzichtet.

Die Sonstigen Rückstellungen sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken auf der Grundlage vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung. Für Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden künftige Preis- und Kostensteigerungen berücksichtigt und der Betrag gem. der Rückstellungsabzinsungsverordnung mit dem durch die Deutsche Bundesbank veröffentlichen Restlaufzeit entsprechenden Zinssatz abgezinst.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz

Die Aufgliederung und Entwicklung des Anlagevermögens sind dem als Anlage zum Anhang beigefügten Anlagennachweis zu entnehmen.

Die Forderungen an den Krankenhausträger betreffen Forderungen aus der Abrechnung der Personalkostenumlagen für die Akademie und dem Institut für Versorgungsforschung in Höhe von TEUR 1.846 sowie weitere sonstige Forderungen in Höhe von TEUR 58.

Die Sonstigen Rückstellungen entfallen im Wesentlichen auf die Rückstellungen für sonstige Personalkosten (Urlaub, Mehrarbeit, LOB), Jahresabschlusskosten und ausstehende Rechnungen.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten ergeben sich aus der nachfolgenden Übersicht der Verbindlichkeiten:

Verbindlichkeiten	Restlaufzeiten		
	bis zu 1 Jahr	mehr als 1 Jahr	davon mehr als 5 Jahre
	EUR	EUR	EUR
3. aus Lieferungen und Leistungen	27.545,92	0,00	0,00
Vorjahr	0,00	0,00	0,00
5. gegenüber dem Krankenhausträger	1.218.625,06	0,00	0,00
Vorjahr	0,00	0,00	0,00
10. sonstige Verbindlichkeiten	97.357,99	0,00	0,00
Vorjahr	0,00	0,00	0,00
Gesamt	**1.343.528,97**	**0,00**	**0,00**
Vorjahr	**0,00**	**0,00**	**0,00**

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Erlöse nach Sparten setzen sich wie folgt zusammen:

	Akademie	Institut	Gesamt
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse	515.794,80	691.105,42	1.206.900,22
sonstige Erträge	1.053.734,77	831.646,82	1.885.381,59
Betriebsvermögen	**1.569.529,57**	**1.522.752,24**	**3.092.281,81**

Sämtliche Umsatzerlöse wurden ausschließlich im Inland erzielt.

In den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen in Höhe von EUR 0,00 enthalten. In den Zinsen und ähnlichen Erträgen sind Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen in Höhe von EUR 0,00 enthalten.

In den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung (siehe Anlage 2) sind folgende außergewöhnliche und periodenfremde Beträge enthalten:

- in den Umsatzerlösen gem. § 277 Abs. 1 HGB sind periodenfremde Erträge in Höhe von EUR 51.751,15 enthalten

V. Sonstige Angaben

Die Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz ausgewiesen werden, betragen TEUR 130 aus Miet- und Leasingverträgen.

Im Berichtsjahr sind keine Wirtschaftsprüferhonorare angefallen.

Der Institutsleitung gehören an:

Kaufmännische Direktorin:	Eva-Maria Bergerfurth (Vorsitzende des Vorstandes) (bis 30.06.2021)
Kaufmännischer Direktor:	Stefan Thewes (Vorsitzender des Vorstandes) (ab 01.07.2021)
Fachliche Direktorin Sparte Forschung:	Prof. Dr. Euphrosyne Gouzoulis-Mayfrank
Fachlicher Direktor Sparte Bildung:	Andreas Kuchenbecker

Die für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2021 gewährten Gesamtbezüge der Institutsleitung betrugen EUR 175.883,58. Diese setzten sich wie folgt zusammen:

Institutsleitung	Festvergütung	Variable Vergütung	Sach- und sonstige Bezüge *	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR
Eva-Maria Bergerfurth	23.333,31	0,00	0,00	23.333,31
Stefan Thewes	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Prof. Dr. Euphrosyne Gouzoulis-Mayfrank	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
Andreas Kuchenbecker	75.597,42	1.032,40	3.920,45	80.550,27
Betriebsleitung gesamt	**170.930,73**	**1.032,40**	**3.920,45**	**175.883,58**

* erfolgsunabhängige Vergütung

Neben den oben dargestellten Vergütungen wurden im Jahr 2021 aufgrund von Vertragsänderungen für vorangegangene Jahre keine Nachzahlungen an die Mitglieder der Institutsleitung geleistet.

Der Betriebsausschuss erhielt im Jahr 2021 für seine Tätigkeit von dem LVR-Institut für Forschung und Bildung eine Gesamtvergütung in Höhe von EUR 1.733,00. Auf einen Ausweis der je Ausschussmitglied gezahlten Vergütungen gem. Transparenzgesetz wurde

wegen der Geringfügigkeit der Beträge je Mitglied und Einrichtung (< EUR 750,00) verzichtet.

Dem Betriebsausschuss für das LVR-Institut für Forschung und Bildung gehören in der 15. Wahlperiode die nachfolgenden Mitglieder*innen sowie deren Stellvertreter*innen im Berichtsjahr an:

Vorsitzende:
Schäfer, Ilona, Bündnis 90/DIE GRÜNEN
Stellvertretende Vorsitzende:
Loepp, Helga, CDU

Mitglieder*innen

CDU
Baer, Gudrun
(kfm. Angestellte, Dipl.-Betriebswirtin)
van Benthem, Henk
(Versicherungsmakler)
Heister, Joachim *
(Beamter in ATZ)
Loepp, Helga
(freiberufliche Industriekauffrau)
Nabbefeld, Michael
(Krankenkassenbetriebswirt)

Renzel, Peter
(Stadtdirektor)
Schavier, Karl
(Rentner)
Stieber, Andreas-Paul
(Geschäftsführer)

SPD
Engler, Gerd
(Dipl. Sozialarbeiter i. R.)
Heinisch, Iris
(Dipl.-Sozialarbeiterin)
Karl, Christiane
(Hebamme)
Krossa, Manfred
(Dipl.-Ing. Elektrotechnik/Informatik i. R.)
Kucharczyk, Jürgen
(Beamter)
Schulz, Margret *
(Rentnerin)

Stellvertretende Mitglieder*innen

CDU
Bündgens, Willi
(Immobilienmakler)
Cöllen, Heiner
(Richter i. R.)
Henk-Hollstein, Anne
(Kauffrau)
Hermes, Achim
(Journalist)
Kipphardt, Guntmar
(Studiendirektor i. E.)

Körlings, Franz
(Pensionär)
Dr. Schlieben, Nils Helge
(Studienrat)
Schönberger, Frank
(Rechtsanwalt)

SPD
Bausch, Manfred
(selbstständiger Caterer)
Böll, Thomas * (ab 27.08.2021)
(Fraktionsgeschäftsführer)
Bozkir, Timur
(Dipl.-Betriebsw. Koop.management M. A.)
Mahler, Ursula
(Rentnerin)
Rehse, Reinhard
(Pensionär)
Schliffke, Detlef
(Rentner)
Thiele, Elke
(Rentnerin)

Bündnis 90/DIE GRÜNEN
Hoffmann-Badache, Martina *
(Dipl.-Psychologin)
Kresse, Martin
(Dipl.-Sozialwissenschaftler)
Manske, Marion
(Angestellte)
Schäfer, Ilona
(med.-techn. Assistentin)
Tietz-Latza, Alexander
(Berater in der Forschungsförderung)

Bündnis 90/DIE GRÜNEN
Beck, Corinna
(Dipl.-Psychologin, Fachreferentin)
Deussen-Dopstadt, Gabi
(Dozentin)
Haake, Wolfgang (bis 07.06.2021)
(Verwaltungsfachwirt)
Jablonski, Frank
(wissenschaftlicher Mitarbeiter)
Tadema, Ulrike
(Geschäftsführerin)
Tuschen, Johannes (ab 27.08.2021)
(Werbegrafiker, Typograf)
Zsack-Möllmann, Martina
(Geschäftsführerin)

FDP
vom Berg, Joachim
(Geschäftsführer)
Breuer, Klaus
(Referent Energiewirtschaft)

FDP
Becker-Blonigen, Werner *
(Bürgermeister a. D.)
Feiter, Stefan *
(Verwaltungsfachwirt)
Dr. Rachner, Christine *
(Fachärztin Anästhesiologie)

AfD
Dr. Schnaack, Frank *
(Dipl.-Psychologe)

AfD
Frambach, Heribert * (ab 17.12.2021)
(Meßtechnik. Maschinenbau, Qual.manager)
Liedtke-Bentlage, Martin * (bis 16.12.2021)
(Angestellter)
Winkler, Michael *
(Kaufmann im Gesundheitswesen)

Die Linke.
Onori, Birgit *
(Krankenschwester)

Die Linke.
Inderbieten, Georg *
(Verwaltungsangestellter)

Die FRAKTION
Lukat, Nicole *
(Filialleiterin)

Die FRAKTION
Bamler, Thomas *
(Erzieher)
Bußieck, Petra *
(Pädagogische Fachkraft)

Gruppe FREIE WÄHLER
Alsdorf, Georg *
(Betriebswirt)

Gruppe FREIE WÄHLER
Bosch, Robert *
(Geschäftsführer)
Reinhard, Lothar *
(Lehrer i. R.)

* = Sachkundige Bürger*innen

Im Jahr 2021 hat sich die durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten wie folgt entwickelt:

Ø Anzahl der Beschäftigten	2021
weiblich	21
männlich	7
Summe	**28**
davon befristete Arbeitsverhältnisse	14,00%
Ø-Alter aller Beschäftigten IFuB gesamt	43,46

Die Beschäftigten teilen sich in folgende Berufsgruppen auf:

Anzahl der Beschäftigten nach Dienstarten	2021
Ärztlicher Dienst	1
Med.-techn. Dienst	17
Wirtschafts-/Versorgungsdienst	1
Verwaltungsdienst	2
Ausbildungsstätten	7
Summe	**28**

Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen bzw. Personen zu nicht marktüblichen Konditionen wurden nicht getätigt.

Es bestehen keine Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB.

Der Jahresabschluss wird in den Konzernabschluss des Landschaftsverbandes Rheinland als kleinsten und größten Konzernkreis einbezogen und im Ministerialblatt Nordrhein-Westfalen veröffentlicht und beim Landschaftsverband in Köln offengelegt.

Nach dem Schluss des Geschäftsjahres haben sich folgende Vorgänge von besonderer Bedeutung im Sinne des § 285 Nr. 33 HGB ereignet.

Russlands Präsident Putin verkündete am 21.02.2022 die Anerkennung der in der Ukraine liegenden, selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk als unabhängige Staaten. Verkündet wurde auch der Abschluss von Freundschafts- und Beistandsverträgen zwischen Russland und den beiden Volksrepubliken.

Drei Tage später, am 24.02.2022, verkündete Putin schließlich, die beiden Volksrepubliken des Donbass hätten Russland um Hilfe gebeten, weshalb er, resultierend aus den Beistandsverträgen „eine besondere Militäroperation" durchführen lässt. Damit begann der Einmarsch der russischen Streitkräfte in den souveränen Staat Ukraine.

Eine der kurzfristig erfolgten Reaktionen des Westens auf den Vorfall war die Entscheidung der EU, bereits bestehende Wirtschaftssanktionen gegen Russland im Wege von Verordnungen und Beschlüssen um weitere restriktive Maßnahmen auszuweiten.

Reaktionen Russlands hierauf sind zu erwarten oder bereits erfolgt. Einen besonders anfälligen Bereich stellt die Energieversorgung dar.

Da zum Zeitpunkt des Kriegsbeginns die Bundesrepublik Deutschland neben anderen Energieträgern zum Beispiel rund 53 % ihrer Erdgasimporte aus Russland bezog, ist mit einer weiteren Verschärfung der Energiepreisentwicklung zu rechnen. Im Extremfall könnte es auch zu Lieferengpässen kommen, falls der Import aus Russland aufgrund einer sich weiter verschärfenden Situation vollständig zum Erliegen kommt und bis dahin keine adäquate alternative Energieversorgung geschaffen worden ist.

Die Institutsleitung des LVR-Institut für Versorgungsforschung und Bildung schlägt folgende Gewinnverwendung vor:

- Mit dem Jahresüberschuss zum 31.12.2021 in Höhe von EUR 11.459,72 wird ein Bilanzgewinn in Höhe von EUR 11.459,72 erzielt.

  Der verbleibende Bilanzgewinn in Höhe von EUR 11.459,72 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Langenfeld, 30.06.2022

Die Institutsleitung

Stefan Thewes
Kaufmännischer Direktor
(Vorsitzender des Vorstandes)

Prof. Dr. Euphrosyne Gouzoulis-Mayfrank
Fachliche Ärztliche Direktorin
Sparte Forschung

Andreas Kuchenbecker
Fachlicher Direktor
Sparte Bildung

Anlagennachweis

		Entwicklung der Anschaffungswerte				Entwicklung der Abschreibungen				
		Anfangsbestand zum 01.01.2021	Zugang	Abgang	Endbestand zum 31.12.2021	Anfangsbestand zum 01.01.2021	Zugang	Entnahme für Abgänge	Endbestand zum 31.12.2021	**Restbuchwert zum 31.12.2021**
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	**EUR**
A.II.	**Sachanlagen**									
5.	Einrichtungen und Ausstattungen	58.625,61	8.386,83	0,00	67.012,44	42.625,89	5.165,39	0,00	47.791,28	**19.221,16**
		58.625,61	8.386,83	0,00	67.012,44	42.625,89	5.165,39	0,00	47.791,28	**19.221,16**
		58.625,61	8.386,83	0,00	67.012,44	42.625,89	5.165,39	0,00	47.791,28	**19.221,16**

Die Direktorin des Landschaftsverbandes
LVR-Institut für Forschung und Bildung

Qualität für Menschen

Vorlage Nr. 15/1010

öffentlich

Datum: 13.05.2022
Dienststelle: LVR-Institut für Forschung und Bildung
Bearbeitung: Frau Prof. Dr. Gouzoulis-Mayfrank

Krankenhausausschuss 3	**05.09.2022**	**Kenntnis**
Krankenhausausschuss 2	**06.09.2022**	**Kenntnis**
Krankenhausausschuss 4	**07.09.2022**	**Kenntnis**
Krankenhausausschuss 1	**08.09.2022**	**Kenntnis**
Gesundheitsausschuss	**09.09.2022**	**Kenntnis**

Tagesordnungspunkt:

Tätigkeitsbericht des LVR-Instituts für Forschung und Bildung - LVR-Institut für Versorgungsforschung - vom 01.01.2021 - 31.12.2021

Kenntnisnahme:

Der Tätigkeitsbericht des LVR-Instituts für Forschung und Bildung - LVR-Institut für Versorgungsforschung - vom 01.01.2021 - 31.12.2021 wird gemäß Vorlage Nr. 15/1010 zur Kenntnis genommen.

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.	nein

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2020.	nein

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):

Produktgruppe:	
Erträge: Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan	Aufwendungen: /Wirtschaftsplan
Einzahlungen: Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:	Auszahlungen: /Wirtschaftsplan
Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:	
Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten	

Für den Vorstand

T h e w e s
Vorsitzender des Vorstands

Zusammenfassung

Das LVR-Institut für Versorgungsforschung wurde am 01.07.2014 gemäß einem empfehlenden Beschluss des Gesundheitsausschusses vom 14.03.2014 und einem Beschluss des Landschaftsausschusses vom 07.04.2014 gegründet. Ein Tätigkeitsbericht über die Arbeit des LVR-Instituts für Versorgungsforschung soll regelmäßig der politischen Vertretung vorgelegt werden. Am 01.01.2021 wurde das LVR-Institut für Versorgungsforschung mit der LVR-Akademie für Seelische Gesundheit im LVR-Institut für Forschung und Bildung (LVR-IFuB) zusammengeführt. Der Vorlage ist der Tätigkeitsbericht des LVR-Instituts für Forschung und Bildung – LVR-Institut für Versorgungsforschung - für den Zeitraum vom 01.01.2021 – 31.12.2021 beigefügt.

Begründung der Vorlage Nr. 15/1010:

Das LVR-Institut für Versorgungsforschung wurde am 01.07.2014 gemäß einem empfehlenden Beschluss des Gesundheitsausschusses vom 14.03.2014 und einem Beschluss des Landschaftsausschusses vom 07.04.2014 gegründet. Träger des Instituts ist der LVR-Klinikverbund. Gründungsdirektor war in Personalunion der Ärztliche Direktor des LVR-Klinikums Düsseldorf, Herr Univ.-Prof. Dr. med. Wolfgang Gaebel, stellvertretende Direktorin des Instituts Frau Prof. Dr. med. Euphrosyne Gouzoulis Mayfrank. Mit der Verabschiedung von Herrn Univ.-Prof. Dr. med. Wolfgang Gaebel in den Ruhestand ging die Leitung des Instituts am 01.10.2016 an Frau Prof. Dr. med. Euphrosyne Gouzoulis-Mayfrank, Ärztliche Direktorin der LVR-Klinik Köln, über. Am 01.01.2021 wurde das LVR-Institut für Versorgungsforschung mit der LVR-Akademie für Seelische Gesundheit im LVR-Institut für Forschung und Bildung (LVR-IFuB) zusammengeführt. Der Vorstand des LVR-IFuB besteht aus Stefan Thewes (Vorsitzender des Vorstands und Kaufmännische Direktion), Prof. Dr. Euphrosyne Gouzoulis-Mayfrank (Fachliche Direktion Forschung) und Andreas Kuchenbecker (Fachliche Direktion Bildung).

In der Sitzung des Gesundheitsausschusses am 19.11.2021 hatte Frau Prof. Dr. Euphrosyne Gouzoulis-Mayfrank den Tätigkeitsbericht des LVR-Instituts für Versorgungsforschung vom 01.10.2019 – 31.12.2020 vorgelegt und über die weitere Entwicklung des LVR-Instituts für Versorgungsforschung berichtet.

Der Vorlage ist der Tätigkeitsbericht des LVR-Instituts für Forschung und Bildung – LVR-Institut für Versorgungsforschung - vom 01.01.2021– 31.12.2021 zu Ihrer Information als Anlage beigefügt.

In der Sitzung des Gesundheitsausschusses am 09.09.2022 ist ein mündlicher Bericht von Frau Prof. Dr. Gouzoulis-Mayfrank vorgesehen.

Für den Vorstand

T h e w e s
Vorsitzender des Vorstandes

LVR-INSTITUT für VERSORGUNGSFORSCHUNG
Das wissenschaftliche Institut des LVR-Klinikverbunds

LVR-Institut für Forschung und Bildung

LVR Qualität für Menschen

LVR-Institut für Versorgungsforschung

Tätigkeitsbericht 2021

Berichtszeitraum: 1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021

E. Gouzoulis-Mayfrank, J. Zielasek, J. Hahn

Köln, 31. März 2022

Inhalt

1 Einleitung 4
2 Projekte ohne Drittmittelförderung 6
2.1 Institutsprojekte 6
2.1.1 (Weiter-)Entwicklung, Implementierung und Analyse von Qualitätsindikatoren im LVR-Klinikverbund 6
2.1.2 DeFEM – Determinanten freiheitsentziehender Maßnahmen 8
2.1.3 Evaluation der Genesungsbegleitung in den LVR-Kliniken 8
2.1.4 Evaluation der Behandlungsvereinbarungen der LVR-Kliniken 9
2.1.6 Analysen des Versorgungsgeschehens in der COVID-19-Pandemie 11
2.2 Projekte von LVR-Kliniken in Kooperation mit dem LVR-IVF 11
2.2.1 EVA-NETZ: Evaluation eines Modells der Integrierten Versorgung an der LVR-Klinik Köln 11
2.2.2 Projekt Ambulante Aufsuchende Suchtbehandlung 12
2.3 Beratung bei weiteren Projekten von LVR-Kliniken 12
3 Projekte mit Drittmittelförderung 14
3.1 eMEN: e-Mental Health innovation and transnational implementation platform North-West Europe 14
3.2 PsyKom: Psychosoziale Komplexbehandlung bei Psychischer Erkrankung 15
3.3 I-REACH: Internet-based Refugee Mental Healthcare 15
3.5 SoKo: Die Somatische Versorgung von Patient*innen mit psychischer Komorbidität 16
3.6 WohnLos: Wohnungslosigkeit bei psychischer Erkrankung: Risikofaktoren, Auswirkungen, Interventionen: Eine Bestandsaufnahme in Nordrhein-Westfalen 17
3.7 Auswertung der Routinedaten der BAG-Psychiatrie (Bundesarbeitsgemeinschaft der Träger psychiatrischer Krankenhäuser) 18
4 Drittmittelanträge 19
5 Fachtagungen/Fortbildungsveranstaltungen 20
6 Studentische Lehre/Seminare/Promotionen 21
7 Vorträge 23
8 Wissenschaftliche Publikationen 25
8.1 Originalarbeiten 25
8.2 Übersichtsarbeiten 26

8.3 Weitere Publikationen (Redaktionelle Beiträge, Diskussionspapiere, Kurzberichte und Editorials) 26
9 Vernetzung 27
10 Personal 30
11 Finanzen 31
12 Ausblick 32
Anhang 1: Programme der Veranstaltungen 34
Anhang 2: Publikationen 43

1 Einleitung

Das LVR-Institut für Versorgungsforschung (LVR-IVF) wurde im Jahre 2014 gegründet. Ziel der Institutsgründung war es, die Versorgungsforschung im LVR-Klinikverbund und im Bereich der psychischen Störungen zu intensivieren sowie bestehende Forschungsaktivitäten im Klinikverbund zu vernetzen. Das LVR-IVF versteht sich in diesem Sinne als **institutionelles Dach aller an der Versorgungsforschung interessierten Arbeitsgruppen in den LVR-Kliniken**. Eine der Hauptaufgaben ist die kontinuierliche Qualitätssicherung und -entwicklung mittels der **LVR-Qualitätsindikatoren**. Daher ist die Etablierung, Weiterentwicklung und Nutzung der Routinedaten einer verbundweiten **Statistikdatenbank** ein Schwerpunkt der Arbeit. Zudem ist die Entwicklung, Implementierung und Evaluation neuer Versorgungsmodelle ein wichtiges Arbeitsgebiet. Das LVR-IVF ist für die wissenschaftliche Programmgestaltung der **LVR-Symposien** und der **LVR-Fokustagungen** verantwortlich. Zudem forschen die Mitarbeitenden im Rahmen vielfältiger drittmittelfinanzierter Forschungsprojekte und sie beteiligen sich regelmäßig an Ausschreibungen, um Drittmittel für neue Forschungsprojekte einzuwerben.

In den ersten zwei Jahren nach der Gründung war das LVR-IVF am LVR-Klinikum Düsseldorf angegliedert. Mit der Emeritierung des Gründungsdirektors, Herrn Professor W. Gaebel, zog das Institut im Jahr 2016 nach Köln und war bis zum 31. Dezember 2020 organisatorisch eine Sparte der LVR-Klinik Köln.

Zum 1. Januar 2021 wurde die seit 2018 geplante Fusion des LVR-IVF mit der LVR-Akademie für Seelische Gesundheit zum neuen **LVR-Institut für Forschung und Bildung (LVR-IFuB)** in Form eines Wie-Eigenbetriebs realisiert. Im Berichtsjahr 2021 stand die Umsetzung der erforderlichen umfangreichen Struktur- und Prozessveränderungen im Vordergrund. Parallel dazu erfolgten erste Überlegungen und gemeinsame Planungen hinsichtlich der Zusammenarbeit beider Sparten und der Entwicklung von Synergien zwischen der Sparte Bildung und der Sparte Forschung. Die konkrete Umsetzung wird eine wichtige Aufgabe ab dem Jahr 2022 sein.

Neben der Gründung des LVR-IFuB war das Berichtsjahr 2021 - wie schon das Vorjahr - geprägt durch die COVID-19-Pandemie. Bewährte Veranstaltungen wie der LVR-IVF-Fortbildungstag, das Trialog-Forum sowie die Schulungen und Arbeitsgruppentreffen in den Projekten fanden als Online-Veranstaltungen statt. Bis Herbst 2021 waren die meisten Mitarbeiter*innen in Telearbeit, ab Oktober 2021 konnte in Anbetracht der Pandemieentwicklung vorübergehend sukzessive in die Präsenzarbeit zurückgekehrt werden. Jedoch schon ab Mitte November 2021 griff aufgrund der sich verschärfenden Pandemiesituation erneut die Home Office-Pflicht. Als vorteilhaft erwies sich, dass für die Institutsmitarbeitenden bereits vor Pandemiebeginn größtenteils die technischen Voraussetzungen für das Home Office geschaffen worden waren. Im Zuge dessen wurden Arbeitsprozesse weiter digitalisiert sowie elektronische Aktenführung und Archive ausgebaut. Bei stark veränderten Rahmenbedingungen wurden die wissenschaftlichen Forschungsprojekte fortgeführt und es wurden neue Projekte begonnen. Bei bestimmten Projekten kam es pandemiebedingt zu Verzögerungen und es wurden Anpassungen in Projektabläufen und Projektplänen erforderlich. Insgesamt war und ist die Pandemiezeit eine besondere Belastung und der Mangel an dem wichtigen persönlichen Austausch bei der wissenschaftlichen Arbeit wiegt schwer. Dennoch zeigten sich auch gewisse Vorteile der Telearbeit und des Rückgangs der Reisetätigkeiten, die punktuell mit Produktivitäts- und Effizienzgewinnen einhergingen.

Im Berichtsjahr 2021 intensivierten sich die Arbeiten im Bereich mehrerer institutseigener Projekte, insbesondere in den Bereichen Evaluation von Behandlungsvereinbarungen, Analysen der Situation von Patient*innen mit Intelligenzminderung im Maßregelvollzug und Analysen des Versorgungsgeschehens in der CoVid-Pandemie. Eine Intensivierung gab es zudem im Bereich der partizipativen Forschung: Ausgehend vom **Trialog-Forum** des Instituts bildeten sich drei neue Arbeitsgruppen, die im Jahr 2021 ihre Arbeit aufnahmen. Im Drittmittelbereich intensivierten sich die Arbeiten insbesondere bei den Projekten I-REACH und WohnLos, die pandemiebedingt mit erheblichen Problemen bei der Durchführung und mit Verzögerungen zu kämpfen hatten

Im Folgenden werden die Projekte mit und ohne Drittmittelförderung sowie die im Jahr 2021 neu eingereichten Drittmittelanträge dargestellt. Es folgen Angaben zu den wissenschaftlichen Fachveranstaltungen, den wissenschaftlichen Vorträgen und den wissenschaftlichen Publikationen. Außerdem werden die Themenfelder Vernetzung, Beratung und Lehre sowie Finanzen dargestellt. Abschließend geben wir einen Ausblick auf die kommenden Jahre.

2 Projekte ohne Drittmittelförderung

Im Folgenden werden diejenigen Projekte beschrieben, bei denen das LVR-IVF federführend ist oder bei denen das LVR-IVF die LVR-Kliniken wissenschaftlich unterstützt.

2.1 Institutsprojekte

2.1.1 (Weiter-)Entwicklung, Implementierung und Analyse von Qualitätsindikatoren im LVR-Klinikverbund

Die Qualitätsindikatoren des LVR-Klinikverbunds (LVR-QI) wurden seit 2016 zunächst für den Bereich der **Erwachsenenpsychiatrie** entwickelt und ab 2018 im LVR-Klinikverbund implementiert. Das QI-Set enthält vier Ergebnis-, acht Prozess- und vier Strukturindikatoren sowie eine Patient*innenbeurteilung. Für die Analysen nutzt das LVR-IVF die **Statistikdatenbank**, in die Routinedaten aus dem Krankenhausinformationssystem (KIS) der LVR-Kliniken übernommen und pseudonymisiert werden. Diese unter Federführung des LVR-Fachbereichs 81 (Personelle und Organisatorische Steuerung, Abteilung IT und Statistik) erstellte Statistikdatenbank ist die maßgebliche Datenquelle für die Analysen der LVR-QI und anderer Analysen von klinischen Routinedaten des LVR-Klinikverbunds.

Im Berichtszeitraum hat das Institut den fünften kommentierten QI-Bericht für den Bereich der Allgemeinen Psychiatrie **(„Erwachsenenpsychiatrie“**, Datenjahr 2020) mit Auswertung aller Qualitätsindikatoren erstellt. Die Ergebnisse der Qualitätsindikatoren wurden mit Ergebnissen aus der deutschsprachigen und der internationalen Literatur verglichen. Hierbei zeigten sich keine auffälligen Abweichungen. Zudem wurden die Ergebnisse mit den Vorjahren verglichen. Aufgrund der COVID-19-Pandemie zeigten sich reduzierte Fallzahlen im Vergleich zu den Vorjahren. Zudem gab es pandemiebedingt weniger psychosoziale Gruppentherapien und sowohl relativ als auch absolut mehr Zwangsmaßnahmen im Vergleich zum Vorjahr. Zusätzlich wurde die Patient*innenzufriedenheits-Befragung mit dem ZUF-8-Fragebogen in den meisten LVR-Kliniken kontinuierlich erhoben. Die Rücklaufquoten solcher Befragungen liegen erfahrungsgemäß bei 30 bis 40 %. Im LVR-Klinikverbund lag die durchschnittliche Rücklaufquote im Jahr 2020 bei 24% und ist somit im Vergleich zum Vorjahr um 4% gefallen. Dies dürfte auf die Pandemiesituation zurückzuführen sein. Im Rahmen eines Trainee-Projektes des LVR wurden von einem Trainee Einzelinterviews mit Professionellen aus den LVR-Kliniken geführt und mittels standardisierter qualitativer wissenschaftlicher Verfahren ausgewertet. Es war das Ziel, Hinweise für mögliche Interventionen zur Erhöhung der Rücklaufquote zu erhalten. Die Interviewten wiesen u. a. darauf hin, dass es (noch) Unklarheiten über die Erhebungsprozesse auf den Stationen gibt, sodass hier lokale Initiativen zur Prozessoptimierung als mögliche Lösungsansätze erscheinen. Hierüber wurde auch im QI-Newsletter berichtet. Im Berichtszeitraum fanden das jährliche klinikübergreifende Arbeitstreffen des LVR-IVF mit Klinikvertreter*innen (29. Oktober 2021) und die jährliche Multiplikator*innen-Schulung für die CGI- und GAF-Beurteilungen (10. September 2021) online statt. Die Quoten zu den CGI- und GAF-Dokumentationen wurden quartalsweise an die Kliniken gemeldet. Die Ergebnisse des fünften QI-Berichts wurden im Lenkungsausschuss Qualitätsmanagement (LA-QM) in zwei Sitzungen (17. Juni 2021 und 2. Dezember 2021) vorgestellt. Des Weiteren wurden die Ergebnisse im Herbst und Winter 2021 bei Vorträgen in den LVR-Kliniken Bedburg-Hau, Bonn, Düren, Düsseldorf und Viersen präsentiert.

Im Jahr 2021 wurden vier QI-Newsletter erstellt und an die klinischen Mitarbeitenden der LVR-Kliniken versendet. Im Fokus standen dabei die Themengebiete *Messung der Patientenzufriedenheit* (März

2021), *Messung des Behandlungserfolgs* (Mai 2021), *Einflüsse der COVID-19-Pandemie auf die Versorgung* (August 2021) und *Psychosoziale Therapien* (Dezember 2021, Versand im Januar 2022). Ende des Jahres 2021 hat das LVR-IVF das QI-Dokumentationsmanual mit Anleitungen zur Dokumentation einzelner QI im KIS aktualisiert und im Dezember 2021 an die Kliniken versendet. Das LVR-IVF beteiligte sich an einer Arbeitsgruppe der Ärztlichen Leitungen der LVR-Kliniken, die ein Codebuch für die psychosozialen Therapien entwickelte. Ziel der Erstellung des Codebuchs war die Förderung einer klinikverbundweit einheitlichen Dokumentation für den Prozessindikator QI P4 (Dichte der psychosozialen Therapien). Im LA-QM am 2. Dezember 2021 wurden einige Veränderungen und Vereinfachungen des LVR-QI-Sets beschlossen: So wurde der diagnosespezifische QI P5a *Antipsychotische Polypharmazie* gestrichen und der QI P5b *Polypharmazie bei Entlassung* vereinfacht. Für den QI P4 *Psychosoziale Interventionen* wurde beschlossen, dass alle therapeutischen Berufsgruppen ab dem Jahr 2022 wieder die Therapieeinheiten nach OPS kodieren, um eine einheitliche Datengrundlage für den QI zu schaffen. Ab 2022 werden die Ergebnis- und Prozess-QI sowohl in der Erwachsenenpsychiatrie als auch für die Kinder- und Jugendpsychiatrie geschlechtsspezifisch ausgewertet. Im Tätigkeitsfeld Qualitätsindikatoren wird derzeit eine medizinische Promotionsarbeit betreut, die sich mit der Entwicklung, Durchführung und Evaluation von Expert*innen-Interviews zu den Ursachen der Polypharmazie im LVR-Klinikverbund beschäftigt.

Die LVR-QI im Bereich der **Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP)** wurden seit 2018 entwickelt und ab 2020 im LVR-Klinikverbund implementiert. Das QI-Set der KJP enthält zwei Ergebnis-, sieben Prozess- und vier Strukturindikatoren. Im Februar 2020 wurde der KJPPP-QI-Monitor im Krankenhausinformationssystem implementiert und mit den neuen Dokumentationsfeldern zur Beurteilung der *Health of the Nation Outcomes Scale Children and Adolescents* (HoNOSCA) bei Aufnahme und Entlassung versehen. Im Berichtszeitraum erstellte das Institut den ersten kommentierten QI-Bericht zu allen Qualitätsindikatoren der KJP (Datenjahr 2020). Im Laufe des Jahres 2021 wurden quartalsweise die Dokumentationsquoten der HoNOSCA berechnet und den LVR-Kliniken mit KJPPP-Abteilungen berichtet. Die dritte HoNOSCA-Mulitplikator*innen-Schulung fand am 24. September 2021 statt. Das klinikübergreifende Arbeitstreffen mit Vertreter*innen der KJP-Kliniken und dem LVR-IVF fand am 12. November 2021 statt. Die Ergebnisse des KJP-QI-Berichts wurden im LA-QM in zwei Sitzungen vorgestellt und diskutiert. In diesem Rahmen wurden Modifikationen am LVR-KJP-QI-Set ab 2022 beschlossen (Latenz von bis zu drei Tagen nach Aufnahme und Entlassung bei der Beurteilung der HoNOSCA; für den KJP-QI P4 *Psychosoziale Interventionen* Erfassung von Therapieeinheiten ab einer Dauer von 15 Minuten). Zudem fanden Arbeitsgespräche mit der Fachkonferenz KJPPP am 24. September, 11. November und 16. Dezember 2021 statt, bei denen Zusatzauswertungen vorgestellt und mögliche Modifikationen (insbes. Ausweitung der Beurteilung nach HoNOSCA auf Fälle mit kurzer Verweildauer) sowie Weiterentwicklungen (Entwicklung einer Patient*innen- und Eltern-Beurteilung) diskutiert wurden. Diese Arbeitsgespräche werden im Jahr 2022 fortgeführt. Ende des Jahres 2021 hat das LVR-IVF das KJP-QI-Dokumentationsmanual im KIS aktualisiert und an die Kliniken versendet. Für das Datenjahr 2022 werden halbjährlich Berichte zu den KJP-Prozessindikatoren für die Fachkonferenz KJPPP erstellt.

Im Bereich der suchtmedizinischen Versorgung begannen auf Initiative der Fachkonferenz Sucht im zweiten Halbjahr 2021 erste Beratungen zur Entwicklung suchtspezifischer Qualitätsindikatoren. Schließlich wurden ab Ende des Berichtsjahrs die Arbeiten an einer ersten wissenschaftlichen Publikation zum Entwicklungs- und Implementierungsprozess der Qualitätsindikatoren im LVR-Klinikverbund begonnen. Das deutschsprachige Manuskript wird voraussichtlich im 2. Quartal 2022 zur Publikation eingereicht.

2.1.2 DeFEM – Determinanten freiheitsentziehender Maßnahmen

Das LVR-IVF beschäftigt sich seit mehreren Jahren mit der Identifizierung (modifizierbarer) Risikofaktoren für Zwangseinweisungen und weitere Zwangsmaßnahmen in der stationären Krankenhausbehandlung psychisch erkrankter Menschen. Bislang wurden eine große retrospektive und eine prospektive Datenerhebung in allen psychiatrischen Kliniken in Köln und in zwei weiteren LVR-Kliniken mit hohen Fallzahlen durchgeführt. Die soziodemographischen und klinischen Risikofaktoren für Zwangsaufnahmen einschließlich deren Interaktionen und besondere Risikogruppen wurden dabei mittels Maschinenlernverfahren ermittelt, die im Rahmen des Projektes optimiert wurden. Als wesentliche Risikofaktoren für unfreiwillige Einweisungen zeigten sich Diagnosen einer organischen psychischen Störung (ICD-10 F0) und einer Psychose (ICD-10 F2), die Art der prästationären Versorgung und die Aufnahmezeit außerhalb regulärer Dienstzeiten. Zusätzlich zeigte sich eine Relevanz von Umgebungsfaktoren wie eine hohe Arbeitslosenquote, eine dichte Bebauung und ein hoher Anteil an Ein-Personenhaushalten in der Wohnumgebung der Patient*innen. In den vergangenen Jahren wurden diese Ergebnisse bereits wissenschaftlich publiziert *(Schmitz-Buhl et al 2019; Karasch et al 2020)*.

Im Berichtsjahr wurden die Daten der retrospektiven Erhebung sekundär analysiert im Hinblick auf mögliche Unterschiede und differentielle Präventionsansätze für Patient*innen, die in unterschiedlichen Behandlungsphasen unfreiwillig untergebracht werden (direkt bei der Aufnahme vs. im weiteren Verlauf). Im Ergebnis waren die Unterschiede relativ gering, so dass keine spezifischen Präventionsansätze für die zwei Untergruppen vorgeschlagen werden können. Die Ergebnisse wurden zwischenzeitlich zur Publikation eingereicht *(Peters et al, eingereicht)*.

2.1.3 Evaluation der Genesungsbegleitung in den LVR-Kliniken

Genesungsbegleitende sind Personen, die selbst psychisch erkrankt und in psychiatrisch-psychotherapeutischer Behandlung waren. Sie haben eine Ex-In-Schulung *(Ex-In: Experienced Involvement)* abgeschlossen und unterstützen den Genesungsprozess anderer Betroffener. Die Evidenz zu Art und Ergebnissen des Einsatzes von Genesungsbegleitenden in psychiatrisch-psychotherapeutischen Kliniken ist begrenzt und das Projekt dient dem Ziel, diese Kenntnisbasis empirisch zu verbessern.

Das Projekt hatte im Oktober 2018 mit einer Befragung von Genesungsbegleitenden und klinischem Personal (ärztliches und pflegerisches Personal sowie Sozialdienst der LVR-Kliniken) begonnen, dabei hatte sich eine positive Bewertung der Bedeutung der Genesungsbegleitung und der Zusammenarbeit mit den Stationsteams von beiden Seiten gezeigt. Die Ergebnisse waren im Jahr 2020 zur Veröffentlichung angenommen worden und die Publikation erschien im Berichtsjahr *(Groß et al 2021*).

Ab Januar 2021 wurde in Zusammenarbeit von Dezernat 8 und LVR-IVF ein Tätigkeitserfassungsbogen für Genesungsbegleitende entwickelt, mit dem Ziel, das Tätigkeitsspektrum der Genesungsbegleitenden näher zu beschreiben. Der Erfassungsbogen wurde im Frühjahr 2021 an die Genesungsbegleitenden im LVR-Klinikverbund verteilt und es wurden mehr als 1.550 Bögen zurückgesendet. Dies ermöglichte einen detaillierten Einblick in die alltägliche Beratungstätigkeit der Genesungsbegleitenden im Klinikverbund. Die Analysen erfolgten durch das LVR-IVF und wurden in einem ersten vorläufigen Bericht Ende Mai 2021 dem Fachbereich 84 und den Genesungsbegleitenden vorgestellt. Wesentliche Ergebnisse der Tätigkeitserfassung waren, dass die Kontakte mehrheitlich (57%) eine Dauer bis 30 Minuten hatten und dass die Kontaktpersonen in den meisten Fällen (67%) Betroffene waren. Kontakte mit Angehörigen kamen nur selten vor. Ungefähr die Hälfte der Kontakte fand mit

einer betroffenen Person im Einzelgespräch statt, Gruppenkontakte gab es eher seltener. Ein Großteil der Kontakte fand im stationären Bereich statt: 59% in offenen Stationen, 21% in geschützten Stationen und 7% in Tageskliniken. In den meisten Fällen fanden die Kontakte in einer Abteilung für Allgemeinpsychiatrie (50%) oder in einer Abteilung für Abhängigkeitserkrankungen (32%) statt. Aufsuchende Kontakte haben nur in einem äußerst geringen Ausmaß (5%) stattgefunden. Als Inhalte der Kontakte wurden überwiegend „Stabilisieren“ (28%) oder „Reflektieren“ (23%) angegeben. Der finale Bericht des LVR-IVF zur Tätigkeitserfassung der Genesungsbegleitenden wurde im Sommer des Jahres 2021 dem Fachbereich 84 übermittelt.

2.1.4 Evaluation der Behandlungsvereinbarungen der LVR-Kliniken

Behandlungsvereinbarungen zielen darauf ab, die Autonomie der Patient*innen zu fördern sowie Zwangsmaßnahmen zu minimieren. Diese gewünschten positiven Effekte von Behandlungsvereinbarungen zeigen sich jedoch nicht in allen Studien, so dass sich vermehrter Forschungsbedarf hinsichtlich der erreichten Zielgruppen sowie hinsichtlich der Wirkungen des Abschlusses einer Behandlungsvereinbarung ergibt. In psychiatrisch-psychotherapeutischen Kliniken in Deutschland ist das Angebot von Behandlungsvereinbarungen zwar vorhanden, die Nutzungsrate durch die Betroffenen ist jedoch gering. Das LVR-IVF hat seit 2018 an einem Konzept zur Evaluation und nachfolgend an den Vorbereitungen für eine konkrete Evaluation der Behandlungsvereinbarungen im LVR-Klinikverbund anhand von Routinedaten aus dem Krankenhausinformationssystem gearbeitet. Zunächst wurde die Datenlage geprüft und es wurde definiert, nach welchen Standards eine vorhandene Behandlungsvereinbarung im Krankenhausinformationssystem dokumentiert wird.

Nach weiteren Arbeitsschritten und Abstimmungen mit den LVR-Kliniken u. a. zu den Datengrundlagen begann LVR-IVF ab Herbst 2020 mit den Analysen. Bei den Analysen ging es zunächst um die Frage, ob die „richtigen“ Patient*innen eine Behandlungsvereinbarung abschließen, worunter ausweislich einer hohen Anzahl an stationären Voraufenthalten und hohen Raten von Zwangsunterbringungen und anderen Zwangsmaßnahmen die besonders schwer Betroffenen zu verstehen waren. Im Einzelnen wurden die Hypothesen überprüft, dass Patient*innen mit Behandlungsvereinbarung häufiger Diagnosen aus den Bereichen der Schizophrenien und der Bipolaren Störungen (ICD-10-Gruppen F2 und F30/F31) aufweisen, und dass sie vor dem Abschluss der Behandlungsvereinbarungen häufiger stationäre Aufenthalte und insbesondere häufiger unfreiwillige Aufenthalte und Aufenthalte mit weiteren Zwangsmaßnahmen aufweisen.

Als Studiendesign wurde eine retrospektive Datenerhebung gewählt, bei der die Anzahl und der Anteil der Patient*innen mit abgeschlossenen Behandlungsvereinbarungen ermittelt wurden. Es wurden alle voll- und teilstationären Fälle im Zeitraum 1.1.2017 bis 31.12.2020 im Bereich Psychiatrie und Psychotherapie (Fachbereich 29) betrachtet, wobei bei Patient*innen mit mehreren Aufnahmen im Untersuchungszeitrum die jeweils erste Aufnahme als „Indexaufnahme“ herangezogen wurde. Auf diese Weise konnten bei der Analyse knapp 100.000 Betroffene bzw. knapp 200.000 Fälle berücksichtigt werden. Zur Betrachtung der Anzahl der stationären Voraufenthalte sowie zu bei Voraufenthalten durchgeführten Zwangsunterbringungen und anderen Zwangsmaßnahmen wurde ein retrospektiver Beobachtungszeitraum von 36 Monaten vor der Indexaufnahme gewählt.

Das Vorliegen einer Behandlungsvereinbarung war bei ca. 0,5% der Betroffenen bzw. bei 1,3% der Fälle dokumentiert. Alle eingangs formulierten Hypothesen wurden bestätigt. Zusätzlich zeigte sich, dass Frauen häufiger als Männer eine Behandlungsvereinbarung abschließen. Zudem wurde deutlich, dass

neben PatientInnen mit Schizophrenien und Bipolaren Störungen relativ häufig auch Betroffene mit einer Persönlichkeitsstörung (ICD-10 F6) Behandlungsvereinbarungen abschließen. Ein ausführlicher Bericht des LVR-IVF wurde im Frühjahr 2021 dem Fachbereich 84 vorgelegt. Die Ergebnisse wurden im November 2021 im Rahmen des DGPPN-Kongresses vorgestellt. Des Weiteren ist eine Publikation in einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift in Vorbereitung.

Im Jahr 2022 soll anhand einer Längsschnittuntersuchung geprüft werden, ob der Abschluss von Behandlungsvereinbarungen einen günstigen Einfluss auf die Versorgungsverläufe ausübt, insbesondere im Sinne einer Vermeidung von Drehtüreffekten und Zwangsmaßnahmen.

2.1.5 Situation von Patient*innen mit Intelligenzminderung im Maßregelvollzug

Psychisch kranke Straftäter*innen können nach §63 StGB (Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus) forensisch untergebracht und behandelt werden, wenn sie zum Zeitpunkt des Begehens der Straftat aufgrund ihrer psychischen Erkrankung nicht oder vermindert schuldfähig waren. Die Verweildauern im Maßregelvollzug belaufen sich auf mehrere Jahre. Besonders lang sind die Verweildauern bei Patient*innen mit Intelligenzminderung (ICD-10 Diagnosegruppe F7). Daraus ergibt sich das Interesse an Behandlungskonzepten und der Identifizierung konkreter Entlasshindernisse bei dieser Gruppe von Betroffenen.

Im Jahr 2021 wurden im Auftrag des Fachbereichs 82 zunächst die Stationskonzepte der forensischen Abteilungen der LVR-Kliniken hinsichtlich allgemeiner und störungsspezifischer Behandlungselemente für Betroffene mit Intelligenzminderung qualitativ analysiert. Dabei zeigte sich, dass störungsspezifische Behandlungselemente in sehr unterschiedlichem Maße in den Konzepten beschrieben werden. Ein ausführlicher Bericht über die Analyse der Stationskonzepte wurde im Dezember 2021 vorgelegt und in einem Arbeitstreffen mit dem FB 82 vorgestellt und diskutiert.

Zudem wurden die Routinedaten der forensischen Abteilungen der LVR-Kliniken mit dem Fokus auf PatientInnen mit F7-Diagnosen analysiert. Die Analyse wurde mit Hilfe der Statistikdatenbank des Klinikverbunds als Stichtagsuntersuchung zum 1. April 2021 durchgeführt. An diesem Stichtag waren 92 Patient*innen (6%) mit einer F7-Hauptdiagnose und 91 Patient*innen (5%) mit einer F7-Nebendiagnose in den MRV-Einrichtungen der LVR-Kliniken untergebracht. Bei den Betroffenen lag häufig eine Kombination mit Nebendiagnosen aus dem Spektrum der Persönlichkeitsstörungen und der Störungen der Sexualpräferenz (ICD-10 F6: ca. 1/3), der Abhängigkeitserkrankungen (ICD-10 F1: ca. 1/4) oder der Schizophrenien (ICD-10 F2: ca. 1/10) vor. Bei Patient*innen mit einer F6-Nebendiagnose waren dies in der Mehrzahl Diagnosen der spezifischen oder kombinierten Persönlichkeitsstörungen (ICD-10 F60/F61: ca. 2/3) oder der Störungen der Sexualpräferenz (ICD-10 F65: ca. 1/3). Die Anlassdelikte waren häufig aus dem Bereich der Sexualstraftaten. Die Verweildauer lag bei den Patient*innen mit Hauptdiagnose aus der ICD-10-Gruppe F7 mit durchschnittlich ca. 10 Jahren etwa doppelt so hoch wie bei Patient*innen mit einer anderen Hauptdiagnose. Eine ausführliche Präsentation mit den Ergebnissen wurde im Dezember 2021 fertiggestellt und in einem Arbeitstreffen mit dem FB 82 vorgestellt und diskutiert.

Schließlich wurde eine Literaturrecherche zu Behandlungskonzepten für Straftäter*innen mit Intelligenzminderung in deutsch- und englischsprachigen Quellen durchgeführt, die eine Vielzahl von Treffern ergab. Am häufigsten werden in der Literatur die Themen Psychotherapie und Pharmakotherapie behandelt, und eher selten fanden sich Studien zu heilpädagogischen Hilfen oder der Organisation der Versorgung für diese Betroffenengruppe. Ein Zwischenbericht wurde dem

Fachbereich 82 im Dezember 2021 vorgestellt. Im Jahr 2022 soll die Analyse der Literatur finalisiert und ein Bericht erstellt werden.

Darüber hinaus sind für das Jahr 2022 qualitative Interviews mit den Behandelnden zu den besonderen Herausforderungen in der Behandlung dieser Betroffenengruppe im Maßregelvollzug geplant. Der Fokus soll auf die Hindernisse für Lockerungen und Entlassungen und auf mögliche Hilfen bei der Überwindung dieser Hindernisse liegen.

2.1.6 Analysen des Versorgungsgeschehens in der COVID-19-Pandemie

Bereits wenige Monate nach dem Beginn der COVID-Pandemie beschrieb das LVR-IVF in einem redaktionellen Beitrag im *Deutschen Ärzteblatt* die möglichen Auswirkungen auf das Versorgungssystem im Bereich der psychischen Störungen *(Zielasek und Gouzoulis-Mayfrank, 2020).* Im weiteren Verlauf des Jahres 2020 und im Jahr 2021 wurden wissenschaftliche Analysen zur Versorgungsinanspruchnahme im LVR-Klinikverbund während der COVID-19-Pandemie anhand der Routinedaten der Statistikdatenbank durchgeführt. Während der ersten Welle der Pandemie zeigte sich im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum des Vorjahres ein Rückgang der voll- und teilstationären Fallzahlen um 25 %, der im teilstationären Versorgungsbereich relativ stärker als im vollstationären Bereich ausgeprägt war. Die Fallzahlreduktion betraf vorwiegend die affektiven Störungen und die Suchterkrankungen, während es bei einzelnen akuten psychischen Störungen zu einem Fallzahlanstieg kam (Delir und akuter polymorpher psychotischer Störung). Die Analysen zum Versorgungsgeschehen in der ersten Pandemiewelle wurden im Berichtszeitraum bereits international publiziert *(Zielasek et al 2021).*

Weitere Analysen für den Zeitraum bis Herbst 2021 zeigten im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum der Vorjahre weiterhin einen Rückgang der voll- und teilstationären Fallzahlen um ca. 15%. Die Verschiebungen im diagnostischen Spektrum waren ähnlich wie in der ersten Pandemiewelle. Es wurde eine Zunahme von Zwangsmaßnahmen verzeichnet, die mit der konflikteskalierenden Wirkung der Durchsetzung von Hygieneschutzmaßnahmen bei Patient*innen mit akuten psychischen Erkrankungen in Zusammenhang stehen dürfte. Die Analyseergebnisse wurden im LVR-Fortbildungstag 2021 präsentiert und eine Publikation ist in Vorbereitung. Darüber hinaus wurden im Berichtszeitraum erste Analysen zur Versorgungssituation im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie durchgeführt. Weitere Analysen sind im Rahmen einer Promotionsarbeit in Planung.

2.2 Projekte von LVR-Kliniken in Kooperation mit dem LVR-IVF

2.2.1 EVA-NETZ: Evaluation eines Modells der Integrierten Versorgung an der LVR-Klinik Köln

Das LVR-IVF evaluiert ein sektorübergreifendes Modell der Integrierten Versorgung, das im Rahmen des bundesdeutschen Netzwerks psychische Gesundheit (NWpG) an der LVR-Klinik Köln durchgeführt wird. Partner im NWpG Köln sind der Kölner Verein für Rehabilitation e. V., die LVR-Klinik Köln sowie mehrere Krankenkassen wie u. a. Techniker Krankenkasse, AOK, Pronova BKK und weitere Betriebskrankenkassen. Hauptziele der Evaluation sind die Erfassung der Wirksamkeit des Versorgungsmodells zur Vermeidung stationärer Krankenhausaufenthalte, die Überprüfung der Behandlungsqualität sowie die Bewertung der Modellumsetzung.

Die Arbeiten der begleitenden Evaluation durch das LVR-IVF begannen im Jahr 2018. Es werden zum einen Routinedaten der elektronischen Krankenakte wie die Art und Anzahl der Diagnosen sowie die Anzahl der stationären Behandlungstage ausgewertet. Zum anderen kommen standardisierte klinische Fragebögen zur Erfassung der Lebenszufriedenheit und der Symptombelastung zum Einsatz. Schließlich werden spezifische Erhebungsinstrumente zum Beispiel zur Erfassung der Therapieelemente genutzt, die zum Teil im Rahmen des Projektes neu entwickelt wurden. Die Baselinebefragungen und die Nachbefragungen sechs, zwölf und 24 Monate nach Einschluss in die Integrierte Versorgung wurden im Sommer 2021 abgeschlossen. Nach abgeschlossener Überprüfung der Datenqualität und -plausibilität sind die finalen Analysen und eine wissenschaftliche Publikation für das Jahr 2022 geplant.

2.2.2 Projekt Ambulante Aufsuchende Suchtbehandlung

Die LVR-Klinik Langenfeld fragte im Herbst 2021 eine Beratung hinsichtlich einer möglichen Evaluation eines Projekts zur Aufsuchenden Ambulanten Suchtbehandlung (AAS) an. Das Projekt AAS war in den Jahren 2017 bis 2020 in der LVR-Klinik Langenfeld mit Förderung des Landes NRW durchgeführt worden. Hierbei war eine aufsuchende ambulante Suchtbehandlung nach stationären Aufenthalten implementiert worden. Die Projektziele lagen in der Rückfallprophylaxe, der Verbesserung der Lebensqualität und der Reduzierung von Drehtür-Wiederaufnahmen bei den Patient*innen. Die ersten Zwischenergebnisse wurden 2021 zwischen LVR-IVF und der Projektleitung diskutiert. Für das Jahr 2022 sind weitergehende statistische Analysen durch LVR-IVF vorgesehen.

2.3 Beratung bei weiteren Projekten von LVR-Kliniken

Neben den oben beschriebenen Projekten unterstützte und beriet das LVR-IVF mehrere Arbeitsgruppen und Mitarbeitende aus den LVR-Kliniken hinsichtlich der Implementierung und/oder Evaluation neuer Versorgungsangebote sowie Modellprojekte z. B. bei der Auswahl adäquater Studiendesigns, Erhebungsinstrumente und Auswertungsmethoden. Zu diesen Projekten gehören:

- Evaluation von zwei neu eingerichteten ambulanten Spezialsprechstunden an der Abteilung für Psychosomatische Medizin der LVR-Klinik Köln: Sprechstunde für Professionelle, die mit COVID-Patient*innen in der klinischen Versorgung arbeiteten, sowie Sprechstunde für Betroffene mit Long-COVID-Syndrom. In diesem Zusammenhang erstellte das LVR-IVF im Oktober 2021 auch Empfehlungen für eine Testbatterie zur umfassenden Erhebung möglicher Symptome, die in Zusammenhang mit dem Long-COVID-Syndrom auftreten können.

- DynaLive (Dynamische, Lebensnahe, Integrative Versorgung), ein sektorübergreifendes Versorgungsmodell der LVR-Klinik Bonn nach § 64b SGB V, das extern evaluiert wird. Das LVR-IVF hatte in den Vorjahren gemeinsam mit den Projektverantwortlichen der LVR-Klinik Bonn eine ergänzende Evaluation des Modellprojektes durchgeführt. Bedingt durch die COVID-Pandemie kam es zu erheblichen Veränderungen der Versorgungsprozesse, die die Evaluation erschwerten. Ab 2021 wurde an der LVR-Klinik Bonn ein in der Versorgungsanalyse erfahrener Mitarbeiter gewonnen, der das Projekt fachlich weiter begleiten und die Evaluation vor Ort durchführen wird. Hierbei wird das LVR-IVF unterstützend und beratend einbezogen. Im Herbst 2021 fanden hierzu erste Gespräche statt.

- Ein Projekt zur Implementierung der stationsäquivalenten Behandlung am LVR-Klinikum Düsseldorf. Hierzu fand Ende 2021 ein erstes Gespräch mit der Projektleitung statt.

Schließlich beriet und unterstützte die Direktorin des LVR-IVF an der LVR-Klinik Köln einen Pflegewissenschaftler bei der Entwicklung eines psychometrischen Instruments zur Erhebung der Haltung des Fachpersonals psychiatrischer Kliniken zu Zwangsmaßnahmen. Diese Arbeit wurde im Jahr 2021 als Promotion zum Dr. rer. med. an der Medizinischen Fakultät der Universität zu Köln unter Betreuung der Direktorin des LVR-IVF abgeschlossen. Ferner wurde die Arbeit in einer deutschsprachigen Peer-reviewten Zeitschrift veröffentlicht *(Baar et al 2021)*.

3 Projekte mit Drittmittelförderung

3.1 eMEN: e-Mental Health innovation and transnational implementation platform North-West Europe

Förderung: Europäischer Strukturfonds Interreg North West Europe
Förderdauer: Mai 2016 – November 2019; Verlängerung zunächst bis Mai 2020 und weitere Verlängerung als zweite Förderperiode bis Dezember 2021

Die Förderung erfolgte im Rahmen eines europäischen Programms zur regionalen Infrastrukturförderung in Nordwest-Europa (InterReg North West Europe). Das unter niederländischer Konsortialführung stehende multinationale Projekt zur Implementierung und Evaluation von e-Mental-Health-Anwendungen begann im Mai 2016 und war zunächst bis November 2019 gefördert worden. Es folgte eine Verlängerung bis Mai 2020. Das LVR-IVF war in dieser ersten Förderperiode als verantwortliche Leitung eines Arbeitspaketes für die Entwicklung europäischer Politikempfehlungen für die Implementierung von e-Mental-Health verantwortlich (Projektleitung: Professor Gaebel). Darüber hinaus beteiligte sich das LVR-IVF an drei weiteren Arbeitspaketen zur Produktentwicklung und -implementierung, zur Öffentlichkeitsarbeit sowie zur Erarbeitung einer transnationalen Kooperationsplattform.

Im Juni 2020 begann als weitere Verlängerung eine zweite Förderperiode, die auf die Implementierung von e-Mental Health in der Praxis fokussierte *(Capitalization)*. Damit einher ging die Projektleitung von Professor Gaebel auf Professor Gouzoulis-Mayfrank über. Im Vordergrund des Berichtsjahres stand im LVR-IVF die Implementierung von e-Mental Health in der klinischen Praxis. Die Projektleitung und eine Projektmitarbeiterin nahmen regelmäßig an den Treffen der internationalen Steuerungsgruppe sowie der verschiedenen Arbeitsgruppen teil, die pandemiebedingt ausschließlich digital stattfanden.

Zwischen Januar und Oktober 2021 wurden in Zusammenarbeit mit den internationalen Partnerorganisationen e-Mental Health-Schulungen für klinisches Personal konzipiert, die bis zum Ende des Förderzeitraums in fünf Kliniken des LVR-Verbundes durchgeführt wurden (Bedburg-Hau, Bonn, Düren, Langenfeld, Viersen). Dabei wurden die aktuellen digitalen Gesundheitsanwendungen vorgestellt, praktische Hinweise zur Implementierung von Videosprechstunden gegeben und in einem Ausblick die neuen technischen Entwicklungen wie die Nutzung von Echtzeitdaten oder das Metaverse vorgestellt.

Zudem wurden fünf sogenannte Policy Meetings durchgeführt, die dem Austausch mit Akteur*innen aus dem deutschen Gesundheitswesen und weiteren Stakeholdern zum Thema e-Mental Health dienten. Zu den Gesprächspartner*innen zählten Vertreter*innen von Klinikverbünden, Krankenkassen und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Die Ergebnisse der Interviews in Deutschland wurden der niederländischen Projektkoordination mitgeteilt, die sie mit den Erfahrungen der weiteren Partnerländer in einem Bericht bündeln wird..

Des Weiteren wurde im Herbst 2021 ein wissenschaftliches Online-Symposium zum Thema „E-Mental-Health-Implementierung – von der Theorie in den psychiatrisch-psychotherapeutischen Versorgungsalltag“ organisiert. Das Programm des Symposiums findet sich im Anhang 1.

Mit dem Ende der finanziellen Förderung am 31. Dezember 2021 endete die Projektbeteiligung. Das LVR-IVF wird im Jahr 2022 an der weiteren Ergebnisaufbereitung gemeinsam mit den früheren Projektpartnern beteiligt sein. Diese erfolgt im Rahmen einer nicht durch neue finanzielle Mittel unterstützten Projektverlängerung bis Juni 2022.

3.2 PsyKom: Psychosoziale Komplexbehandlung bei Psychischer Erkrankung

Förderung: Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW
Förderdauer: Juli 2017 – Dezember 2019; Verlängerung bis Juni 2020

Das Projekt PsyKom zielte auf eine Verbesserung der Versorgung psychisch schwer erkrankter Menschen, die die vorhandenen psychosozialen Hilfen nicht nutzen, eine eingeschränkte soziale Teilhabe aufweisen und gehäuft stationär, insbesondere unfreiwillig, aufgenommen werden. Die Versorgung im Projekt PsyKom wird durch ein multiprofessionelles Team von Komplexbetreuenden (KoBs) koordiniert. Sie setzt vorrangig am Übergang zwischen stationärer und ambulanter Behandlung an und ermöglicht individuell abgestimmte, bedarfsorientierte sektor- und leistungsträgerübergreifende koordinative Leistungen. Das Projekt wurde in Kooperation mit der LVR-Klinik Köln durchgeführt und im Jahr 2020 erfolgreich abgeschlossen. Es zeigte sich, dass etwa zwei Drittel der Gruppe der schwer psychisch erkrankten Patient*innen von dem psychosozialen Komplexmodell profitierten und im Verlauf weniger stationäre Behandlungstage aufwiesen. Einige therapeutische Erfolge waren sehr beeindruckend und selbst dann erzielbar, wenn zuvor lange Phasen sehr ungünstiger Verläufe mit Chronifizierung von Krankheitssymptomen und erheblichen psychosozialen Einschränkungen vorlagen.

Nachdem der Abschlussbericht im Herbst 2020 fristgerecht dem Projektförderer zugesendet worden war, wurde ab Ende 2020 an der ersten wissenschaftlichen Fachpublikation gearbeitet. Im November 2021 wurde das Manuskript in der Fachzeitschrift *Psychiatrische Praxis* zur Veröffentlichung angenommen und zwischenzeitlich wurde es veröffentlicht (*Reinhardt et. al 2022*). Eine weitere Publikation ist in Vorbereitung und wird voraussichtlich im ersten Halbjahr 2022 eingereicht.

3.3 I-REACH: Internet-based Refugee Mental Healthcare

Förderung: BMBF; Förderdauer: April 2019 – Januar 2024

I-REACH ist ein durch das Bundesministerium für Forschung und Bildung (BMBF) gefördertes Konsortium unter der Leitung von Frau Professor C. Knaevelsrud (FU Berlin). Ziel des Konsortiums mit fünf Teilprojekten ist die Förderung und Evaluierung internetbasierter diagnostischer und therapeutischer bzw. therapieunterstützender Ansätze für Geflüchtete mit psychischen Störungen (https://www.mentalhealth4refugees.de/de/i-reach). Anlässlich des Weltgesundheitstages am 7. April 2021 hat das BMBF die Webseite zum Projekt aufgegriffen und darüber berichtet (https://www.gesundheitsforschung-bmbf.de/de/forschung-fur-gefluchtete-menschen-mit-psychischen-belastungen-13136.php). Mit der Internetseite informiert das BMBF die Öffentlichkeit über neue Ergebnisse der vom BMBF geförderten Gesundheitsforschung, aktuelle förderpolitische Gegebenheiten oder geplante Veranstaltungen. Die Klickzahl lag im vergangenen Jahr bei rund 2,5 Millionen. Das LVR-IVF ist im Teilprojekt 2 (TP2) zur Entwicklung der Online-Intervention beteiligt und zusätzlich leitet es das TP4, bei dem eine Online-Intervention als App zur Unterstützung der Arzt-Patient Kommunikation in der stationären psychiatrisch-psychotherapeutischen Versorgung in den LVR-Kliniken implementiert wird.

In den Jahren 2019 und 2020 war das LVR-IVF im Rahmen der Entwicklung der App (TP2) mit einem kleinen Stellenanteil unterstützend tätig gewesen. Parallel war die Implementierungsstrategie entwickelt und Voruntersuchungen zur Vorbereitung des TP4 gemeinsam mit den teilnehmenden LVR-Kliniken durchgeführt worden. Im Rahmen der CoVid-Pandemie kam es bereits im Jahr 2020 zu erheblichen Verzögerungen bei der Entwicklung der App. Das LVR-IVF reagierte auf diese Verzögerung

und antizipierte verkürzte Rekrutierungszeit im nachgelagerten TP4, indem drei weitere LVR-Kliniken für die Teilnahme an der Studie gewonnen wurden. Letztlich konnten acht LVR-Kliniken zur Teilnahme am Projekt gewonnen werden.

Im Berichtsjahr 2021 wurde die Zusammenarbeit mit dem TP2 intensiviert. Hier stand der Prozess der Anpassung der App an die Bedingungen der stationären klinischen Versorgung im *blended care* Ansatz im Vordergrund. Bei diesem umfangreichen Prozess gab es im Berichtsjahr weitere pandemiebedingte Verzögerungen im TP2, so dass die App erst Anfang 2022 fertiggestellt werden konnte. Für das TP4 erhielt das LVR-IVF im Juli 2021 das positive Ethikvotum der Ärztekammer Nordrhein. Es wurden umfangreiche Schulungsmaterialien für die an der Studie teilnehmenden LVR-Kliniken vorbereitet und Fragebögen zur Erfassung der primären und sekundären Outcomes erstellt. Gegen Ende des Berichtsjahrs wurde die konkrete Planung von Kick-off Veranstaltungen und Schulungen in den Kliniken aufgenommen. Der Studienstart mit Rekrutierung der ersten Patient*innen in den Kliniken wird erst im 2. Quartal 2022 erfolgen. Etwa zeitgleich ist ein Gespräch seitens der Konsortialführung mit dem Projektträger DLR geplant, um die Perspektive bzw. Chancen für eine Verlängerung des Gesamtprojekts auszuloten.

Im Jahr 2021 konnte unter Mitarbeit des LVR-IVF eine erste wissenschaftliche Fachpublikation veröffentlicht werden, die den Prozess der kultursensiblen Adaptation des Psychotherapieprogramms CETA (A common elements treatment approach for adult mental health problems in low- and middle income countries, *Murray et al 2014*) für den Einsatz bei Geflüchteten aus Arabisch und Farsi sprechenden Ländern beschreibt (*Böttche et al 2021*).

Des Weiteren hat am 30. September und 1. Oktober 2021 das Jahrestreffen der BMBF-Forschungsverbünde zur psychischen Gesundheit geflüchteter Menschen in Hamburg als hybride Veranstaltung stattgefunden. Das LVR-IVF war hierbei für das I-REACH TP4 vertreten. https://www.gesundheitsforschung-bmbf.de/de/forschung-fur-gefluchtete-menschen-mit-psychischen-belastungen-13136.php. Zudem wurde das TP4 im Rahmen des internationalen digitalen Symposiums des eMEN-Projekts am 14. Oktober 2021 als Beispiel für eine klinische Anwendung einer App im stationären psychiatrisch-psychotherapeutischen Bereich vorgestellt (siehe Anhang 1).

3.5 SoKo: Die Somatische Versorgung von Patient*innen mit psychischer Komorbidität

Förderung: Innovationsfonds beim Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA)
Förderdauer: Juli 2020 – Juni 2024

Ziel des Projektes SoKo ist die Analyse der somatischen Versorgung bei Menschen mit psychischen Störungen. Dabei werden in insgesamt fünf Arbeitspaketen Routinedaten einer Krankenkasse analysiert sowie die Perspektiven der Betroffenen und der Behandelnden berücksichtigt. Das LVR-IVF hat die Konsortialführung und kooperiert mit den Konsortialpartnern LVR-Klinikum Düsseldorf und der Landesvertretung NRW der Techniker Krankenkasse (TK-NRW). Zunächst sollen die Routinedaten der Versicherten mit der Diagnose bestimmter häufiger somatischer Erkrankungen und mit bzw. ohne psychische Komorbidität analysiert werden. Durch zusätzliche Erhebungen und Analysen der Befragungen von Patient*innen mit einer somatischen Diagnose und psychischer Komorbidität sowie Versorgenden (Haus- und Fachärzt*innen) im Mixed-Methods-Design (qualitative und quantitative Methoden) sollen Förderfaktoren und Barrieren in der somatischen Versorgung von Menschen mit psychischer Komorbidität identifiziert werden.

Zum Jahresbeginn 2021 wurde ein Antrag bei der Ethikkommission der Ärztekammer Nordrhein gestellt, der mit einem positiven Votum beschieden wurde. Im 2. Halbjahr 2021 erfolgten umfangreiche Arbeiten zur Plausibilisierung der seitens der TK-NRW bereitgestellten Routinedaten. In enger Zusammenarbeit mit den zuständigen Mitarbeitenden auf Seiten der Konsortialpartners TK-NRW wurden Probleme identifiziert und weitere Datenabzüge vorbereitet. Die endgültige Bereitstellung und Analyse der Routinedaten wird somit erst im Jahr 2022 erfolgen.

Parallel dazu begannen die qualitativen interviewbasierten Untersuchungen mit Betroffenen und Professionellen. Auf Basis der Erkenntnisse aus diesen qualitativen Projektteilen sollen die Fragebögen für die quantitativen Erhebungen entwickelt werden. Diese Fragebögen sollen ab 2022 sowohl bei einer Online-Befragung von Betroffenen als auch bei einer postalischen Befragung von Haus- und Fachärzt*innen eingesetzt werden. Die Rekrutierung von Betroffenen für die Interviews ist bislang erfolgreich, während die Rekrutierung von Ärzt*innen sich erheblich schwieriger gestaltet. Entsprechend wurden und werden weiterhin Aktivitäten entwickelt, um zusätzliche Rekrutierungswege zu erschließen. Die primäre Rekrutierungsmaßnahme bestand aus der postalischen Einladung der Zielgruppe. So wurden insgesamt 1000 Hausärzt*innen, Internist*innen, Fachärzt*innen für Psychiatrie, Neurologie, Psychosomatik und psychotherapeutisch tätige Ärzt*innen mit Anschreiben und Flyer kontaktiert. Darüber hinaus wurde auf dem DGPPN Kongress im November 2021 Werbung für die Fokusgruppen gemacht; u. A. wurden Ärzt*innen persönlich angesprochen und über die Fokusgruppen informiert. Auch über den DGPPN-Kongress hinaus wurden gut vernetzte Hausärzt*innen sowie ein Weiterbildungsverbund kontaktiert und um Mithilfe gebeten.

3.6 WohnLos: Wohnungslosigkeit bei psychischer Erkrankung: Risikofaktoren, Auswirkungen, Interventionen: Eine Bestandsaufnahme in Nordrhein-Westfalen

Förderung: Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW
Förderdauer: Oktober 2019 – September 2021; Verlängerung bis Dezember 2021

Das Projekt WohnLos umfasste eine klinisch-epidemiologische Bestandsaufnahme zum Problemfeld Wohnungslosigkeit bei Patient*innen mit psychischen Störungen in NRW. Das Projekt wurde unter Federführung des LVR- Instituts für Versorgungsforschung (LVR-IVF) in Kooperation mit dem LWL-Forschungsinstitut für Seelische Gesundheit (LWL-FiSG) (Prof. Dr. Georg Juckel, Bochum) durchgeführt. Das Ausmaß des Problems der Wohnungslosigkeit und des Lebens in prekären Wohnverhältnissen sollte bei psychisch erkrankten Menschen mit dem Schwerpunkt auf stationär behandelte Patient*innen erhoben werden. Zusätzlich sollten Risikoprofile bzw. die assoziierten klinischen und soziodemographischen Kontextfaktoren erfasst werden. Das Projekt umfasste fünf Arbeitspakete, in denen retrospektive Auswertungen von Routinedaten der LVR- und LWL-Kliniken sowie prospektive Erhebungen durch standardisierte schriftliche Befragungen des Personals in LVR- und LWL-Kliniken, in weiteren psychiatrischen Kliniken in NRW und in Einrichtungen der Sozialen Rehabilitation in NRW umgesetzt wurden.

Aufgrund der pandemiebedingten Veränderungen der stationären Versorgung kam es zu Verzögerungen im Projektablauf und Verschiebungen aller geplanten Stichtagserhebungen. Aufgrund der Verzögerungen konnte eine Verlängerung des Projekts um drei Monate vereinbart werden. Im Berichtszeitraum konnte das Projekt letztlich mit ausreichend repräsentativen Ergebnissen abgeschlossen werden, wenngleich die Beteiligung der Einrichtungen und die Rückläufe geringer bzw. weniger vollständig waren im Vergleich zu den Rückläufen, die ohne die pandemiebedingten Probleme zu erwarten gewesen wären.

In den aufwändigen Stichtagserhebungen der Studie wurden hohe Prävalenzen von Wohnungslosigkeit (durchschnittlich ca. 7,5%) und prekären Wohnverhältnissen (durchschnittlich ca. 8%) bei den stationär behandelten Patient*innen in den teilnehmenden Kliniken des LVR- und LWL-Klinikverbunds ermittelt. Im Vergleich dazu führte die retrospektive Auswertung der Routinedaten zu einer deutlichen Unterschätzung der Problematik (Prävalenz von Wohnungslosigkeit durchschnittlich ca. 2,5%; prekäre Wohnverhältnisse nicht erfasst). Mit beiden methodischen Ansätzen (retrospektive Erhebung vorliegender Routinedaten und prospektive Stichtagserhebungen) zeigte sich eine erhebliche Varianz bei den Prävalenzen, die in Kliniken in städtischen Gebieten sowie im Rheinland höher waren (Wohnungslosigkeit bis zu 17%, prekäre Wohnverhältnissen bis zu 19%).

Innerhalb des LVR wurden das Projekt und erste Zwischenergebnisse am 17. Februar 2021 im Fachforum der Abteilungen für Soziale Rehabilitation der LVR-Kliniken sowie in den Fachforen der Ärztlichen Direktionen am 16. März, 15. Juni und 12. November 2021 vorgestellt. Einer breiteren Fachöffentlichkeit wurden die (Zwischen-)Ergebnisse am 21. September 2021 beim Fortbildungstag des LVR-IVF sowie am 26. November 2021 beim DGPPN Kongress präsentiert. Der ausführliche Abschlussbericht wird bis zum Ende des ersten Quartals 2022 erstellt und beim Förderer eingereicht. Im Berichtszeitraum wurde ein englischsprachiges Manuskript zu den Ergebnissen der Routinedatenanalyse erstellt und bei einer Fachzeitschrift eingereicht. Im Januar 2022 wurde dieses erste Manuskript zur Veröffentlichung angenommen *(Haussleiter, Lehmann et al 2022).* Ein zweites englischsprachiges Manuskript zur Problematik der Wohnungslosigkeit im Vorfeld des Einzugs von Betroffenen in Einrichtungen der Sozialen Rehabilitation wurde ebenfalls bereits eingereicht *(Überberg, Heinz et al, eingereicht)* und ein drittes Manuskript ist in Vorbereitung.

3.7 Auswertung der Routinedaten der BAG-Psychiatrie (Bundesarbeitsgemeinschaft der Träger psychiatrischer Krankenhäuser)

In der Nachfolge der LVR-Verbundzentrale wurde LVR-IVF ab dem Jahr 2016 mit einer Neukonzeption und der Durchführung der jährlichen Analysen der §21-Daten der psychiatrischen Kliniken in Trägerschaft der BAG-Mitglieder beauftragt. Die Arbeiten werden durch die BAG-Psychiatrie finanziell unterstützt. Für das Datenjahr im Jahr 2020 wurden die Daten von 177 Kliniken ausgewertet (BAG-Bericht 2021).

Darüber hinaus verfolgt das LVR-IVF perspektivisch das Ziel, die auf Bundesebene aggregierten Daten in Absprache mit der BAG für wissenschaftliche Analysen zu nutzen. Zunächst wurden deskriptive und explorative Analysen zu den Wiederaufnahmen anhand der Daten der Jahre 2018 und 2019 durchgeführt. Für das Jahr 2022 sind Gespräche des LVR-IVF mit der BAG zur Weiterentwicklung des Berichtsformats sowie zur wissenschaftlichen Nutzung der Analysen geplant.

4 Drittmittelanträge

Im Februar 2021 wurden zwei Anträge beim Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesausschuss` (G-BA) eingereicht:

1) Der erste Antrag gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde e. V. (DGPPN) und der DG-Sucht (Deutsche Gesellschaft für Suchtforschung und Suchttherapie e. V.) betrifft die Entwicklung einer **S3-Leitlinie für Psychosen mit komorbider substanzbezogener Störung** (Akronym: **LL-KoPsS**). Es handelt sich um eine Leitlinie nach den Standards und unter Beteiligung der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF). Der Antrag wurde zur Förderung angenommen und das LVR-IVF wird hier die Konsortialführung innehaben. Zielgruppen sind alle Akteur*innen, die an der medizinischen und psychosozialen Behandlung und Rehabilitation der Patient*innenzielgruppe beteiligt sind, sowie Betroffene und deren Angehörige. Als Projektbeginn ist Mai 2022 vorgesehen. Zum jetzigen Zeitpunkt laufen bereits vorbereitende Arbeiten und Abstimmungen mit den Konsortial- und Kooperationspartnern.

2) Der zweite Antrag wurde in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Palliativmedizin und der PMV Forschungsgruppe der Universitätsklinik Köln erarbeitet. Es ging um die Analyse von Versorgungsverläufen **(Patient Journeys)** von Menschen mit einer fortgeschrittenen lebenslimitierenden somatischen Erkrankung (LLE) und einer vorbestehenden, schweren und anhaltenden psychischen Störung (SMI) (Akronym: **SMI-LLE**). Der Antrag wurde nicht zur Förderung angenommen. Alle Antragsbeteiligten sind jedoch übereingekommen, dieses Thema weiter zu bearbeiten. Daher ist für das Jahr 2022 eine etwas modifizierte Antragstellung bei anderen Fördermittelgebern vorgesehen.

5 Fachtagungen/Fortbildungsveranstaltungen

Für die **LVR-Fokustagung 2021** stellte das LVR-IVF das wissenschaftliche Programm zusammen und beteiligte sich an den organisatorischen Vorbereitungen. Die LVR-Fokustagung fand am 17. März 2021 pandemiebedingt online zum Thema *Update Altersdemenzen – Prävention, Diagnostik und Therapie* statt.

Auch für die **LVR-Fokustagung 2022** stellte das LVR-IVF das wissenschaftliche Programm zusammen und beteiligte sich an den organisatorischen Vorbereitungen. Die Veranstaltung ist für den 30. März 2022 zum Thema *Update Essstörungen – Prävention, Diagnostik und Therapie* geplant. Renommierte Expert*innen aus dem ganzen Bundesgebiet und aus den Bereichen der Kinder- und Jugendpsychiatrie und der Psychosomatischen Medizin haben als Referent*innen zugesagt. Aufgrund der COVID-19-Pandemie wird die LVR-Fokustagung auch im Jahr 2022 digital stattfinden.

Der **jährliche Fortbildungstag** fand am 21. September 2021 als Online-Veranstaltung statt. Bei der Veranstaltung wurden die LVR-IVF-Tätigkeitsberichte der Jahre 2019 und 2020 vorgestellt sowie zwei Diskussionsforen durchgeführt, unter anderem zum Thema „Partizipative Forschung“. Des Weiteren wurden in Fachvorträgen die Forschungsprojekte des LVR-IVF vorgestellt.

Schließlich wurde im Rahmen des eMEN-Projekts ein **internationales wissenschaftliches Symposium** zum Thema *E-Mental-Health-Implementierung – von der Theorie in den psychiatrisch-psychotherapeutischen Versorgungsalltag* organisiert. Das Symposium wurde am 14.10.2021 online mit Simultanübersetzungen abgehalten (s. Abschnitt 3.1).

Die Programme der Veranstaltungen finden sich im Anhang 1.

6 Studentische Lehre/Seminare/Promotionen

Das ursprüngliche **Seminar Versorgungsforschung** wurde im Jahr 2021 organisatorisch modifiziert. Seit Sommer wird die Veranstaltung im Format eines **Breakfast Club** als Fortbildung für die Wissenschaftlichen Mitarbeitenden des LVR-IVF und für interessierte Studierende und Doktorand*innen angeboten. Der einstündige Breakfast Club wird Freitags in lockerer Abfolge (durchschnittlich zwei Mal monatlich) abgehalten. Neben der Besprechung aktueller Forschungsergebnisse und methodischer Fragen bei Institutsprojekten waren bisherige Themenschwerpunkte statistische Methoden sowie Grundfragen der Versorgung psychisch Erkrankter (*Primer for Beginners* für neue Mitarbeitende). Die Veranstaltungsreihe *Primer for Beginners* umfasst ca. zehn Termine und soll curricular einmal jährlich angeboten werden.

In der nachfolgenden Tabelle 1 sind die Lehr- und Seminarveranstaltungen aufgelistet, die im Berichtsjahr stattfanden.

Tabelle 1. Lehr- und Seminarveranstaltungen im Berichtsjahr 2021

Datum	Thema	Referent*in
29. Jan 2021	Statistik: Schiefe Verteilungen	J. Zielasek
26. Feb 2021	Besprechung aktueller Projekte: SoKo: Selektionskriterien für die Interviews	H. Büscher, I. Klee, I. Schellartz
5. März 2021	Besprechung aktueller Projekte: Behandlungsvereinbarungen	J. Vrinssen
12. März 2021	Besprechung aktueller Projekte: Analysen der Versorgung im LVR-Klinikverbund in der Covid-Pandemie	J. Zielasek
26. März 2021	Analyse des Nutzens und der Praktikabilität des Qualitätsindikators (QI) zur Erfassung der Patient*innenzufriedenheit im Rahmen der Qualitätssicherung im LVR-Klinikverbund.	M. Neise
23. April 2021	Gender-gerechte Sprache in der Wissenschaft	J. Zielasek
21. Mai 2021	Statistik: Hazard Ratio	J. Zielasek
28. Mai 2021	Forschungsdatenbank und Pivot-Tabellen	O. Karasch
11. Juni 2021	Statistik: Bayes-Statistik	J. Zielasek
25. Juni 2021	Promotionsprojekt: Die Patient*innenperspektive bei der Inanspruchnahme der Peritonealdialyse	I. Schellartz
2. Juli 2021	Blended Care-Interventionen in der stationären psychiatrisch-psychotherapeutischen Versorgung	L. Schmidt
9. Juli 2021	Besprechung aktueller Projekte: Analysen der Situation von Patient*innen mit Intelligenzminderung im Maßregelvollzug	J. Vrinssen
16. Juli 2021	Primer for Beginners Part I : LVR	J. Zielasek
3. Sep 2021	Primer for Beginners Part II: Psychiatrie als medizinisches Fachgebiet	J. Zielasek
10. Sep2021	Journal Club: Psychische Erkrankungen und Wohnungslosigkeit	J. Heinz

24. Sep 2021	Journal Club: Ergebnisqualität bei alkohol- und substanzbezogenen Störungen	I. Lehmann
15. Okt 2021	Primer for Beginners Part III: Psychiatrische Versorgung I	J. Zielasek
22. Okt 2021	Statistik: Vorstellung Knime	J. Vrinssen
5. Nov 2021	Primer for Beginners Part IV: Psychiatrische Versorgung II	J. Zielasek
12. Nov2021	KEZ – Kölner Erhebungsbogen Kölner Fragebogen zu Einstellungen zu Zwangsmaßnahmen	I. Baar, M. Schmitz-Buhl
3. Dez 2021	Koordinierte und strukturierte Versorgung für schwer psychisch erkrankte Patienten (neue KSVPsych-Richtlinie): Auswirkungen auf die psychiatrische Versorgungsforschung	T. Blumenröder
10. Dez 2021	Thema 1: Verständlich wissenschaftlich schreiben Thema 2: Moderation von Arbeitsgruppentreffen	I. Klee
17. Dez 2021	Triangulation in der Versorgungsforschung	I. Schellartz

Im Rahmen der **Vorlesungsreihe Interdisziplinäre Entscheidungen** der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf wird die Vorlesung *Einführung in die Rehabilitation – Das Beispiel Schizophrenie* durch das LVR-IVF gestaltet. An der Universitätsklinik Köln wird innerhalb der **Hauptvorlesung Psychiatrie** das Thema *Ethische und Rechtliche Aspekte im psychiatrischen Alltag* durch das LVR-IVF gestaltet.

Im Berichtszeitraum wurden mehrere medizinische **Promotionen** an der Universität zu Köln und an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf betreut. Bei den Promovierenden handelt es sich um Studierende und Mitarbeitende aus den LVR-Kliniken Köln und Langenfeld. Die Promotionsthemen umfassen die Bereiche der COVID-Analysen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, Polypharmazie, Patientenautonomie, Risikofaktoren für und Haltung zu freiheitsentziehenden Maßnahmen, und psychische Gesundheit von Geflüchteten.

Bis Januar 2021 wurde ein **Trainee** im Projekt LVR-QI eingesetzt. Ziel des Trainee-Projektes war es, Hinweise für mögliche Maßnahmen zur Erhöhung der Rücklaufquote bei der Erhebung der *Behandlungszufriedenheit* der Patient*innen zu generieren. Dies erfolgte mittels Literaturrecherche sowie Einzelinterviews mit Professionellen aus den LVR-Kliniken, die qualitativ ausgewertet wurden.

7 Vorträge

Das LVR-IVF berichtet regelmäßig in Fachvorträgen über Themen der Versorgungsforschung. Wie im ersten Pandemiejahr fielen auch im Berichtsjahr 2021 einige Veranstaltungen und Kongresse aufgrund der COVID-19-Pandemie aus oder sie wurden im Online-Format durchgeführt.

Die wissenschaftlichen Vorträge und Poster aus dem Berichtsjahr 2021 sind in der nachfolgenden Tabelle 2 aufgeführt.

Tabelle 2. Wissenschaftliche Vorträge und Poster im Berichtsjahr 2021

Datum	Veranstaltung	Vortrags-/Postertitel (Referent*in)
20. Jan 2021	Quality of Cancer Care (online)	Rehabilitation bei Brustkrebspatientinnen mit psychischer Erkrankung und/oder geistiger Behinderung. Ergebnisse der CANDY-Studie (H. Gröber)
27. Mai 2021	Projektgruppentreffen „Einsatz von Genesungsbegleitenden im LVR-Klinikverbund“	Vorstellung der Auswertungen zur Erhebung des Tätigkeitsprofils der Genesungsbegleiter*innen (O. Karasch)
21. Sep 2021	LVR-IVF-Fortbildungstag 2021 (online)	Projekt PsyKom – Implementierung und Evaluation eines innovativen Komplexversorgungsmodells für schwer psychisch Erkrankte (I. Reinhardt und J. Heinz)
21. Sep 2021	LVR-IVF-Fortbildungstag 2021 (online)	Wohnungslosigkeit und psychische Erkrankung – Bericht zum Projekt WohnLos (J. Zielasek in Vertretung)
21. Sep 2021	LVR-IVF-Fortbildungstag 2021 (online)	Auswirkungen der COVID Pandemie auf die stationäre Versorgung psychisch Erkrankter – Erkenntnisse aus der Analyse von Routinedaten des LVR-Klinikverbundes (J. Zielasek)
21. Sep 2021	LVR-IVF-Fortbildungstag 2021 (online)	Die somatische Versorgung psychisch Erkrankter: Relevante Erkenntnisse und Fragen aus den Projekten CANDY und SoKo (H. Büscher und I. Schellartz)
7. Okt 2021	Seminar der LVR-Klinik Viersen	Bericht über die LVR-Qualitätsindikatoren 2020 (J. Zielasek)
12. Okt 2021	Seminar der LVR-Klinik Mönchengladbach	Bericht über die LVR-Qualitätsindikatoren 2020 (J. Zielasek)
12. Okt 2021	Seminar der LVR-Klinik Düren	Bericht über die LVR-Qualitätsindikatoren 2020 (E. Gouzoulis-Mayfrank)
14. Okt 2021	eMEN-Symposium (online)	I-REACH: Entwicklung einer muttersprachlichen App für die stationäre psychiatrisch-psychotherapeutische Versorgung von Menschen mit Fluchterfahrung (D. Reske und L. Schmidt)
2. Nov 2021	Seminar der LVR-Klinik Bedburg-Hau (online)	Bericht über die LVR-Qualitätsindikatoren 2020 (E. Gouzoulis-Mayfrank)
24.-27. Nov 2021	DGPPN-Kongress 2021 – Berlin	Behandlungsvereinbarungen – Welche Betroffene schließen sie ab? (A. Weide)

24.-27. Nov 2021	DGPPN-Kongress 2021 – Berlin	Qualitätsindikatoren in der stationären psychiatrischen Versorgung – Implementierung und Auswertung mit Routinedaten (I. Lehmann und J. Zielasek)
24.-27. Nov 2021	DGPPN-Kongress 2021 – Berlin	Implementierung und Begleitevaluation einer sektorübergreifenden psychosozialen Komplexbetreuung bei Menschen mit schwerer psychischer Erkrankung an einem psychiatrischen Fachkrankenhaus (Projekt PsyKom) (I. Reinhardt und E. Gouzoulis-Mayfrank)
24.-27. Nov 2021	DGPPN-Kongress 2021 – Berlin	Die somatische Versorgung von Patient*innen mit psychischer Komorbidität (SoKo) – Studienprotokoll (I. Klee)
24.-27. Nov 2021	DGPPN-Kongress 2021 – Berlin	Wohnungslosigkeit – Häufigkeit, Risikoprofile und Versorgungspfade bei psychisch erkrankten Menschen (Symposium, Chair: E. Gouzoulis-Mayfrank)
24.-27. Nov 2021	DGPPN-Kongress 2021 – Berlin	Versorgungspfade bei psychisch erkrankten wohnungslosen Menschen und Menschen in prekären Wohnverhältnissen – Ergebnisse der WohnLos-Studie (J. Heinz)
3. Dez 2021	Seminar der LVR-Klinik Bonn	Bericht über die LVR-Qualitätsindikatoren 2020 (J. Zielasek)
15. Dez 2021	Seminar der LVR-Klinik Düsseldorf	Bericht über die LVR-Qualitätsindikatoren 2020 (J. Zielasek)

8 Wissenschaftliche Publikationen

Im Folgenden sind die wissenschaftlichen Publikationen aufgeführt, die im Jahr 2021 veröffentlicht oder zur Veröffentlichung angenommen wurden. Des Weiteren sind auch Publikationen aufgeführt, die im Berichtsjahr eingereicht wurden und bis zur Erstellung des vorliegenden Berichts (31.03.2022) zur Publikation angenommen wurden. (Ko)Autor*innen, die Mitarbeiter*innen des LVR-IVF sind, wurden durch **Fettdruck** hervorgehoben.

Die Publikationen finden sich im Anhang 2.

8.1 Originalarbeiten

Baar I, Schmitz-Buhl M, **Gouzoulis-Mayfrank E**: Der KEZ – Kölner Fragebogen zu Einstellungen zu Zwangsmaßnahmen. Psychiat Prax 2021. doi: 10.1055/a-1515-2268

Böttche M, Kampisiou C, Stammel N, El-Haj-Mohamad R, Heeke C, Burchert S, Heim E, Wagner B, Renneberg B, Böttcher J, Glaesmer H, **Gouzoulis-Mayfrank E, Zielasek J**, Konnopka A, Murray L, Knaevelsrud C: From Formative Research to Cultural Adaptation of a Face-to-Face and Internet-Based Cognitive-Behavioural Intervention for Arabic-Speaking Refugees in Germany. Clinical Psychology in Europe, 2021, Vol. 3 (Special Issue), Article e4623, https://doi.org/10.32872/cpe.4623.

Gaebel W, Lehmann I, Chisholm D, Hinkov H, Höschl C, Kapócs G, Kurimay T, Tosevski DL, Milosavljevic M, Nakov V, Winkler P, **Zielasek J**: Quality indicators for mental healthcare in the Danube region: results from a pilot feasibility study. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2021;271(6):1017-1025. doi: 10.1007/s00406-020-01124-z. Epub 2020 Apr 8.

Gaebel W, Lukies R, Kerst A, Stricker J, **Zielasek J, Diekmann S, Trost N, Gouzoulis-Mayfrank E,** Bonroy B, Cullen K, Desie K, Ewalds Mulliez AP, Gerlinger G, Günther K, Hiemstra HJ, McDaid S, Murphy C, Sander J, Sebbane D, Roelandt JL, Thorpe L, Topolska D, Van Assche E, Van Daele T, Van den Broeck L, Versluis C, Vlijter O: Upscaling e-mental health in Europe: a six-country qualitative analysis and policy recommendations from the eMEN project. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2021;271(6):1005-1016. doi: 10.1007/s00406-020-01133-y. Epub 2020 May 11.

Groß SE, Zielasek J, Kitzig F, Schröder M, Jahnke B, **Gouzoulis-Mayfrank E:** Selbst- und Fremdwahrnehmung von Genesungsbegleitenden im klinisch-psychiatrischen Alltag. Psychiatr Prax 2021;48(1):44-48. doi: 10.1055/a-1181-4353. Epub 2020 Jul 20.

Haussleiter IS, L**ehmann I**, Ueberberg B, **Heinz J**, **Zielasek J**, **Gouzoulis-Mayfrank E**, Juckel G: Homelessness among psychiatric inpatients in North Rhine-Westphalia: a retrospective routine data analysis. BMC Psychiatry 2022; 22, 132. https://doi.org/10.1186/s12888-022-03786-6

Reinhardt I, Heinz J, Zielasek J, Engemann S, Gouzoulis-Mayfrank E: Psychosoziale Komplexbetreuung bei schwerer psychischer Erkrankung: Implementierung und Begleitevaluation eines sektorübergreifenden Versorgungsmodells an einem psychiatrischen Fachkrankenhaus. Psychiatr Prax 2022. doi:10.1055/a-1706-0217. Epub 2022 Jan 26.

Sander J, Bolinski F, **Diekmann S, Gaebel W,** Günther K, Hauth I, Heinz A, Kleiboer A, Riper H, **Trost N,** Vlijter O, **Zielasek J**, Gerlinger G: Online therapy: an added value for inpatient routine care? Perspectives from mental health care professionals. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2021; 16:1-12. doi: 10.1007/s00406-021-01251-1.

Schmidt-Kraepelin C, Meisenzahl-Lechner E, Kujovic M, Cordes J, Engelke C, Riesbeck M, **Zielasek J, Engemann S, Vrinssen J, Lehmann I**, Tönnesen-Schlack A, Banger M, Grümmer M, Scherbaum N,

Muysers J, Rinckens S, Marggraf R, **Gouzoulis-Mayfrank E**: Antipsychotische Polypharmazie in der Behandlung von Patientinnen und Patienten mit Schizophrenie am Beispiel von neun psychiatrischen Fachkliniken des Landschaftsverbandes Rheinland. Psychiatr Prax 2021; 48(5):250-257. doi: 10.1055/a-1321-7866.

Zielasek J, Vrinssen J, Gouzoulis-Mayfrank E: Utilization of Inpatient Mental Health Care in the Rhineland During the COVID-19 Pandemic. Front Public Health 2021; 30;9:593307. doi: 10.3389/fpubh.2021.593307. Epub 2021 April 30.

8.2 Übersichtsarbeiten

Stricker J, **Lukies R**: Digitale Verfahren zur Behandlung psychischer Störungen in der COVID-19-Pandemie. Fortschr Neurol Psychiatr 2021; 89(06): 308-313. doi: 10.1055/a-1486-7019

8.3 Weitere Publikationen (Redaktionelle Beiträge, Diskussionspapiere, Kurzberichte und Editorials)

Gouzoulis-Mayfrank E: Ehegattenvertretung bei Selbstbestimmungsunfähigkeit eines Partners - Kontra. Psychiatr Praxis 2021; 48(04): 175-176. doi: 10.1055/a-1363-7353

Von Peter S, Schwarz J, Baumeister H, Dahling V, Gühne U, **Gouzoulis-Mayfrank E**, Härter M, Haun M, Jacke C, Neumann A, Salize H-J, Timm S, Wiegand-Grefe S, Riedel-Heller S, Heinze M: DNVF-Diskussionspapier – Besonderheiten, Herausforderungen und Ziele der Versorgungsforschung im Feld der seelischen Gesundheit. Das Gesundheitswesen 2021; 83:341-352. doi: 10.1055/a-1478-3580

9 Vernetzung

LVR-IVF ist innerhalb des LVR-Klinikverbunds stark vernetzt und mit seiner Expertise als Partner und Berater in verschiedenen Ausschüssen, Gremien und Arbeitsgruppen wie dem ThinkTank, dem Lenkungsausschuss Qualitätsmanagement, der Strategiekonferenz und dem Arbeitskreis Gewaltprävention vertreten.

Wie bereits mehrfach dargestellt ist das LVR-IVF auch stark mit den einzelnen Kliniken des LVR-Klinikverbunds vernetzt. Einerseits nehmen die LVR-Kliniken an Projekten teil, die seitens des LVR-IVF initiiert werden (z. B. Projekte I-REACH, WohnLos, s. Abschnitt 3), andererseits berät und unterstützt das LVR-IVF die forschungsaktiven und -interessierten Gruppen sowie Mitarbeitenden aus den LVR-Kliniken hinsichtlich eigener Projekte und Evaluationen (s. Abschnitte 2.2 und 2.3). Aufgrund des konstanten Beratungsbedarfs und der Inanspruchnahme wurde die im Vorjahr eingerichtete telefonische Beratungssprechstunde als *Methodensprechstunde* für Mitarbeitende des LVR-Klinikverbundes fortgeführt.

Zum 1. Januar 2021 wurde die seit 2018 geplante Fusion des LVR-IVF mit der Bildungseinrichtung des LVR-Klinikverbunds, der LVR-Akademie für Seelische Gesundheit, zum neuen **LVR-Institut für Forschung und Bildung (LVR-IFuB)** in Form eines Wie-Eigenbetriebs umgesetzt. Im Berichtsjahr 2021 wurden nach und nach die erforderlichen Struktur- und Prozessveränderungen, insbesondere im Bereich der Finanzbuchhaltung, des Controllings und der Personalverwaltung vorgenommen, die entsprechenden Arbeitsabläufe wurden umgesetzt und der neue Vorstand nahm seine Arbeit auf. Der Vorstand besteht aus der kaufmännischen Direktion, die auch den Vorstandsvorsitz innehat (bis 30.06.2021 E.-M. Bergerfurth; seit dem 01.07.2021 S. Thewes; Stellvertretung M. Brehmer), der fachlichen Direktion der Sparte Forschung (Prof. Dr. E. Gouzoulis-Mayfrank; Stellvertretung Prof. Dr. T. Supprian), und der fachlichen Direktion der Sparte Bildung (A. Kuchenbecker; Stellvertretung S. Jünger). Für die Sparte Forschung des LVR-IFuB bzw. für das LVR-IVF im Rahmen des neugebildeten LVR-IFuB wurde ein neuer Beirat konstituiert, der erstmalig am 8. November 2021 tagte und die Tätigkeitsberichte der Jahre 2019 und 2020 beriet. Im Jahr 2021 wurden erste Schritte im Sinne von Beratungen zur künftigen Zusammenarbeit und fachlichen Synergien angestellt. Die konkrete Umsetzung wird eine der Hauptaufgaben für das Jahr 2022 sein.

Außerhalb des LVR bestehen durch die Institutsleitung Professor Gouzoulis-Mayfrank langfristig gewachsene, enge Kontakte zur Universität zu Köln. Seitens des Wissenschaftlichen Koordinators Professor Zielasek und des Stellvertretenden LVR-IVF-Direktors Professor Supprian besteht die Verbindung zur Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, nicht zuletzt im Zuge von Promotionen und Vorlesungstätigkeit. Ferner ist das Institut mit verschiedenen universitären, städtischen und klinischen Einrichtungen in und um Köln vernetzt im Rahmen von gemeinsamen Projekten bzw. Forschungen. Dazu zählen an der Universität zu Köln das Institut für Medizinsoziologie, Versorgungsforschung und Rehabilitationswissenschaft (IMVF). Zudem engagiert sich das LVR-IVF bei CoreNet, einem Kölner interdisziplinären Kompetenznetzwerk aus Forschung und Praxis, das sich für eine bessere Versorgung von Patient*innen in Köln einsetzt. Darüber hinaus sind die Vernetzung und Kooperation mit den sychiatrischen Kliniken in Köln sowie mit dem Gesundheitsamt der Stadt Köln zu nennen. Mit dem *Netzwerk psychische Gesundheit Köln* (NWpG Köln) besteht eine Zusammenarbeit im Rahmen der Evaluation des Behandlungsprojektes Integrierte Versorgung des NWpG (EVA-NETZ; s. Abschnitt 2.2.1).

Mit der Partnerforschungseinrichtung des LWL, dem LWL-Institut für Seelische Gesundheit (LWL-FiSG), findet ein regelmäßiger fachlicher Austausch hinsichtlich gemeinsamer Forschungsschwerpunkte und -vorhaben statt. Die gemeinsame aktuelle Kooperation ist das Forschungsprojekt WohnLos. Zudem ist der LWL-FiSG Kooperationspartner im Forschungsprojekt SoKo.

Seit November 2018 ist die Institutsdirektorin Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN). Es fanden gemeinsame Beratungen mit der DGPPN zu einem Antrag beim Innovationsfonds im Bereich der Leitlinien-entwicklung statt, die in ein konkretes und erfolgreiches Antragsvorhaben mündeten (s. Abschnitt 4).

Über das Konsortialprojekt I-REACH bestehen Arbeitsbeziehungen mit den Instituten für Klinische Psychologie in Berlin, Leipzig und Dresden sowie mit dem Institut für Gesundheitsökonomie und Versorgungsforschung (IGV) am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.

Im Sinne der nationalen Vernetzung ist das LVR-IVF seit 2017 **Mitglied des Deutschen Netzwerks Versorgungsforschung (DNVF)** und beteiligt sich aktiv an der Entwicklung von Stellungnahmen und Positionspapieren. Zudem ist das LVR-IVF Gründungsmitglied der im Herbst 2017 gegründeten Fachgruppe Seelische Gesundheit des DNVF. Im Berichtsjahr beteiligte sich das Institut an der Erstellung eines Diskussionspapiers zu den Besonderheiten, Herausforderungen und Zielen der Versorgungsforschung im Feld der seelischen Gesundheit *(Von Peter et al 2021).* Außerdem beteiligte sich das LVR-IVF an der Erstellung eines DNVF-Memorandums zur Versorgungsforschung im letzten Lebensjahr (https://dnvf.de/gruppen/fg-palliativmedizin.html).

Des Weiteren ist das LVR-IVF seit 2018 **Mitglied des Aktionsbündnisses Teilhabeforschung**, dessen Arbeitskreis Partizipative Forschung sich am Trialog-Forum des LVR-IVF seit 2021 beteiligt. Das LVR-IVF ist regelmäßig bei Treffen des Arbeitskreises vertreten, wodurch sich wertvolle Anregungen für die eigenen Aktivitäten im Bereich der Trialog-Arbeit ergeben.

Mit dem Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (Standort Rostock/Greifswald, Standortsprecher Professor Dr. W. Hoffmann) wurde im Jahr 2020 eine Unterstützung des Projekts CureDem vereinbart. Ziel ist die Entwicklung eines nationalen Netzwerks für Versorgungsforschung im Bereich der dementiellen Erkrankungen. Das LVR-IVF wird bei der Entwicklung von Forschungsfragen und Forschungsstrukturen sowie bei der Durchführung von Fokusgruppen unterstützen. Eine erste Fokusgruppe fand im Herbst 2021 statt und beschäftigte sich mit der Frage, welche Themen einem Netzwerk im Bereich der Versorgungsforschung im Demenzbereich zuzuordnen wären. Des Weiteren fand am 18. November 2021 die hybride Gründungsversammlung des Netzwerks in Bonn statt, bei dem LVR-IVF digital vertreten war. Die Abteilung Gerontopsychiatrie der LVR-Klinik Köln wird bei der Erhebung des Forschungsbedarfs aus der Sicht von Betroffenen unterstützen.

Durch das Projekt eMEN kooperierte das LVR-IVF auf europäischer Ebene mit Projektpartnern in Belgien, Frankreich, Irland und den Niederlanden. Die Kontakte sind auch nach Abschluss des Projektes eMEN aktiv, so dass für das Jahr 2022 eine neue gemeinsame Antragsaktivität in einem europäischen Konsortium für den Bereich *e-Mental Health* angebahnt werden konnte.

Das **Trialog-Forum** des LVR-IVF findet seit 2018 einmal jährlich statt und dient der Vernetzung mit Betroffenen und Angehörigen zu Zwecken der partizipativen Entwicklung und Beratung von gemeinsamen Forschungsvorhaben. Pandemiebedingt fand auch das diesjährige Trialog-Forum als Online-Veranstaltung am 18. November 2021 statt. Es nahmen Mitarbeitende des Instituts, des Dezernats, Betroffene und Vertreter*innen von Angehörigenverbänden teil. Aus dem Trialog-Forum

des Vorjahres hatten sich Themen für die weiteren inhaltlichen Auseinandersetzungen ergeben, die im Berichtsjahr in drei themenspezifischen Arbeitsgruppen im Rahmen von insgesamt acht online-Sitzungen bearbeitet wurden. Fachliche Schwerpunkte waren die Themen *Familiencoaching, angehörigenfreundliche Entlassungsgestaltung* und *Optimierung der Krisenintervention bei Menschen mit geistiger Behinderung und psychischen Erkrankungen*. Die bis dahin vorliegenden Zwischenergebnisse der drei Arbeitsgruppen wurden im Trialog-Forum vorgestellt und diskutiert mit dem Ergebnis, dass die Arbeiten fortgesetzt werden sollen. Die Vernetzung des Trialog-Forums mit weiteren an der Versorgungsforschung Interessierten wurde auch durch eine Beteiligung von Angehörigen und Betroffenen aus dem Trialog-Forum in den Podiumsdiskussionen des IVF-Fortbildungstages 2021 unterstützt (s. Anhang 1, Programm des LVR-IVF-Fortbildungstages 2021).

Schließlich war das LVR-IVF im Berichtsjahr initiativ und aktiv bei der Vorbereitung der Gründung eines **LVR-Ethikkomitee Forschung**. Diese Initiative entstand vor dem Hintergrund von Erfahrungen aus den vergangenen Jahren, bei denen die Problematik einer Lücke in der Zuständigkeit der Ethikkommission der Ärztekammer für bestimmte Projekte der Versorgungsforschung zu Tage trat. Diese Lücke betrifft Forschungsvorhaben, bei denen Nicht-Ärzt*innen wie Psycholog*innen oder Gesundheitswissen-schaftler*innen außerhalb der Universitätskliniken (d. h. im LVR-IVF oder an den LVR-Kliniken, die keine Universitätsklinika sind) die Projektleitung innehaben. Der Träger betraute Vertreter*innen des Dezernats 8 und des LVR-IVF mit der Bedarfsabschätzung und der Konzeptionierung eines solchen Ethikkomitees. Das LVR-IVF berichtete im Juni 2021 in der Verbundkonferenz über die laufenden Arbeiten. Diese Arbeiten konnten zum Jahresende 2021 mit der Vorlage einer Geschäftsordnung und der Auswahl der Mitglieder abgeschlossen werden. Die konstituierende Sitzung des LVR-Ethikkomitees Forschung ist für das erste Halbjahr 2022 vorgesehen. Voraussichtlich ab dem Sommer 2022 werden Antragstellungen möglich sein.

10 Personal

Im Berichtszeitraum kam es zu zeitlich befristeten Neueinstellungen als Elternzeitvertretungen und der Fortsetzung der projektbedingten Beschäftigung von Wissenschaftlichen Mitarbeitenden, außerdem wurden drei studentische Hilfskräfte (zeitweise) neu eingestellt. Im Bereich der Mitarbeitendenförderung wurde die leistungsorientierte Bezahlung für LVR-IVF-Mitarbeitende fortgesetzt, wobei die meisten Mitarbeitenden von dieser Möglichkeit Gebrauch machten. Fortbildungsreisen waren Pandemie-bedingt im Jahr 2021 nicht möglich, stattdessen nahmen Mitarbeitende an virtuellen Fortbildungsveranstaltungen teil. In der Tabelle 3 sind die im Berichtszeitraum aktiven Mitarbeitenden aufgeführt.

Tabelle 3. Personaltableau LVR-IVF im Jahr 2021

Direktorin	Prof. Dr. med. E. Gouzoulis-Mayfrank
Stv. Direktor	Prof. Dr. med. T. Supprian (LVR-Klinikum Düsseldorf)
Wissenschaftl. Mitarbeitende (4,3 VK)	Prof. Dr. med. J. Zielasek (Wissenschaftl. Koordinator) T. Blumenröder S. Engemann Dr. S. E. Groß Dr. I. Lehmann O. Karasch Dr. I. Reinhardt Dr. D. Reske A. Weide
Wiss. Mitarbeitende (Drittmittel) (4,2 VK)	H. Gröber J. Heinz I. Klee R. Lukies L. Schmidt I. Schellartz
Stud. Hilfskräfte (0,04 VK)	J. Tratberger
Stud. Hilfskräfte (Drittmittel) (0,6 VK)	S. Geier S. Weber
Verwaltung (1,5 VK)	J. Hahn S. Iserhardt
Data Management und Analysen	J. Vrinssen (durch Dezernat 8)

11 Finanzen

Das LVR-IVF wird durch eine Umlage des LVR-Klinikverbunds und ergänzend durch eingeworbene Drittmittel finanziert.

In der Tabelle 4 finden sich die eingeworbenen Drittmittel für Projekte, die im Berichtsjahr durchgeführt wurden. Die genannten Summen weisen jeweils den eingeworbenen Anteil des LVR-IVF für die gesamte Laufzeit des jeweiligen Projekts aus.

Tabelle 4. Eingeworbene Drittmittel

Projekt	Förderer	Summe [€]	Laufzeit	Projektende
eMEN	EU Interreg NWE	122.000	1,5 Jahre	31.12.2021
I-REACH	BMBF	444.825	5 Jahre	2024
SoKo	Innovationsfonds	1.027.256	4 Jahre	30.06.2024
WohnLos	MAGS	204.708	2,25 Jahre	31.12.2021
Analyse Routinedaten psychiatrischer Kliniken	BAG	25.000	Jährlich	Laufend

12 Ausblick

Zu Beginn des Ausblicks soll auf die zentrale Veränderung eingegangen werden, die zum 1. Januar 2021 umgesetzt wurde: Das LVR-IVF und die LVR-Akademie sind seit dem 1. Januar 2021 Sparten des neuen LVR-IFuB, welches in der Form eines Wie-Eigenbetriebs gegründet wurde. Der Standort des LVR-IVF ist und bleibt auch künftig in den Räumlichkeiten der LVR-Klinik Köln, während die LVR-Akademie im Jahr 2022 vom Standort Solingen an die LVR-Klinik Langenfeld umziehen wird. Für die kommenden Jahre sollen die beiden Sparten zusammenwachsen und es sollen gemeinsame Formate und Inhalte entwickelt werden. Es gilt künftig Synergien zu erzielen, indem die fachliche und thematische Zusammenarbeit vorangetrieben und verstärkt wird.

Zum Berichtszeitpunkt ist immer noch nicht vollständig absehbar, wie sich die Pandemiefolgen auf einen Teil der laufenden wissenschaftlichen Projekte auswirken werden. Hier ist insbesondere das Projekt I-REACH zu nennen, bei dem die Rekrutierung der Patient*innen in den LVR-Kliniken im Jahr 2022 mit einer mehr als einjährigen Verzögerung beginnen wird. Wir hoffen, dass es gelingen wird, eine Verlängerung der Förderung für das Gesamtprojekt zu erreichen. Beim Projekt WohnLos stehen die Ergebnisse und Schlussfolgerungen aus den Analysen unter dem Vorbehalt, dass die Datenerhebungen in einer „atypischen“ Zeit während einer Pandemie erfolgten.

Das Institut wird auch weiterhin wissenschaftliche Analysen zu pandemiebedingten Veränderungen der psychiatrisch-psychotherapeutischen Versorgung und der Inanspruchnahme von stationären und ambulanten Versorgungsleistungen im LVR-Klinikverbund durchführen. Hierbei kommt dem Institut die im Rahmen des LVR-QI-Projekts bereits in früheren Jahren etablierte LVR-verbundweite Statistikdatenbank zur Analyse von Routinedaten zugute. Diese wird als Querschnittsprojekt des LVR-IVF in Zusammenarbeit mit der Stabstelle IT des Klinikverbunds kontinuierlich aktualisiert und weiterentwickelt. Die Statistikdatenbank ist das zentrale Instrument bei der Erfassung und Weiterentwicklung der Qualitätsindikatoren und sie ist auch die Grundlage für die begonnene Ausweitung der Analysen des Versorgungsgeschehens auf den Bereich des Maßregelvollzugs. Im Jahr 2021 konnte sichergestellt werden, dass im Jahr 2022 Personalmittel für die Stelle eines Data Scientists am LVR-IVF bereitstehen, sodass diese für die Arbeit des LVR-IVF zentrale Funktion personell gesichert wird.

Ein weiteres wichtiges und zugleich neues Arbeitsgebiet für das Institut wird im Jahr 2022 die Entwicklung einer S3-Leitlinie zur Behandlung von Menschen mit Psychose und komorbider substanzbezogener Störung sein. Diese Aufgabe wird in Zusammenarbeit mit der DGPPN (Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde) und der DG-Sucht (Deutsche Gesellschaft für Suchtforschung und Suchttherapie e. V.) ausgeführt. Hier kommt dem Institut als Konsortialführung eine besondere Bedeutung und Verantwortung zu.

Die internen Anfragen von Seiten des LVR-Klinikträgers sowie aus den LVR-Kliniken hinsichtlich Kooperation und Projekten haben kontinuierlich zugenommen und dürften dies auch in den kommenden Jahren weiterhin tun. Diese Entwicklung ist erfreulich und herausfordernd zugleich. Wir danken dem LVR-Klinikverbund mit der Verbundzentrale, den Fachbereichen 82 und 83 sowie den neun psychiatrisch-psychotherapeutischen Fachkliniken für die sehr gute Zusammenarbeit und die Förderung der Entwicklung des LVR-IVF in den vergangenen Jahren. In diesem Sinne blickt das Team des LVR-IVF mit Zuversicht auf die künftigen Aufgaben.

Impressum:

LVR-Institut für Forschung und Bildung
LVR-Institut für Versorgungsforschung

Kontakt:

Prof. Dr. med. E. Gouzoulis-Mayfrank
Fachliche Direktorin Forschung
Wilhelm-Griesinger-Straße 23, 51109 Köln
Tel. 0221-8993 629, Fax 0221 8993-593
E-Mail: euphrosyne.gouzoulis-mayfrank@lvr.de

Köln, 31. März 2022

Anhang 1: Programme der Veranstaltungen

LVR-Institut für Forschung und Bildung

LVR Qualität für Menschen

LVR-Klinikverbund

LVR Qualität für Menschen

LVR-Fokustagung 2021:
Update Altersdemenzen – Prävention, Diagnostik und Therapie

17. März 2021
KoMed, Köln

Vorsitz: Euphrosyne Gouzoulis-Mayfrank
Moderation: Euphrosyne Gouzoulis-Mayfrank, Jürgen Zielasek

Programm

08:30 -09:30	*Begrüßungskaffee*
09:30 -09:45	**Eröffnung der Fokustagung** Wenzel-Jankowski, Gouzoulis-Mayfrank
09:45 – 10:30	**Früherkennung und Prävention der Altersdemenz** (Jessen, Köln)
10:30 – 11:15	**Demenz ist nicht gleich Demenz - Differenzialdiagnostik und medikamentöse Ansätze bei Altersdemenzen** (Supprian, Düsseldorf)
11:15 – 11:45	*Kaffeepause*
11:45 – 12:15	**Psychotherapie bei Altersdemenzen** (Lindner, Kassel)
12:15 – 12:45	**Bewegung bei Altersdemenz** (Häussermann, Köln)
12:45 – 13:15	**Innovative Aspekte der Pflege bei Altersdemenz** (Münster, Lünen)
13:15 – 14:00	*Mittagspause*
14:00 – 14:30	**Zwangseinweisungen bei Altersdemenz: Risikofaktoren und präventive Ansätze** (Gouzoulis-Mayfrank, Köln)
14:30 – 15:00	**Das Demenz-sensible Krankenhaus** (Püllen, Frankfurt a. M.)
15:00 – 15:30	*Kaffeepause*
15:30 – 16:00	**Altersdemenz und Angehörige: Hilfen und Herausforderungen** (Wächter, Köln)
16:00 - 16:30	**Gewaltvermeidung in der Versorgung bei Altersdemenz** (Kapsimali, Düsseldorf)

16:30 - 17:00	**Altersdemenz im Film** (Karenberg, Köln)
17:00 – 17:10	**Schlusswort und Verabschiedung** Wenzel-Jankowski, Gouzoulis-Mayfrank

LVR-Institut für Forschung und Bildung

LVR Qualität für Menschen

LVR-Klinikverbund

LVR Qualität für Menschen

LVR-Institut für Forschung und Bildung

5. Wissenschaftlicher Fortbildungstag des LVR-Instituts für Versorgungsforschung

Dienstag, 21. September 2021, 10:00-15:00 Uhr

Online per Zoom

https://eu01web.zoom.us/j/62485959559?pwd=K2J6bG16WEhwam5kOW9IYVJxYUR1UT09

Meeting-ID: 624 8595 9559
Kenncode: 765200

Schnelleinwahl mobil
+496971049922,,62485959559#,,,,*765200# Deutschland
+496938079883,,62485959559#,,,,*765200# Deutschland

Programm

10:00-10:45	**Begrüßung/Jahresberichte 2019 und 2020 des LVR-Instituts für Versorgungsforschung/Ausblick auf die Gründung des LVR-Instituts für Forschung und Bildung** Prof. Dr. E. Gouzoulis-Mayfrank, Köln
10:45-11:15	**Projekt PsyKom – Implementierung und Evaluation eines innovativen Komplexversorgungsmodells für schwer psychisch Erkrankte** Dr. I. Reinhardt und J. Heinz, Köln
11:15-11:30	*Kaffeepause*
11:30-12:00	**Wohnungslosigkeit und psychische Erkrankung – Bericht zum Projekt WohnLos** Dr. I. Lehmann, Köln
12:00-12:30	**Auswirkungen der COVID Pandemie auf die stationäre Versorgung psychisch Erkrankter – Erkenntnisse aus der Analyse von Routinedaten des LVR-Klinikverbundes** Prof. Dr. J. Zielasek, Köln

12:30-13:15	*Mittagspause*
13:15-13:45	**Die somatische Versorgung psychisch Erkrankter: Relevante Erkenntnisse und Fragen aus den Projekten CANDY und SoKo** H. Büscher und I. Schellartz, Köln
13:45-14:15	**Diskussionsforum: Partizipative Forschung** Diskutant*innen: U. Adam, W. Schubert, C. Wirtz, Prof. Dr. E. Gouzoulis-Mayfrank, Prof. Dr. J. Zielasek
14:15-14:45	**Diskussionsforum: Vernetzung und Zukunftsperspektiven von IVF und Akademie im LVR-Institut für Forschung und Bildung** Diskutant*innen: Prof. Dr. E. Gouzoulis-Mayfrank, S. Jünger, S. Thewes
14:45-15:00	**Schlusswort, Verabschiedung** Prof. Dr. E. Gouzoulis-Mayfrank, Köln

LVR-Klinikverbund

LVR Qualität für Menschen

LVR Qualität für Menschen
LVR-Institut für Forschung und Bildung

Interreg North-West Europe eMEN

SYMPOSIUM

E-Mental-Health-Implementierung – von der Theorie in den psychiatrisch-psychotherapeutischen Versorgungsalltag

Donnerstag, 14.10.2021 **9.30–15.15 Uhr** **Online-Veranstaltung**

Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass die Einführung digitaler psychiatrisch-psychotherapeutischer Versorgungsangebote unter gewissen Rahmenbedingungen sehr schnell gelingen kann. Aber auch ohne Pandemie schreitet die Gesetzgebung in Bezug auf e-Mental-Health-Angebote in Deutschland mittlerweile relativ zügig voran. So wurde beispielsweise im Oktober 2020 das DiGA-Verzeichnis des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte eingeführt, welches ärztlichem und psychotherapeutischem Personal eine Übersicht über verschreibungsfähige, geprüfte digitale Gesundheitsanwendungen ermöglicht.

Trotzdem gestaltet sich die Integration solcher Anwendungen im psychiatrisch-psychotherapeutischen Versorgungsalltag nicht immer einfach. Welche unterschiedlichen Hürden ergeben sich bei der Nutzung digitaler psychiatrisch-psychotherapeutischer Angebote beispielsweise im stationären und ambulanten Versorgungsalltag? Wie lassen sich die Potentiale digitaler Angebote zum Wohle der zu behandelnden Personen weiter ausbauen? Von welchen Erfahrungen aus unseren europäischen Nachbarländern können wir lernen?

Diesen und weiteren Fragen rund um die Implementierung von digitalen Anwendungen in den Versorgungsalltag widmet sich unsere Veranstaltung, zu der wir Interessierte aus den Bereichen der Gesundheitsversorgung, Verwaltung, Wissenschaft, Politik und IT-Unternehmen herzlich einladen.

Die Veranstaltung ist für alle Teilnehmenden kostenfrei und erfolgt im Rahmen des eMEN-Projekts, das durch die EU im Förderbereich „Interreg North-West Europe“ finanziell gefördert wird.

Es wird eine Simultanübersetzung (Deutsch ↔ Englisch) zur Verfügung stehen.

Die Veranstaltung ist von der Ärztekammer Nordrhein als Fortbildung mit fünf CME-Punkten zertifiziert worden.

Da die Personenzahl begrenzt ist, wird um eine formlose Anmeldung per E-Mail an ivf@lvr.de mit dem Betreff „eMEN Symposium“ bis Freitag, 8. Oktober 2021 gebeten. Bitte nutzen Sie zur Anmeldung das Formular im Anhang. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.

Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten des LVR-Instituts für Versorgungsforschung am LVR-Institut für Forschung und Bildung oder des eMEN-Projekts.

LVR-Klinikverbund LVR Qualität für Menschen

LVR Qualität für Menschen
LVR-Institut für Forschung und Bildung

Interreg North-West Europe eMEN

Programm

9.30-9.45	**Begrüßung** Prof. Dr. med E. Gouzoulis-Mayfrank/Prof. Dr. med. J. Zielasek (wissenschaftliche Leitung), LVR-IFuB, Köln
9.45-10.00	**eMEN – ein transnationales Kooperationsprojekt** (Vortrag auf Englisch) D. Eising, ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, Diemen, Niederlande

■ **E-Mental Health: Aktueller Stand und neue Entwicklungen**

10.00-10.30	**Wissenschaftliche Evidenz von Online-Psychotherapien** (Vortrag auf Englisch) Prof. Dr. H. Riper, VU Amsterdam, Niederlande
10.30-10.45	**IMMERSE: Entwicklung einer personenzentrierten Versorgung in der Psychiatrie mithilfe maschinellen Lernens** Prof. Dr. U. Reininghaus, Zentralinstitut für Seelische Gesundheit, Mannheim
10.45-11.15	*Pause*
11.15-11.30	**I-REACH: Entwicklung einer muttersprachlichen App für die stationäre psychiatrisch-psychotherapeutische Versorgung von Menschen mit Fluchterfahrung (Blended Care)** Dr. med. D. Reske/L. Schmidt, LVR-IFuB, Köln
11.30-11.45	**CoPE IT – Entwicklung einer internetbasierten Selbsthilfeanwendung im Rahmen der Covid-Pandemie** Dr. med. E.-M. Skoda, LVR-Klinikum Essen, Essen
11.45-12.00	**Moodbuster: Erfahrungen einer stationär-psychiatrischen Implementierungsstudie** (Vortrag auf Englisch) Dr. E. Van Assche, Thomas More University of Applied Sciences, Geel, Belgien
12.00-12.30	**Diskussion von Fragen aus dem Plenum** Diskutierende: Prof. Dr. H. Riper, Prof. Dr. U. Reininghaus, Dr. med. D. Reske, L. Schmidt, Dr. med. E.-M. Skoda, Dr. E. Van Assche Moderation: R. Lukies, LVR-IFuB, Köln
12.30-13.30	*Mittagspause*

■ **Praxisrelevante Überlegungen für den Versorgungsalltag**

13.30-14.00	**Perspektiven von Behandelnden auf Onlinetherapien in der stationären psychiatrischen Versorgung** J. Sander, DGPPN, Berlin
14.00-14.30	**Training für Behandelnde: Ein Curriculum für digitale Psychotherapie** Dr. med. I. Hauth, DGPPN, Berlin
14.30-15.00	**Podiumsdiskussion: Herausforderungen bei der Implementierung von E-Mental-Health Anwendungen im Praxisalltag** Diskutierende: J. Sander, Dr. med. I. Hauth Moderation: R. Lukies, LVR-IFuB, Köln
15.00-15.15	**Zusammenfassung und Verabschiedung** Prof. Dr. med. E. Gouzoulis-Mayfrank, LVR-IFuB, Köln

LVR-Institut für Forschung und Bildung

LVR Qualität für Menschen

LVR-Klinikverbund

LVR Qualität für Menschen

LVR-Fokustagung 2022

Update Essstörungen – Prävention, Diagnostik und Therapie

30. März 2022
virtuell

Programm

09:30 – 09:45	**Begrüßung und Eröffnung** Martina Wenzel-Jankowski, Prof. Dr. med. Euphrosyne Gouzoulis-Mayfrank **Einführung** Univ.-Prof. Dr. med. Martin Teufel
09:45 – 10:15	**Essstörungen – eine Erkrankungsgruppe im (pandemiebedingten) Umbruch** (Prof. Dr. med. Stephan Zipfel, Tübingen)
10:15 – 10:45	**Genetische Grundlagen der Anorexia nervosa – einer metabopsychiatrischen Störung** (Prof. rer. nat. Anke Hinney, Essen)
10:45 – 11:15	*Kaffeepause*
11:15 – 11:45	**Diagnostik und Komorbiditäten bei Essstörungen** (Prof. Dr. med. Martina de Zwaan, Hannover)
11:45 – 12:15	**Was ist unter „Severe and Enduring Anorexia Nervosa, SE-AN" zu verstehen? Diagnostische, therapeutische und ethische Überlegungen** (Univ.-Prof. Dr. med. Stephan Herpertz, Bochum)
12:15 – 13:15	*Mittagspause*
13:15 – 13:45	**Von der stationären Behandlung über die Tagesklinik zum Home Treatment – Behandlungspfade für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit Anorexia nervosa** (Univ.-Prof. Dr. med. Beate Herpertz-Dahlmann, Aachen)
13:45 – 14:15	**Zu Hause-Behandlung bei Kindern und Jugendlichen mit Essstörungen: Ansätze und Erfahrungen im multiprofessionellen Team** (Univ.-Prof. Dr. med. Beate Herpertz-Dahlmann/ Ute Thevissen/ Varinja Blume, Aachen)
14:15 – 14:45	**COVID-19: Pandemieeinflüsse auf die Lebens- und Versorgungsrealität von Kindern und Jugendlichen, insbesondere mit Essstörungen** (Dr. med. Freia Hahn, Viersen)

14:45 – 15:30	*Kaffeepause*
15:30 – 16:00	**Neue pharmakologische Ansätze bei Essstörungen** (Prof. Dr. med. Johannes Hebebrand, Essen)
16:00 – 16:30	**Psychotherapie bei Essstörungen im Erwachsenenalter** (Prof. Dr. med. Hans-Christoph Friederich, Heidelberg)
16:30 – 16:45	**Verabschiedung** Prof. Dr. med. Euphrosyne Gouzoulis-Mayfrank

Anhang 2: Publikationen

Online publiziert: 25.08.2021

Der KEZ – Kölner Fragebogen zu Einstellungen zu Zwangsmaßnahmen

Cologne Questionnaire on Attitudes Towards Coercive Measures (KEZ)

Autoren
Immanuel Baar[1,*], Mario Schmitz-Buhl[1,*], Euphrosyne Gouzoulis-Mayfrank[1,2]

Institute
1 LVR-Klinik Köln, Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität
2 LVR-Institut für Forschung und Bildung: LVR-Institut für Versorgungsforschung

Schlüsselwörter
Zwangsbehandlung, Zwangsmaßnahmen, Haltung, Einstellung, Psychiatrie

Keywords
coercion, compulsory treatment, attitude, containment, coercive measures

Bibliografie
Psychiat Prax
DOI 10.1055/a-1515-2268
ISSN 0303-4259
© 2021. Thieme. All rights reserved.
Georg Thieme Verlag KG, Rüdigerstraße 14, 70469 Stuttgart, Germany

Korrespondenzadresse
Immanuel Baar, M. A., aktuelle Adresse: Landschaftsverband Rheinland LVR, Fachbereich Planung, Qualitäts- und Innovationsmanagement, Horion Haus, Hermann-Pünder-Straße 1, 50679 Köln, Deutschland
immanuel.baar1@lvr.de

Zusätzliches Material finden Sie unter:
https://doi.org/10.1055/a-1515-2268

ZUSAMMENFASSUNG

Ziel der Studie Erstellung eines testtheoretisch fundierten Fragebogens, der die Einstellungen des Personals psychiatrischer Einrichtungen zur Anwendung von Zwang erfasst.
Methodik Eine Erstversion des Fragebogens mit 43 Items wurde auf Basis der inhaltsanalytischen Auswertung von 20 leitfadengestützten Interviews entwickelt. Anschließend wurden alle Ärzt*innen und Pflegekräfte eines psychiatrischen Krankenhauses zur anonymen Teilnahme eingeladen und danach die Endfassung des Fragebogens KEZ nach testtheoretischer Analyse erstellt.
Ergebnisse 226 Mitarbeitende nahmen teil (Rücklaufquote 32,3 %). Die testtheoretische Überprüfung führte zu einem 39-Item-Set mit hoher Konsistenz (Cronbach's α = 0,904) und 3 Faktoren: 1) Akzeptanz; 2) Sinnhaftigkeit/Legitimation und 3) Sicherheit/Ordnung durch Zwangsmaßnahmen.
Schlussfolgerung Mit dem KEZ steht ein Instrument zur Verfügung, das die Haltung des psychiatrischen Personals zur Anwendung von Zwang in ihren verschiedenen Facetten erfasst.

ABSTRACT

Objective To develop a psychometric instrument for the assessment of the attitude of psychiatric staff towards the use of coercion.
Methods Based on a literature search, interviews (37 open questions) were carried out by representatives each of doctors and nurses. A first version was developed, all doctors and nurses in a psychiatric clinic were asked to answer the questionnaire anonymously.
Results 226 employees took part (response rate 32.3 %). A test-theoretical analysis led to a 39 item set with a high consistency of the overall scale (Cronbach's α = 0.904) and three factors: 1) Acceptance of coercive measures without questioning (Cronbach's α = 0.797); 2) Meaningfulness and legitimation of coercive measures (Cronbach's α = 0.812); and 3) Security and order through coercive measures (Cronbach's α = 0.791).
Conclusions With the KEZ an instrument is available that holistically presents the various aspects of the attitudes of psychiatric staff to the use of coercion.

* I. Baar und M. Schmitz-Buhl haben zu gleichen Teilen zu der Arbeit beigetragen.

Heruntergeladen von: LVR-Klinik Köln. Urheberrechtlich geschützt.

Einleitung

Das Ziel der Stärkung der Patientenautonomie hat eine hohe Priorität in der psychiatrischen Versorgung [1–3]. Sowohl auf fachlicher als auch auf gesellschaftlich-politischer Ebene wird eine Reduktion von Zwangsmaßnahmen im stationären Bereich erwartet. Die bereits 2009 im Deutschen Bundestag ratifizierte UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) hat Reformen in der nationalen Gesetzgebung und der psychiatrischen Versorgung befördert [4]. Diese gehen seitdem mit einer Intensivierung verschiedener gewalt- und zwangspräventiver Maßnahmen in psychiatrischen Institutionen einher [5]. Hierzu gehören die (Teil-)Öffnungen ehemals geschlossener Stationen mit dem Ziel einer deeskalierenden Milieugestaltung [6], die Implementierung regelmäßiger Deeskalations- und Kommunikationstrainings sowie komplexe Interventionen wie z. B. Safewards [7, 8].

Das Ursachengefüge von Gewalt, Aggression und Eindämmungsmaßnahmen im psychiatrischen Behandlungssetting ist komplex und umfasst sowohl Patienten- als auch institutionelle und Mitarbeitervariablen [9]. Mit großer Wahrscheinlichkeit sind auch die Haltung bzw. die Einstellungen des Personals psychiatrischer Einrichtungen zu Zwangsmaßnahmen bedeutsam. Diese Einstellungen sind wiederum vielschichtig, sie umfassen kognitive, emotionale und verhaltensbezogene Komponenten und dürften mit zahlreichen Faktoren wie das Alter, die Berufserfahrung und professionelle Stellung sowie eigene Erfahrungen mit psychischer Krankheit zusammenhängen [10]. Die Haltung des psychiatrischen Personals zu Zwangsmaßnahmen steht zunehmend im Fokus von Untersuchungen [11–15], es liegen aber wenige standardisierte Instrumente zur Erfassung dieser Haltung vor.

Der Fragebogen ACMQ aus England (Attitudes to Containment Measures Questionnaire) [16], der auch in deutscher Übersetzung vorliegt [17], erfasst die Einstellungen und die Erfahrung des Personals mit den einzelnen Zwangsmaßnahmen wie z. B. Isolierung, Fixierung und Zwangsmedikation, ohne jedoch die ganzheitliche Haltung zu Zwang abzugreifen [18]. Der Fragebogen SACS aus Norwegen (The Staff Attitude to Coercion Scale) [19] erfasst die grundsätzliche Haltung zur Anwendung von Zwang in der Behandlung psychisch Kranker, er berücksichtigt aber weder die emotionalen Komponenten noch die Interaktion mit Teammitgliedern und Vorgesetzten, und auch nicht die Besonderheiten durch bestimmte patientenseitige Eigenschaften und die Bedeutung der gesellschaftlich-rechtlichen Rahmenbedingungen. Auf diese Limitation wird auch in einer aktuellen Publikation aus Hamburg hingewiesen [20]. Der Fragebogen MAVAS (Management of Aggression and Violence Attitude Scale) [21], der ebenfalls in deutscher Übersetzung vorliegt (MAVAS-SWISS-German) [21, 22], ermittelt die Haltung des psychiatrischen Personals zu Aggression und Gewalt, wobei aber eher die von Patient*innen ausgehende Gewalt und Aggression im Vordergrund steht. Weitere Instrumente wie die SOAS-R (Staff Observation Aggression Scale – Revised) [23], die PCC-SR (Patient-Staff Conflict Checklist [16, 24], der TCI (Team Climate Inventory) [25] und die WAS (Ward Atmosphere Scale) [26] erfassen verwandte Aspekte, aber nicht direkt die Haltung zu der Anwendung von Zwangsmaßnahmen.

Ziel der vorliegenden Arbeit war die Entwicklung eines testtheoretisch fundierten Fragebogens, der die Haltung des Personals psychiatrischer Einrichtungen zur Anwendung von Zwang in ihrer Komplexität mit kognitiven und emotionalen Komponenten erfasst.

Methoden

Die Fragebogenentwicklung erfolgte an einem Fachkrankenhaus für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik mit mehreren Abteilungen (Allgemeinpsychiatrie, Abhängigkeitserkrankungen, Gerontopsychiatrie, Psychosomatik, Maßregelvollzug) und einem Pflichtversorgungsauftrag für ca. 600 000 Menschen.

Zunächst wurde eine Literaturrecherche in Medline mit den Suchbegriffen Einstellung/attitudes, Zwangsmaßnahmen/coercive measures und Zwang/coercion, duress durchgeführt. Auf Basis einiger Publikationen (insbesondere [5, 9, 10]) und der eigenen klinischen Erfahrung wurden in einem ersten Schritt 6 Themen oder Teilaspekte der Haltung zu Zwangsmaßnahmen identifiziert: 1. Eigene Haltung; 2. Haltung des Teams; 3. Bedeutung von Diagnosen; 4. Folgen für Patient*innen nach Anwendung von Zwangsmaßnahmen; 5. Empathie vs. Sicherheitsbedürfnis und Behandlungsauftrag; 6. Einfluss von Gesellschaft, Medien und Politik. In einem zweiten Schritt wurde ein Interviewleitfaden mit 37 offenen Fragen zu diesen 6 Themenbereichen erstellt und es wurden leitfadengestützte Interviews an einer Stichprobe von 20 Klinikmitarbeitenden (Ärzt*innen und Pflegefachkräfte) durchgeführt. Bei der Auswahl der Interviewteilnehmenden wurde auf eine ausgeglichene Verteilung hinsichtlich Geschlecht, Alter (<40 Jahr/>40 Jahre), Berufsgruppe (Pflegedienst/ärztlicher Dienst) und Berufserfahrung (<5/>5 Jahre) geachtet. Die Interviews wurden in Anlehnung an die qualitative Methode nach Mayring [27] inhaltsanalytisch ausgewertet. Somit flossen sowohl Erkenntnisse aus der vorausgegangenen Literaturrecherche als auch die Ergebnisse aus den Interviews in eine vorläufige Version des Erhebungsbogens mit 43 Items bzw. Statements ein. Diese können auf einer 5-stufigen Skala beantwortet werden (stark ablehnend, ablehnend, weder noch, zustimmend, stark zustimmend). Es wurde bewusst eine Antwortskala mit einer mittleren Kategorie gewählt, um auch eine indifferente Antwortmöglichkeit („weder noch“) anzubieten, falls keine explizite Einstellung zu einer Aussage vorliegt oder die Einstellung eher schwach ausgeprägt ist.

Nach einem Pre-Test an einer Stichprobe von 14 Mitarbeitenden wurden in einem dritten Schritt alle Ärzt*innen und Pflegefachkräfte der Klinik (Stand 02.01.2019: 120 Ärzt*innen bzw. 580 Pflegefachkräfte) per Mail gebeten, sich an der anonymen Befragung mit der vorläufigen 43-Item-Version des Erhebungsbogens zu beteiligen. Die Befragung erfolgte online mithilfe der Befragungssoftware EvaSys. Der Befragungszeitraum war vom 02.01.2019 bis 10.03.2019.

Anhand der Ergebnisse wurden zunächst die Faktoren über das Kaiser-Kriterium ermittelt (Eigenwert >1). Die darauffolgenden Berechnungen erfolgten mit einer Begrenzung auf zu-

Heruntergeladen von: LVR-Klinik Köln. Urheberrechtlich geschützt.

▶ **Tab. 1** Stichprobenbeschreibung.

Variable		Anzahl	%
Geschlecht	weiblich	124	55,4
	männlich	98	43,8
	keines von beiden	2	0,9
Alter	unter 30 Jahre	59	26,6
	30–39 Jahre	69	31,1
	40–49 Jahre	44	19,8
	50 Jahre und älter	50	22,5
Berufsgruppen-zugehörigkeit	Pflege- bzw. Erziehungsdienst	190	86,0
	▪ davon Fachgesundheits- u. Krankenpfleger/-pflegerin für Psychiatrie	35	18,4
	Ärztlicher Dienst	31	14,0
	▪ davon Facharzt/Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie	11	35,4
Erfahrung im psychiatrischen Akutsetting (geschützt)		177	79,7
Erfahrung in einer forensischen Aufnahme-/Krisenstation		51	23,1
Berufserfahrung	weniger als 5 Jahre	69	30,7
	5–20 Jahre	101	44,9
	mehr als 20 Jahre	55	24,4

nächst 6, und anschließend auf 4 bzw. 3 Faktoren mit dem Ziel, eine inhaltlich gut interpretierbare Lösung zu finden. Für die jeweiligen Lösungen wurden die Reliabilitäten auf Skalen- und Fragebogenebene überprüft (Cronbach's α). Für die Erstellung der Endfassung des Fragebogens wurden die weniger geeigneten Items anhand der *korrigierten Item-Skala-Korrelation* und *Cronbach's α, wenn das Item entfernt würde*, identifiziert und entfernt.

Die Berechnungen erfolgten über IBM SPSS Version 25, Prozeduren Factor und Reliability.

Ergebnisse

Die vorläufige Version des KEZ enthielt 13 Items zum Themenbereich *Eigene Haltung und Einstellung*, 9 Items zum Bereich *Haltung des multiprofessionellen Teams*, ein Item zum Bereich *Patient*innendiagnosen*, 3 Items zum Bereich *Erfahrungen und Einschätzungen von möglichen Folgen nach der Anwendung von Zwangsmaßnahmen*, 11 Items zum Bereich *Mitgefühl und Verständnis für Patient*innen vs. Sicherheitsbedürfnis und Behandlungsauftrag* und 6 Items zu den *Einflüssen von Gesellschaft, Medien und Politik*.

Die Statements zur Anwendung von Zwang sind zum Teil akzeptierend, zum Teil ablehnend formuliert und werden anhand einer 5-stufigen Skala von 1 (stark ablehnend) bis 5 (stark zustimmend) beantwortet. Für die Auswertung werden die ablehnenden Aussagen umcodiert und aus allen Items wird ein Summenscore gebildet. Dabei bedeuten höhere Werte eine höhere Akzeptanz von Zwangsmaßnahmen.

An der anonymen Befragung beteiligten sich 31 von 120 Ärzt*innen (25,8 %) und 190 von 580 Pflegefachkräften (32,8 %). Fünf weitere Teilnehmenden machten keine Angabe über die Berufsgruppe. Die Stichprobe umfasste somit insgesamt 226 Personen. Die Teilnahmequote lag insgesamt bei 32,3 %. Die Beschreibung der Stichprobe findet sich in der ▶ **Tab. 1**.

Faktorenanalyse

Die erste Analyse der 43 Items über das Kaiser-Kriterium (Faktorenzahl gleich der Zahl der Faktoren mit Eigenwerten >1) mit 14 Faktoren (64,7 % aufgeklärte Varianz) wurde verworfen, da die Faktoren inhaltlich schwer interpretierbar waren und die Anzahl der Items, die auf die jeweiligen Faktoren luden, sehr unterschiedlich war. Für die folgenden Analysen wurde die Anzahl der Faktoren zunächst auf 6, dann auf 4 und schließlich auf 3 beschränkt.

Die Beschränkung auf 6 Faktoren (45,1 % aufgeklärte Varianz) bildete nicht die 6 Themenbereiche des Fragebogens ab. Zudem wurden Faktoren gebildet, die nur aus 2 bzw. 4 Items bestanden und darüber hinaus inhaltlich eine z. T. unzureichende Konsistenz aufwiesen.

Die 4-Faktoren-Lösung erreichte eine Varianzaufklärung von insgesamt 37,1 %. Für die Gesamtskala ergab sich ein Wert für Cronbach's α von 0,504. Nach Ausschluss von 5 ungünstigen Items erhöhte sich der Wert für Cronbach's α geringfügig auf 0,516 (38 Items). Nach zusätzlicher Entfernung der 5 auf den schwer interpretierbaren Faktor 4 ladenden Items und einer Be-

Heruntergeladen von: LVR-Klinik Köln. Urheberrechtlich geschützt.

▶ **Tab. 2** Ergebnisse der Faktorenanalyse, 3-Faktoren-Lösung.

	Summen von quadrierten Faktorladungen für Extraktion			rotierte Summe der quadrierten Ladungen		
Faktor	**gesamt**	**% der Varianz**	**Kumulierte %**	**gesamt**	**% der Varianz**	**Kumulierte %**
1	8,022	18,655	18,655	4,790	11,140	11,140
2	3,103	7,215	25,870	4,613	10,729	21,869
3	2,125	4,943	30,813	3,846	8,944	30,813

schränkung auf 3 Faktoren erhöhte sich Cronbach's α auf 0,559 (33 Items).

Schließlich erfolgte eine weitere Faktorenanalyse mit 3 Faktoren an dem vollständigen Item-Set von 43 Items. Erzielt wurde dabei eine relativ gleichmäßige Verteilung der Items auf die 3 Faktoren. Vier Items, die auf den Faktor 3 luden, wurden entfernt, weil sie zum Teil inhaltlich nicht zu den anderen Items passten bzw. die Entfernung die Reliabilitätswerte verbesserte. Die 3 Faktoren mit jeweils 17, 10 und 12 Items können inhaltlich gut nachvollziehbar interpretiert werden. ▶ **Tab. 2** ist die erklärte Gesamtvarianz der 3-Faktoren-Lösung bei der endgültigen 39-Item-Version des KEZ zu entnehmen.

Bei der Beantwortung der Items auf einer Skala von 1–5 bewegen sich die möglichen Summenscores in einem Range von 39–195. Höhere Werte bedeuten jeweils eine höhere Akzeptanz von Zwangsmaßnahmen.

Items des Faktor 1 sind bspw. *„Ich orientiere mich daran, wie meine Kolleginnen und Kollegen mit einer eskalierten Situation umgehen"*, *„Die Dauer der Anwendung von Zwangsmaßnahmen ließe sich noch reduzieren"* und *„Der professionelle Umgang mit aggressiven Patientinnen/Patienten ist abhängig von dem Team (Team-Philosophie)"*.

▶ **Online-Tab. 3** sind die 17 Items zu entnehmen, die mit dem Faktor 1 zusammenhängen. Aufgeführt sind noch die korrigierte Item-Skala-Korrelation und Cronbach's α, wenn das Item entfernt wird.

Cronbach's α der aus den auf dem Faktor 1 ladenden Items gebildeten Skala 1 liegt bei 0,797. Der Wert hätte durch Entfernung eines Items (*Die Haltung und Einstellung zum Umgang mit Zwangsmaßnahmen muss von den Vorgesetzten [ärztlicher/pflegerischer Dienst] vorgelebt werden)* leicht erhöht werden können. Aufgrund des klaren inhaltlichen Bezugs wurde dieses Item in der Skala belassen. Die Skala 1 kann inhaltlich als **Akzeptanz von Zwangsmaßnahmen ohne Hinterfragen** interpretiert werden.

▶ **Online-Tab. 4** sind die 10 Items zu entnehmen, die mit dem Faktor 2 zusammenhängen. Items dieses Faktors sind bspw. *„Die Verabreichung von Medikamenten unter Zwang ist in bestimmten Situationen sinnvoll"*, *„Ich glaube jede Behandlung in der Psychiatrie/forensischen Psychiatrie ist auch ohne die Anwendung von Zwangsmaßnahmen möglich"* und *„Ich fühle mich bei der Anwendung von Zwangsmaßnahmen als Behandlungsoption durch den gesetzlichen Rahmen eingeschränkt"*.

Cronbach's α der aus den auf dem Faktor 2 ladenden Items gebildeten Skala 2 liegt bei 0,812. Ein Itemausschluss würde den Wert nicht verbessern. Die Skala 2 kann inhaltlich als **Sinnhaftigkeit und Legitimation von Zwangsmaßnahmen** interpretiert werden.

▶ **Online-Tab. 5** sind die 12 Items zu entnehmen, die mit dem Faktor 3 zusammenhängen. Dazu gehören bspw. die folgenden Items: *„Die Sicherheit des Personals steht im Behandlungssetting immer an erster Stelle"*, *„Wenn ein angespannter Patient/eine angespannte Patientin bereits aggressives Verhalten zeigt, sind deeskalierende Maßnahmen nicht mehr sinnvoll"* und *„Um in der Station wieder ‚Ruhe und Ordnung' herzustellen, ist die Anwendung von Zwangsmaßnahmen ein legitimes Mittel"*.

Cronbach's α der aus den auf dem Faktor 3 ladenden Items gebildeten Skala 3 liegt bei 0,791. Ausschlüsse weiterer Items würden den Wert nicht verbessern. Die Skala 3 kann inhaltlich als **Sicherheit und Ordnung durch Zwangsmaßnahmen** interpretiert werden.

Für die Gesamtfassung mit 39 Items ergibt sich ein Cronbach's α von 0,904.

Der Fragebogen KEZ in der 39-Item-Version findet sich in ▶ **Online-Tab. 6** im elektronischen Anhang.

Diskussion

Die Psychiatrie hat zunehmend den Anspruch, Patient*innen auf Augenhöhe zu begegnen und in diesem Kontext die Anwendung von Zwang und Gewalt im psychiatrischen Behandlungsalltag fortwährend zu reduzieren bzw. soweit wie möglich zu vermeiden [2, 5, 9]. Diese positive Entwicklung in Richtung einer autonomiefokussierten Psychiatrie wurde durch die Ratifizierung der UN-BRK und die darauffolgenden nationalen Gesetzesnovellierungen befördert [4, 28]. Im Rahmen der Bemühungen um Minimierung von Zwang in der Behandlung psychisch Kranker sind sicher auch die Einstellungen bzw. die Haltung der professionellen Akteure im psychiatrischen Behandlungssetting zu Zwangsmaßnahmen bedeutsam, denn sie dürften als Mediator die Kommunikation mit den Patient*innen und die Wirksamkeit gewalt- und zwangspräventiver Interventionen beeinflussen. Die Haltung zu Zwangsmaßnahmen ist nicht monodimensional, sondern sie besteht aus kognitiven und emotionalen Komponenten und sie dürfte mit verschiedenen Faktoren wie Alter, Berufserfahrung, Position, aber auch eigene Erfahrungen mit psychischer Krankheit zusammenhängen [10].

Mit dem neu entwickelten KEZ (Kölner Fragebogen zur Einstellung zu Zwangsmaßnahmen) liegt ein testanalytisch fundiertes Befragungsinstrument vor, welches die Haltung und Einstellung des Personals psychiatrischer Einrichtungen in Bezug auf die Anwendung von Zwang in der Behandlung psy-

Heruntergeladen von: LVR-Klinik Köln. Urheberrechtlich geschützt.

chisch Kranker in ihrer Komplexität erfasst. Neben der eigenen grundsätzlichen kognitiven Einstellung zu Zwangsmaßnahmen im psychiatrischen Behandlungssetting werden emotionale Komponenten sowie haltungs- und einstellungsrelevante Kontexte wie die Interaktion mit Teammitgliedern und Vorgesetzten, bestimmte patientenseitige Eigenschaften und gesellschaftlich-rechtliche Rahmenbedingungen berücksichtigt. Mithilfe der Faktorenanalyse lassen sich 3 Faktoren bzw. Subskalen abgrenzen, die jeweils *die (unkritische) Akzeptanz von Zwangsmaßnahmen* (17 Items), *die Sinnhaftigkeit und Legitimation von Zwangsmaßnahmen* (10 Items), und *die Sicherheit und Ordnung durch Zwangsmaßnahmen* (12 Items) widerspiegeln, wobei höhere Scores stets eine höhere Akzeptanz bzw. eine wenig kritische Haltung zu Zwangsmaßnahmen zum Ausdruck bringen. Durch die Einbeziehung der Daten aus der qualitativen Erhebung und die Beteiligung einer relativ großen Stichprobe von Ärzt*innen und Pflegefachkräften an der Befragung (n = 226) ist von einer hohen inhaltlichen Validität des KEZ auszugehen. Die Konsistenz ist auf der Ebene der Gesamtskala sehr gut (Cronbach's α von 0,904), und auch auf der Ebene der 3 Subskalen gut (Cronbach's α jeweils über 0,790).

Der KEZ unterscheidet sich damit wesentlich vom britischen ACMQ [17, 29], indem er die grundsätzliche Haltung zur Anwendung von Zwang erfasst, und nicht die Haltung zu einzelnen Zwangsmaßnahmen. Der KEZ enthält wenige Items, welche sich explizit auf bestimmte Zwangsmaßnahmen beziehen (Fixierung, Isolierung und Zwangsmedikation); hier wird die Haltung zu diesen Maßnahmen exemplarisch und nicht im Vergleich zu anderen Zwangsmaßnahmen erfasst. Inhaltlich ist der KEZ enger verwandt mit dem norwegischen SACS [19], der ebenfalls die grundsätzliche Haltung zur Anwendung von Zwang in der Behandlung psychisch Kranker erfasst. Der KEZ ist dabei wesentlich komplexer in Hinblick auf systemrelevante Faktoren. Er berücksichtigt somit neben der kognitiven Seite der Einstellungen auch die emotionalen Komponenten die Dynamik im Behandlungsteam wie Interaktion der Teammitglieder und Vorgesetzten sowie die Relevanz gesellschaftlich-rechtlicher Rahmenbedingungen. Die Unterskalen des SACS *Zwang als Beleidigung/Kränkung (kritische Haltung), Zwang als Fürsorge und Sicherheit (pragmatische Haltung)* und *Zwang als Behandlung (positive Haltung)* beziehen sich in ihren Aussagen unmittelbar auf Zwangsmaßnahmen im Kontext von Sicherheit/Schutz und Fürsorge und den Ressourcen, die den Einsatz vermeiden könnten (Zeit, Personal). Darüber hinaus stehen die Integrität der Patient*innen und die Beeinträchtigung der Beziehung durch die Anwendung von Zwang sowie der Zustand des Patienten/der Patientin, der die Anwendung von Zwangsmaßnahmen rechtfertigen würde, im Fokus des SACS. Bei der Erstellung des KEZ wurde hingegen Wert darauf gelegt, beeinflussende Faktoren zu berücksichtigen, die den Umgang mit diesem Thema in sozialen Systemen mitbestimmen. Dies beruht auf der Annahme, dass die Haltung eines einzelnen Akteurs nicht alleine den Ausgang einer eskalierenden Situation entscheidet. Daher bezieht der KEZ in den Unterskalen auch Aspekte wie die „Team-Philosophie", die eigene Erfahrung, den Umgang der Kolleg*innen mit eskalierten Situationen und die vorgelebte Haltung der Vorgesetzten mit ein. Auch Items, welche sich auf die Vor- und Nachbesprechung im Team beziehen, haben einen Einfluss auf das eigene Handeln („was wird von mir als Teil des Behandlungsteams erwartet"). Weiter beziehen sich Items ebenfalls auf den gesetzlichen Rahmen und wie dieser in Hinblick auf die Anwendung von Zwang gesehen wird sowie auf Schulungsmaßnahmen (wertschätzende und emphatische Kommunikation).

Der KEZ eignet sich zum Einsatz in psychiatrischen Kliniken und Abteilungen mit Akutbereichen, bei denen zumindest die Rahmenbedingungen für die Anwendung von Zwang vorliegen. Er kann sowohl im Rahmen von Forschungsvorhaben als auch im Rahmen qualitätssichernder Maßnahmen in Einrichtungen genutzt werden. Bei ausreichend großen Stichproben kann eine anonyme Erhebung des KEZ ein wertvolles Bild zur Haltung des Personals einer oder mehrerer Einrichtungen liefern und mögliche Unterschiede zwischen verschiedenen Settings sowie älteren und jüngeren, erfahrenen und weniger erfahrenen, oder männlichen und weiblichen Mitarbeitenden aufzeigen. So können die Ergebnisse eine Grundlage für die gezielte Planung von Maßnahmen wie Schulungen des Personals u. Ä. liefern. Eine weitere Einsatzmöglichkeit wäre die Evaluation von ganzheitlich gestalteten Seminaren und Schulungen mit dem Ziel der Gewalt- und Zwangsprävention, indem die Einstellung der Teilnehmenden zu Zwangsmaßnahmen vor und nach der Schulung verglichen wird [30]. Auch könnten wiederholte Erhebungen in größeren Abständen im Sinne eines Längsschnitts die sukzessive Veränderung der Haltung und Einstellungen zur Anwendung von Zwang in der Psychiatrie dokumentieren. Schließlich könnten Untersuchungen mit einer parallelen Erhebung des KEZ und anderer Instrumente wie die MAVAS (Management of Aggression and Violence Attitude Scale) [21, 22], die PCC-SR (Patient-Staff Conflict Checklist) [16, 24] oder die WAS (Ward Atmosphere Scale) [26] interessante Hinweise auf mögliche Zusammenhänge zwischen verwandten Aspekten liefern.

Die Stärke des KEZ ist die Erfassung der Haltung zur Anwendung von Zwangsmaßnahmen in ihrer umfassenden Komplexität: Es wird nicht nur die individuelle Haltung der Mitarbeitenden in psychiatrischen Kliniken berücksichtigt, sondern auch weitere Einflussfaktoren wie Behandlungsteams, Vorgesetzte und gesetzliche Rahmenbedingungen. Eine weitere Stärke ist die systematische Entwicklung des Instruments, bestehend aus einer Literaturrecherche, der Berücksichtigung der klinischen Erfahrung von Professionellen aus qualitativ ausgewerteten Interviews und anschließender testtheoretischen Überprüfung an einer hinreichend großen Stichprobe, aus der ein Fragebogen mit guten Kennwerten erstellt wurde. Die Ergebnisse bieten eine Grundlage für die Ableitung von gezielten Interventionen (wie Fortbildungen oder Supervision). Ferner ist ein Einsatz des KEZ zur Evaluation von Schulungsmaßnahmen, die einen Einfluss auf die Haltung der Teilnehmenden haben soll, denkbar. Als Limitation möchten wir benennen, dass im Rahmen der Entwicklung des KEZ Mitarbeitende von lediglich *einer* psychiatrischen Einrichtung befragt wurden. Es beteiligten sich zwar Mitarbeitende aus unterschiedlichen Stationen und Fachabteilungen; dennoch wäre es wünschenswert gewesen, Personal aus verschiedenen Kliniken, und idealerweise aus verschie-

Heruntergeladen von: LVR-Klinik Köln. Urheberrechtlich geschützt.

denen Bundesländern, zu befragen. Durch die Restriktion auf eine Klinik bzw. eine Region können lokale/regionale Traditionen und landesgesetzliche Bestimmungen das Instrument derart beeinflusst haben, dass seine Eignung für die Anwendung in anderen Regionen beeinträchtigt wird. Ein weiterer Punkt, der kritisch hervorgehoben werden muss, ist die Tatsache, das sich in dem KEZ mehr Items auf die Fixierung beziehen als auf die Isolierung. Dieses Ungleichgewicht könnte z. B. ein Problem bei der Anwendung des Instruments in Ländern darstellen, welche verstärkt alternative Zwangsmaßnahmen einsetzen. Darüber hinaus wurde die endgültige 39-Item-Version des KEZ nicht erneut an einer unabhängigen Stichprobe validiert. Schließlich ist das Instrument mit seinen 39 Items relativ lang. In einer künftigen Arbeit sollte geprüft werden, ob eine Kurzversion die Haltung und Einstellungen zur Anwendung von Zwang im psychiatrischen Behandlungssetting ähnlich gut erfassen könnte wie die 39-Item-Version. Hierbei sollten Items, die sich auf regionale Rahmenbedingungen beziehen (wie lokale Gesetzgebung; Landes- wie Bundesebene), eliminiert werden, um eine universelle Anwendung auch im internationalen Kontext zu ermöglichen. Die Kurzversion sollte unter Berücksichtigung testtheoretischer Aspekte möglichst an einer größeren Stichprobe von Mitarbeitenden aus verschiedenen Einrichtungen entwickelt und validiert werden. Für den internationalen Einsatz ist eine Übersetzung in eine englische Version vorgesehen. Nach erfolgter Modifizierung kann in zukünftigen Studien das Antwortverhalten im KEZ mit Variablen wie Alter, Geschlecht, Wohnort (Land/Bundesland), Beruf, Berufsposition sowie die Berufserfahrung analysiert werden.

KONSEQUENZEN FÜR KLINIK UND PRAXIS

Mit dem KEZ wurde ein testtheoretisch fundiertes Instrument geschaffen, um die Haltung von psychiatrischem Fachpersonal zu der Anwendung von Zwang in der Behandlung psychisch Kranker zu erfassen. Dieser Fragebogen deckt die Breite der Faktoren, die einen Einfluss auf die Einstellung haben, gut ab. Es werden nicht nur abstrakte Einstellungen, sondern auch konkrete Umgebungsbedingungen wie das Behandlungsteam, die systemspezifische Kultur, die in der Organisationseinheit (Abteilung/Klinik) etabliert ist sowie die Gesetzgebung als gesellschaftliches Normativ mit einbezogen. Der KEZ kann sowohl im Rahmen von Forschungsvorhaben im Themenbereich Patientenautonomie als auch im Qualitätsmanagement psychiatrischer Einrichtungen eingesetzt werden.

Interessenkonflikt

Die Autorinnen/Autoren geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

Literatur

[1] Wullschleger A, Mielau J, Mahler L et al. Beiträge zur Vermeidung von Zwang in der Akutpsychiatrie. Fortschr Neurol Psychiatr 2018; 86: 500–508. doi:10.1055/a-0604-2714

[2] Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie. Achtung der Selbstbestimmung und Anwendung von Zwang bei der Behandlung psychisch erkrankter Menschen. Der Nervenarzt 2014; 85: 1419–1431. doi:10.1007/s00115-014-4202-8

[3] Bundesärztekammer. Stellungnahme der Zentralen Kommission zur Wahrung ethischer Grundsätze in der Medizin und ihren Grenzgebieten (Zentrale Ethikkommission) bei der Bundesärztekammer Zwangsbehandlung bei psychischen Erkrankungen. Deutsches Ärzteblatt 2013; 110: 1334–1338

[4] Gerlinger G, Deister A, Heinz A et al. Nach der Reform ist vor der Reform. Der Nervenarzt 2019; 90: 45–57. doi:10.1007/s00115-018-0612-3

[5] Pollmächer T, Nyhuis P. Autonomie-fokussierte Psychiatrie. Psychiat Prax 2018; 45: 233–235. doi:10.1055/a-0637-6962

[6] Gouzoulis-Mayfrank E, Gairing SK, Krämer T et al. Öffnung einer psychiatrischen Akutstation als komplexe Intervention. Nervenarzt 2019; 90: 709–714. doi:10.1007/s00115-019-0734-2

[7] Lo SB, Gaupp R, Huber C et al. Einfluss einer „Offenen-Tür-Politik“ auf die Stationsatmosphäre: Auswirkungen auf die Behandlungsqualität. Psychiat Prax 2018; 45: 133–139. doi:10.1055/s-0042-121784

[8] Cibis ML, Wackerhagen C, Müller S et al. Vergleichende Betrachtung von Aggressivität, Zwangsmedikation und Entweichungsraten zwischen offener und geschlossener Türpolitik auf einer Akutstation. Psychiat Prax 2017; 44: 141–147. doi:10.1055/s-0042-105181

[9] DGPPN, Hrsg. S3-Leitlinie Verhinderung von Zwang: Prävention und Therapie aggressiven Verhaltens bei Erwachsenen. Version vom 10.09.2018, Kapitel 14: Evidenz zu Interventionen zur Reduktion von freiheitsbeschränkenden Maßnahmen 2018: 234–247

[10] Steinert T. Ethische Einstellungen zu Zwangsunterbringung und -behandlung schizophrener Patienten. Psychiat Prax 2007; 34 (Suppl. 02): S186–190. doi:10.1055/s-2006-952003

[11] Lauber C, Rossler W. Zwangsaufnahme in das psychiatrische Krankenhaus im Spiegel der öffentlichen Meinung und aus Sicht von Professionellen in der Psychiatrie. Psychiat Prax 2007; 34 (Suppl. 02): S181–185. doi:10.1055/s-2006-952002

[12] Hotzy F, Jaeger M, Buehler E et al. Attitudinal variance among patients, next of kin and health care professionals towards the use of containment measures in three psychiatric hospitals in Switzerland. BMC Psychiatry 2019; 19: 128. doi:10.1186/s12888-019-2092-9

[13] Jaeger M, Ketteler D, Rabenschlag F et al. Informal coercion in acute inpatient setting – knowledge and attitudes held by mental health professionals. Psychiatry Res 2014; 220: 1007–1011. doi:10.1016/j.psychres.2014.08.014

[14] Morandi S, Silva B, Mendez Rubio M et al. Mental health professionals' feelings and attitudes towards coercion. Int J Law Psychiatry 2021; 74: 101665. doi:10.1016/j.ijlp.2020.101665

[15] Schwerthöffer D, Seidl O, Hamann J. Wie bewerten Mitarbeiter einer psychiatrischen Klinik medizinethische Konflikte bei Zwangsmaßnahmen. Fortschr Neurol Psychiatr 2020; 88: 297–306. doi:10.1055/a-0863-4391

[16] Bowers L. Association between staff factors and levels of conflict and containment on acute psychiatric wards in England. Psychiatr Serv 2009; 60: 231–239. doi:10.1176/ps.2009.60.2.231

[17] Ettl A-K, Möller J, Huber CG et al. ACMQ-D: Deutschsprachige Version des Attitudes to Containment Measures (ACMQ)-Fragebogens Einstellungen zu Behandlungen ohne Zustimmung («Zwangsmaßnahmen»). Berlin: DGPPN; 2013

Heruntergeladen von: LVR-Klinik Köln. Urheberrechtlich geschützt.

[18] Laukkanen E, Kuosmanen L, Louheranta O et al. Psychiatric nursing managers' attitudes towards containment methods in psychiatric inpatient care. J Nurs Manag 2020; 28: 699–709. doi:10.1111/jonm.12986

[19] Husum TL, Finset A, Ruud T. The Staff Attitude to Coercion Scale (SACS): reliability, validity and feasibility. Int J Law Psychiatry 2008; 31: 417–422. doi:10.1016/j.ijlp.2008.08.002

[20] Krieger E, Moritz S, Lincoln TM et al. Coercion in psychiatry: A cross-sectional study on staff views and emotions. J Psychiatr Ment Health Nurs 2020. doi:10.1111/jpm.12643

[21] Duxbury J, Hahn S, Needham I et al. The Management of Aggression and Violence Attitude Scale (MAVAS): a cross-national comparative study. J Adv Nurs 2008; 62: 596–606. doi:10.1111/j.1365-2648.2008.04629.x

[22] Hahn S, Needham I, Abderhalden C et al. The effect of a training course on mental health nurses' attitudes on the reasons of patient aggression and its management. J Psychiatr Ment Health Nurs 2006; 13: 197–204. doi:10.1111/j.1365-2850.2006.00941.x

[23] Morken T, Baste V, Johnsen GE et al. The Staff Observation Aggression Scale – Revised (SOAS-R) – adjustment and validation for emergency primary health care. BMC Health Serv Res 2018; 18: 335. doi:10.1186/s12913-018-3157-z

[24] Bowers L. TAWS Internet Paper 3: the validity of the patient-staff conflict checklist-shift report (PCC-SR) evaluated. 2008: https://www.kcl.ac.uk/ioppn/depts/hspr/archive/mhn/projects/tawsdocs/taws-ip03.pdf

[25] Ouwens M, Hulscher M, Akkermans R et al. The Team Climate Inventory: application in hospital teams and methodological considerations. Qual Saf Health Care 2008; 17: 275–280. doi:10.1136/qshc.2006.021543

[26] Lise Bakken T, Ivar Røssberg J, Friis S. The ward atmosphere scale for psychiatric inpatients with intellectual disability: a pilot study. Advances in Mental Health and Intellectual Disabilities 2012; 6: 265–272. doi:10.1108/20441281211261159

[27] Mayring P. Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken. 12. Aufl. Weinheim: Beltz; 2015

[28] Pollmächer T. Autonomiefokussierung als Leitgedanke einer minimalrestriktiven Psychiatrie. Nervenarzt 2019; 90: 669–674. doi:10.1007/s00115-019-0714-6

[29] Dack C, Ross J, Bowers L. The relationship between attitudes towards different containment measures and their usage in a national sample of psychiatric inpatients. J Psychiatr Ment Health Nurs 2012; 19: 577–586. doi:10.1111/j.1365-2850.2011.01832.x

[30] Hirsch S, Steinert T. Measures to Avoid Coercion in Psychiatry and Their Efficacy. Dtsch Arztebl Int 2019; 116: 336–343. doi:10.3238/arztebl.2019.0336

Heruntergeladen von: LVR-Klinik Köln. Urheberrechtlich geschützt.

Clinical Psychology in Europe

PsychOpen GOLD

Latest Developments

Check for updates

From Formative Research to Cultural Adaptation of a Face-to-Face and Internet-Based Cognitive-Behavioural Intervention for Arabic-Speaking Refugees in Germany

Maria Böttche[1,2], Christina Kampisiou[1], Nadine Stammel[1,2], Rayan El-Haj-Mohamad[1], Carina Heeke[1], Sebastian Burchert[1], Eva Heim[3,4], Birgit Wagner[5], Babette Renneberg[6], Johanna Böttcher[7], Heide Glaesmer[8], Euphrosyne Gouzoulis-Mayfrank[9], Jürgen Zielasek[9], Alexander Konnopka[10], Laura Murray[11], Christine Knaevelsrud[1]

[1] *Clinical-Psychological Intervention, Freie Universität Berlin, Berlin, Germany.* **[2]** *Center Überleben, Berlin, Germany.* **[3]** *Department of Psychology, University of Zurich, Zurich, Switzerland.* **[4]** *Institute of Psychology, University of Lausanne, Lausanne, Switzerland.* **[5]** *Clinical Psychology & Psychotherapy, Medical School Berlin, Berlin, Germany.* **[6]** *Clinical Psychology and Psychotherapy, Freie Universität Berlin, Berlin, Germany.* **[7]** *Clinical Psychology and Psychotherapy, Psychologische Hochschule Berlin, Berlin, Germany.* **[8]** *Medical Psychology and Medical Sociology, University of Leipzig, Leipzig, Germany.* **[9]** *LVR-Institute for Healthcare Research, Cologne, Germany.* **[10]** *Health Economics and Health Services Research, University Medical Center Hamburg-Eppendorf, Hamburg, Germany.* **[11]** *Johns Hopkins University, Baltimore, MD, USA.*

Clinical Psychology in Europe, 2021, Vol. 3(Special Issue), Article e4623, https://doi.org/10.32872/cpe.4623

Received: 2020-10-30 • **Accepted:** 2021-06-17 • **Published (VoR):** 2021-11-23

Handling Editor: Cornelia Weise, Philipps-University of Marburg, Marburg, Germany

Corresponding Author: Maria Böttche, Clinical-Psychological Intervention, Freie Universität Berlin, Habelschwerdter Allee 45, 14195 Berlin, Germany. Tel +49 30 838 58883. E-mail: maria.boettche@fu-berlin.de

Related: This article is part of the CPE Special Issue "Cultural Adaptation of Psychological Interventions", Guest Editors: Eva Heim & Cornelia Weise, Clinical Psychology in Europe, 3(Special Issue), https://doi.org/10.32872/10.32872/cpe.v3.si

Supplementary Materials: Materials [see Index of Supplementary Materials]



Abstract

Background: This study aims to provide a transparent and replicable documentation approach for the cultural adaptation of a cognitive-behavioural transdiagnostic intervention (Common Elements Treatment Approach, CETA) for Arabic-speaking refugees with common mental disorders in Germany.



This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License, CC BY 4.0, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction, provided the original work is properly cited.

Method: A mixed-methods approach was used, including literature review, interviews, expert decisions and questionnaires, in order to adapt the original CETA as well as an internet-based guided version (eCETA). The process of cultural adaptation was based on a conceptual framework and was facilitated by an adaptation monitoring form as well as guidelines which facilitate the reporting of cultural adaptation in psychological trials (RECAPT).
Results: Consistent with this form and the guidelines, the decision-making process of adaptation proved to be coherent and stringent. All specific CETA treatment components seem to be suitable for the treatment of Arabic-speaking refugees in Germany. Adaptations were made to three different elements: 1) Cultural concepts of distress: a culturally appropriate explanatory model of symptoms was added; socially accepted terms for expressing symptoms (for eCETA only) and assessing suicidal ideation were adapted; 2) Treatment components: no adaptations for theoretically/empirically based components of the intervention, two adaptations for elements used by the therapist to engage the patient or implement the intervention (nonspecific elements), seven adaptations for skills implemented during sessions (therapeutic techniques; two for eCETA only) and 3) Treatment delivery: 21 surface adaptations (10 for eCETA only), two eCETA-only adaptations regarding the format.
Conclusion: The conceptual framework and the RECAPT guidelines simplify, standardise and clarify the cultural adaptation process.

Keywords

cultural adaptation, transdiagnostic, refugees, decision-making process

Highlights

- The framework and the guidelines allow for a reproducible and systematic cultural adaptation.
- The flexible and simple format of the original CETA manual requires mainly surface adaptations.
- eCETA requires additional adaptations compared to the face-to-face version.

Arabic-speaking refugees from the MENA (Middle East and North Africa) region have constituted the largest group of refugees in Germany in recent years (Federal Office for Migration and Refugees, 2020). Epidemiological studies on the mental health of asylum seekers and refugees indicate high prevalence rates of mental disorders, especially for posttraumatic stress disorder (PTSD) and depression (Nesterko et al., 2020; Turrini et al., 2017).

Despite the need for psychological treatment among refugees, only a minority utilise specialised mental health care services. Göpffarth and Bauhoff (2017) reported that refugees in Germany have six psychotherapist contacts per 1,000 health-insured persons, compared to 20 contacts for non-refugee persons. Reasons for this treatment gap lie in structural barriers (e.g. difficult to access the health system, post-migration difficulties,

PsychOpen GOLD

regional lack of trained therapists, long waiting lists) and cohort-specific characteristics (e.g. language, fear of stigmatisation, comorbid disorders), but are also due to a general lack of psychotherapeutic treatments for culturally diverse groups (Colucci et al., 2015; Sijbrandij, 2018).

Transdiagnostic approaches seem to be especially promising for the treatment of a wide range of psychological symptoms, as they can be effectively applied for different and comorbid disorders (Newby et al., 2015; Reinholt & Krogh, 2014). A prominent evidence-based transdiagnostic approach for war-torn populations is CETA (Common Elements Treatment Approach; Murray et al., 2014, Supplement 1: modules and content). CETA has proven to be effective in reducing common mental health problems in culturally diverse settings in low- and middle-income countries (e.g. Zambia: Kane et al., 2017; Iraq: Weiss et al., 2015). It addresses symptoms of depression, anxiety, substance use and trauma-related disorders, and follows a tailored approach, i.e. element selection, sequencing and dosage vary depending on symptom presentation. CETA might also be a promising approach to reduce the treatment gap for refugees in European countries.

Additionally, an internet-based format would enable a wider reach, since it does not depend on geography (e.g. lack of trauma therapists in the local area), and communication between client and counsellor can be asynchronous. An internet-based version could also overcome the fear of stigmatisation due to the visual anonymity of the online format. As many refugees in high-income countries use the internet (Gillespie et al., 2016), internet-based interventions are easily accessible for refugee populations.

In order to tailor mental health interventions to the context and needs of diverse cultural groups, there has been an increasing focus on culture-sensitive interventions. Meta-analyses generally indicate a superiority of culturally adapted interventions for the respective target group over non-adapted interventions (Hall et al., 2016; Harper Shehadeh et al., 2016), although it should be noted that most adaptations did not follow a systematic procedure, thus limiting the ability to compare and replicate their findings.

To overcome this weakness, a conceptual framework for cultural adaptation of interventions for common mental disorders was developed (Heim & Kohrt, 2019). This framework consists of three main elements: 1) cultural concepts of distress, including cultural explanations, cultural syndromes, idioms of distress; 2) treatment components, comprising specific and unspecific elements and therapeutic techniques; and 3) treatment delivery including delivery format, surface adaptation and setting. Specific elements refer to interventions that are based on theoretical assumptions, such as behavioural or cognitive approaches; unspecific treatment elements are the common factors such as the therapeutic relationship or providing a meaningful treatment rationale; and therapeutic techniques refer to exercises and other interventions that are undertaken to transmit the therapeutic components, such as role plays or homework (Singla et al., 2017). In addition, the framework by Heim and Kohrt (2019) includes "surface adaptations", which refer to matching materials and illustrations to the target population (Resnicow et al.,

PsychOpen GOLD

1999). This framework has been extended and translated into a set of reporting criteria for the cultural adaptation of psychological interventions (Heim et al., 2021, this issue; Supplement 2).

In conclusion, some of the existing barriers to psychological treatment provision for refugees in Europe might be addressed by culturally adapted and transdiagnostic interventions with different delivery formats. Thus, the aim of the present study was to conduct a culture-sensitive adaptation of a cognitive-behavioural transdiagnostic intervention (CETA) for Arabic-speaking refugees with common mental health disorders in Germany in a transparent and replicable manner, based on the framework (Heim & Kohrt, 2019) and the guidelines of reporting cultural adaptation in psychological trials (RECAPT, Heim et al., 2021, this issue). The study focuses on the decision-making process, i.e., the process from assessing cultural concepts of distress to adapting treatment components. The adaptation was conducted both for the original face-to-face context and for an internet-based context (eCETA).

Method

Procedures and Participants

The process of cultural adaptation in this study used the RECAPT guidelines (Heim et al., 2021, this issue), and consists of six steps (details on the procedures followed and the study participants are presented in Supplement 2, RECAPT guidelines; Supplement 3, adaptation monitoring form, and Supplement 4, COnsolidated criteria for REporting Qualitative research [COREQ] checklist):

First, in a workshop with the CETA developers as well as in discussions of the research team, all interventional components (e.g. treatment components, therapeutic techniques, expressions) were identified in the treatment manual and included in the free list and key informant interviews in Step 3.

Second, a literature review was conducted regarding existing cultural concepts of distress among Arabic-speaking persons in the MENA region (e.g. idioms of distress, cultural explanations).

Third, semi-structured interviews and focus groups were conducted to discuss cultural concepts of distress and treatment components with Arabic-speaking refugees/migrants and mental health experts. Participants included i) Arabic-speaking potential users without a medical and/or psychosocial background (AU, Arabic Users; n = 20); ii) Arabic-speaking mental health professionals with a migration and refugee background (AP, Arabic Professionals; n = 11); iii) mental health experts working with refugees in different institutions in Germany (HE, Health Experts; n = 6). Additionally, two focus groups of Arabic-speaking mental health professionals (male and female) discussed inconsistent results of the interviews (FG, n = 7). The structure of the interviews and focus

PsychOpen GOLD

groups was based on Module 1 of the established Manual for Design, Implementation, Monitoring, and Evaluation of Mental Health and Psychosocial Assistance Programs for Trauma Survivors in Low Resource Countries (Applied Mental Health Research Group, 2013). The interviews were carried out on the basis of semi-structured interviews. Each type of interview contains different, non-overlapping closed and open-ended questions. In addition to the interviews, potential users (AU, n = 20) and Arabic-speaking professionals (AP, n = 11) also completed the "Barts Explanatory Model Inventory-Checklist" (BEMI-C), which assesses cultural concepts of distress (Rüdell et al., 2009).

Fourth, all adaptations and examinations were listed and summarised in a monitoring form (Supplement 3, Heim et al., 2021, this issue).

Fifth, final agreements on the adapted version were made with the help of four independent Arabic-speaking experts, who evaluated the suggested adaptations based on the aforementioned steps (Supplement 3).

Sixth, any differences between the preliminary adapted version and the experts' suggestions were discussed within the research team and a final decision was made (Supplement 3).

Data Collection

After receiving information about the study, participants signed an informed consent form prior to participating in the interviews/focus groups. All forms were provided in Arabic. The interviews (AU, AP) and the FG were conducted by Arabic-speaking trained interviewers. All interviews/FGs were audio-recorded, and the recordings were summarised and translated into German. An interview ID was assigned by the first author, who kept an encrypted digital document with the identifying keys. Basic non-identifying information about the respondents was collected (age, gender).

Interviews were conducted in Berlin and Cottbus, Germany, between December 2019 and May 2020. Final agreements (Step 6 in Procedures and Participants) were made between July and September 2020. All participants (Table 1 for more details) received an incentive for their participation (20-40 Euros). The Ethics Committee of the Freie Universität Berlin (Germany) gave approval for this study (008/2020).

Data Analysis

The data were analysed using content analysis, i.e. transcripts of the communication were evaluated and prepared for the adaptation process (Rädiker & Kuckartz, 2019) with the help of MAXQDA 2018 (VERBI Software, 2018). All responses from the AU, AP and HE interviews were listed and coded. No prior coding framework existed. A coding system was developed inductively for all three forms of interviews. Codes represented the themes provided in responses to the open-ended questions and were summarised quantitatively (e.g. 18 out of 20 AU interviewees named sport as a positive activity: sport

PsychOpen GOLD

Table 1

Sample Description of Participants of the Formative Research (Step 3)

Interviews/Focus Group	Sample size	Age in years *M* (*SD*)	Age range	Sample size	Age in years *M* (*SD*)	Age range
Free list interview (Arabic Users)						
total	20	30.10 (8.86)	23-57			
men	15	27.40 (3.94)	23-39			
women	5	38.20 (14.46)	24-57			
Key informant interview (Arabic Professionals)				**Key informant interview (Health Experts)**		
total	11	30.78 (5.36)	23-37	6	47.83 (12.81)	32-68
men	5	31.80 (5.63)	23-37	2	45.50 (12.02)	37-54
women	6	29.50 (5.51)	24-36	4	49.00 (14.83)	32-68
Focus Group I				**Focus Group II**		
men	3	28.33 (4.73)	23-32	–	–	–
women	–	–	–	4	27.75 (3.50)	24-32

Note. SD = Standard Deviation.

n = 18/20). The frequency of the answers can be interpreted as an indicator of their importance (Applied Mental Health Research Group, 2013). Each group received different questions, so the second number always indicates the interview group (*n*/20 = AU, *n*/6 = HE, *n*/11 = AP). All data were analysed at the individual level, with the exception of data from the FGs, which were analysed at the group level. Findings of the FGs aimed to complement or contrast findings from AU, AP and HE interviews. The themes that arose from the coded framework were presented to the four Arabic-speaking experts and finalised by the research team.

Quantitative data from BEMI-C were analysed using the SPSS software, version 26 (IBM Corporation, 2018).

Results

Decision-Making and Expert Reviews

For the decision-making process, the monitoring form (Supplement 3) was used. Here, all preliminary and final adaptations in the process were written down and discussed.

First, two one-day workshops of the research group (see Supplement 2) took place in Berlin, Germany, to discuss and evaluate the results of the FL and KI interviews. These results were prepared by MB (first author) and a psychology student (RE). During the workshop, the prepared results and suggestions were read by all participants (written in the monitoring form). There was either agreement with the adaptation or further suggestions were made.

PsychOpen GOLD

Second, based on the two workshops, the content of the FGs was elaborated and the first version of the adaptations from the workshops was adapted in writing in the document.

Third, based on the results of the FGs, the existing adaptations were modified and written down if necessary.

Fourth, the four Arabic-speaking experts were sent the form with all of the existing preliminary adaptations. The experts either agreed to the proposals in writing or noted changes in writing in the monitoring form. Explicit linguistic comments were also made here.

Finally, another two-day workshop of the research group took place. This was again prepared by MB and RE, who had written down the suggestions of the four experts so that the members of the research group could see the changes beforehand. During these two days, all changes in the document were discussed and voted on.

Cultural Concepts of Distress (CCD)

Three cultural adaptations of CETA were made with regard to the CCD. Two adaptations were made regarding idioms of distress. First, based on the BEMI-C (AU & AP), five idioms of distress were integrated into the introduction of CETA/eCETA (Table 2; in bold). Second, the AP interviews showed that the assessment of suicidal ideation in the component "Safety" should be carried out gradually, i.e. with the topic being introduced indirectly (n = 6/11, e.g. "Have you had thoughts that you would be better off dead or not waking up in the morning?"), followed by direct questions regarding suicidal thoughts and plans.

The description of Arabic-speaking refugees' CCD (Hassan et al., 2015), as well as the data from the HE interviews, highlighted the importance of an exploratory model of psychological symptoms. Therefore, the introduction of CETA/eCETA was expanded with a section addressing fear of becoming crazy, the relationship between body and mind, and awareness of mental health problems (HE: n = 3/6, Supplement 2).

Treatment Components (Specific and Unspecific Elements, and Therapeutic Techniques)

With regard to therapeutic treatment components, HE stated that all specific CETA components were suitable for the treatment of Arabic-speaking refugees. Therefore, all components remained in the adapted manual (Supplement 1).

The HE interviews did not result in a clear conclusion regarding the fit of the component "Problem solving", since half of the respondents assessed the content as not feasible (e.g. too cognitive, difficult to work with). Therefore, the focus groups and the research group discussed this component further during the process. Ultimately, the component

PsychOpen GOLD

Table 2

Typical Somatic and Mental Symptoms of Arabic-Speaking Refugees (Selection From BEMI-C)

	Free List Interview (AU)			Key Informant Interview (AP)		
Symptoms	**Total**	**Men**	**Women**	**Total**	**Men**	**Women**
Somatic *n* (%)						
Sleep disturbances	15 (75)	11 (73.3)	4 (80)	9 (81.8)	4 (80)	5 (83.3)
Pain/aches	17 (85)	12 (80)	5 (100)	10 (90.9)	4 (80)	6 (100)
Fatigue/tiredness	20 (100)	15 (100)	5 (100)	11 (100)	5 (100)	6 (100)
Nerves/being agitated/restless	19 (95)	14 (93.3)	5 (100)	11 (100)	5 (100)	6 (100)
Bodily weakness	16 (80)	11 (73.3)	5 (100)	9 (81.8)	4 (80)	5 (83.3)
Nausea or feeling sick	12 (60)	7 (46.7)	5 (100)	8 (72.7)	5 (100)	3 (50)
Mental *n* (%)						
Dysphoria (feeling down)	9 (45)	4 (26.7)	5 (100)	6 (54.5)	2 (40)	4 (66.7)
Feeling irritable or fed up/bored	20 (100)	15 (100)	5 (100)	7 (63.6)	3 (60)	4 (66.7)
Feeling nervous, anxious	17 (85)	13 (86.7)	4 (80)	9 (81.8)	5 (100)	4 (66.7)
Feeling frightened or fearful	17 (85)	12 (80)	5 (100)	9 (81.8)	4 (80)	5 (83.3)
Lack of concentration/forgetfulness	18 (90)	13 (86.7)	5 (100)	10 (90.9)	5 (100)	5 (83.3)
Loss of interest/ not being able to enjoy things	18 (90)	13 (86.7)	5 (100)	7 (72.7)	5 (100)	3 (50)

Note. Bold, five most prominent symptoms included in the manual.

remained in the manual, as it was considered useful to address post-migration living difficulties.

Regarding the unspecific treatment elements, two adaptations were carried out in the introductory part of CETA. First, the component “Encouraging Participation” was extended regarding the presentation of the rules of interpretation, because interpreters are of crucial importance in the face-to-face context. Second, the literature and AP interviews (n = 11/11) emphasised the importance of understanding the treatment process in order to increase compliance (e.g., patients' active role during sessions, possible destabilisation). Therefore, the analogy of “walking on a mountain path” was explicitly added to this component in CETA/eCETA (Supplement 2).

Based on discussions and practical experiences of the research group, four therapeutic techniques were excluded due to the difficulties in implementation and delivery in an adequate online format (Supplement 1). Results from the AP interviews showed that all other therapeutic techniques were suitable (Supplement 1). Due to the asynchronous communication of lay counsellor and patient in eCETA, two role plays were adapted. This therapeutic technique, which requires simultaneous interaction, was transformed into a written "letter to a friend", in which the patient addresses an imaginary friend with the same problem. Also due to the asynchronous communication, the decision was made to fix the order of the techniques in TDW-II in CETA/eCETA.

PsychOpen GOLD

Treatment Delivery (Format, Surface)

Regarding the delivery format, two changes were implemented. First, CETA is also offered in an internet-based context (eCETA). Second, the handling of self-endangering and third-party-endangering behaviour had to be adapted for eCETA, which is conducted by lay counsellors. As soon as such behaviour is detected, the communication immediately changes from asynchronous to synchronous (i.e., telephone).

The final category of adaptations refers to the surface, e.g. text, examples, and migration-, language-, and culture-related material. Arabic-speaking individuals (AU, AP) revealed that the expressions used in the manual are for the most part culturally appropriate. Four specific adaptations were made (i.e. translation of the phrases "a day in the life" and "here and now", expressions for "suicide" and "suicidal ideation and plans"). All other 17 adaptations are shown in Supplement 5).

Discussion

In this study, the transdiagnostic CETA was adapted for Arabic-speaking refugees in Germany. The cultural adaptation process followed an approach that enables a replicable and systematic documentation (Heim et al., 2021, this issue). The results showed that CETA in its original form seems to be largely culture-sensitive for this target group. Mainly surface adaptations were made, especially for eCETA due to its asynchronous communication.

Based on our formative research, the cultural adaptation of the manual comprised three main aspects: i) cultural concepts of distress in the target population (i.e. Arabic speakers from the MENA region), ii) treatment components to address post-migration living conditions, and iii) treatment delivery, i.e., the provision of an additional online version to address potential treatment barriers.

Concerning the cultural concepts of distress, all adaptations are in line with previous findings. The qualitative interviews showed that the introduction of CETA should be expanded to include an explanatory model to address cultural explanations. Thus, the relationship between physical and mental well-being is now more clearly demonstrated and explained, since the literature underlines that Arabic idioms of distress do not distinguish between somatic experiences and psychological problems (Hassan et al., 2015). Furthermore, the "fear of going crazy" (Shannon, 2014) was addressed by explaining the concept of mental disorders and psychological treatment. To assess suicidal ideation, different opinions were expressed, which tended either to assess suicidal ideation directly or indirectly. This difference was affected both by culture (e.g. suicide is a crime in some Arab countries, Hassan et al., 2015) and by legal aspects of the German health care system (suicidality must be clearly clarified). Accordingly, the adaptation comprises the

PsychOpen GOLD

gradual assessment of suicidal tendencies (i.e. starting with an indirect question, followed by a direct question).

With regard to treatment components, the results indicated that the specific CETA components as well as the unspecific elements are suitable for the current context of Arabic-speaking refugees in Germany. This is in line with a review examining the effectiveness of psychological interventions in different low- and middle-income countries (Singla et al., 2017). The specific component of "Problem Solving" was considered to be important in the discussions of the research team and in the literature (Singla et al., 2017). The difficult living conditions, in which refugees have to deal with multiple social problems (e.g. asylum process, housing), have been shown to affect refugees' mental health (Schick et al., 2018). To address these difficulties, "Problem Solving" will be offered to every patient in order to provide problem-solving skills to manage some of these existential problems.

With regard to treatment delivery, an online version of CETA was developed. Since this type of asynchronous communication requires more active patient involvement, the therapeutic tasks have to be described in more detail and include more examples. Thus, some adaptations will only be applied in eCETA. Adaptations with regard to materials mostly referred to analogies, as well as examples and translations of words or phrases. A distinction was made between linguistic adaptations (e.g. translation of the phrase "a day in the life") and adaptations based on culture and migration (e.g. typical receptacles used for alcohol, everyday situations). This is in line with other studies in the field (e.g., Shala et al., 2020).

In sum, a small number of mainly surface adaptations were required. This might be a consequence of the fact that CETA was developed particularly for culturally diverse groups, already used simple language, already had an easily understandable structure, and has been used in different countries (Murray et al., 2014). This very well thought-out structure of the original CETA provided an excellent basis for the current adaptation process.

Even though the cultural adaptation was facilitated by the existing framework, some limitations remain. First, only people from two different cities in Germany were interviewed, and most of them were from Syria. However, the interviewees were of different ages and gender, and the four Arabic-speaking experts were from different countries of origin. Second, although we did not consider the entire CETA manual for adaptation, we selected an exact choice of words to explain a technique, main parts, and all interventional components that corresponded to the framework (Heim & Kohrt, 2019). Third, the decision to use the online format with an asynchronous communication was made prior to the formative research. These decisions are based on known contextual conditions (e.g. fear of stigmatisation, difficulties in accessing the health care system). All further adjustments to the format were then again part of the formative research.

PsychOpen GOLD

The conceptual framework and the RECAPT guidelines simplify, standardise and clarify the cultural adaptation process. It can thus be summarised that adaptations do not always have to start from scratch; rather, practitioners and researchers are able to use existing material. Future research needs to compare different levels of adaptation and their impact on treatment acceptance and effectiveness. Such results might enable a balance between adaptation and the required time and financial effort.

Funding: This project has received funding from the German Federal Ministry of Education and Research (BMBF) under grant agreement No. 01EF1806A and No. 01EF1806H

Acknowledgments: We would like to thank Dr. Kristina Metz for providing us with the opportunity to gain a deep insight into CETA and to adapt the existing manual. Our sincerest thanks go to the interviewers A. Alsaod and L. Ighreiz, who did a tremendous job, as well as to the interviewees who participated and gave us constructive feedback. We would also like to thank A. Hajjir, P. Selmo, P. Nour and J. Abi Ramia for giving us their expert opinions during the final steps in the decision-making process.

Competing Interests: Eva Heim is one of the Guest Editors of this CPE Special Issue but played no editorial role in this particular article or intervened in any form in the peer review process.

Supplementary Materials

The Supplementary Materials (for access see Index of Supplementary Materials below) include detailed information about:

1. Components of CETA and decision regarding remaining, adaptation or exclusion from the adapted manual (Supplement 1)
2. Process of cultural adaptation based on the reporting criteria (RECAPT, Supplement 2)
3. Extract from the adaptation monitoring form (Supplement 3)
4. Qualitative Research Checklist (COREQ, Supplement 4)
5. Surface adaptations (Supplement 5)

Index of Supplementary Materials

Böttche, M., Kampisiou, C., Stammel, N., El-Haj-Mohamad, R., Heeke, C., Burchert, S., Heim, E., Wagner, B., Renneberg, B., Böttcher, J., Glaesmer, H., Gouzoulis-Mayfrank, E., Zielasek, J., Konnopka, A., Murray, L., & Knaevelsrud, C. (2021). *Supplementary materials to "From formative research to cultural adaptation of a face-to-face and internet-based cognitive-behavioural intervention for Arabic-speaking refugees in Germany"* [Additional information]. PsychOpen GOLD. https://doi.org/10.23668/psycharchives.5137

PsychOpen GOLD

References

Applied Mental Health Research Group. (2013). *Design, implementation, monitoring, and evaluation of mental health and psychosocial assistance programs for trauma survivors in low resource countries: A user's manual for researchers and program implementers* (Adult version). Module 1: Qualitative Assessment. Baltimore, MD, USA: Johns Hopkins University, Bloomberg School of Public Health. Retrieved from http://hopkinshumanitarianhealth.org/assets/documents/VOT_DIME_MODULE1_FINAL.PDF

Colucci, E., Minas, H., Szwarc, J., Guerra, C., & Paxton, G. (2015). In or out? Barriers and facilitators to refugee-background young people accessing mental health services. *Transcultural Psychiatry, 52*(6), 766-790. https://doi.org/10.1177/1363461515571624

Federal Office for Migration and Refugees. (2020). *Figures of asylum (08/2020).* Retrieved from https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Statistik/AsylinZahlen/aktuelle-zahlen-august-2020.pdf

Gillespie, M., Ampofo, L., Cheesman, M., Faith, B., Iliadou, E., Issa, A., Osseiran, S., & Skleparis, D. (2016). *Mapping refugee media journeys: Smartphones and social media networks* (Research report). Retrieved from http://www.open.ac.uk/ccig/sites/www.open.ac.uk.ccig/files/Mapping%20Refugee%20Media%20Journeys%2016%20May%20FIN%20MG_0.pdf

Göpffarth, D., & Bauhoff, S. (2017). Gesundheitliche Versorgung von Asylsuchenden – Untersuchungen anhand von Abrechnungsdaten der BARMER [Health care services for asylum-seekers – Evidence from claims data of the Barmer insurance plan]. In U. Repschläger, C. Schulte, & N. Osterkamp (Eds.), *Barmer GEK Gesundheitswesen aktuell 2017* (pp. 32–65). Retrieved from https://www.barmer.de/blob/133064/111932f27abc3b54594874d07a668a8a/data/dl-3-gesundheitliche-versorgung-von-asylsuchenden---untersuchungen-anhand-von-abrechnungsdaten-der-barmer.pdf

Hall, G. C. N., Ibaraki, A. Y., Huang, E. R., Marti, C. N., & Stice, E. (2016). A meta-analysis of cultural adaptations of psychological interventions. *Behavior Therapy, 47*(6), 993-1014. https://doi.org/10.1016/j.beth.2016.09.005

Harper Shehadeh, M. H., Heim, E., Chowdhary, N., Maercker, A., & Albanese, E. (2016). Cultural adaptation of minimally guided interventions for common mental disorders: A systematic review and meta-analysis. *JMIR Mental Health, 3*(3), Article e44. https://doi.org/10.2196/mental.5776

Hassan, G., Kirmayer, L. J., Mekki-Berrada, A., Quosh, C., El Chammay, R., Deville-Stoetzel, J. B., Youssef, A., Jefee-Bahloul, H., Barkeel-Oteo, A., Coutts, A., Song, S., & Ventevogel, P. (2015). *Culture, context and the mental health and psychosocial wellbeing of Syrians: A review for mental health and psychosocial support staff working with Syrians affected by armed conflict.* Geneva, Switzerland: UNHCR.

PsychOpen GOLD

Heim, E., & Kohrt, B. A. (2019). Cultural adaptation of scalable psychological interventions: A new conceptual framework. *Clinical Psychology in Europe, 1*(4), Article e37679. https://doi.org/10.32872/cpe.v1i4.37679

Heim, E., Mewes, R., Abi Ramia, J., Glaesmer, H., Hall, B., Harper Shehadeh, M., Ünlü, B., Kananian, S., Kohrt, B. A., Lechner-Meichsner, F., Lotzin, A., Moro, M. R., Radjack, R., Salamanca-Sanabria, A., Singla, D. R., Starck, A., Sturm, G., Tol, W., Weise, C., & Knaevelsrud, C. (2021). Reporting Cultural Adaptation in Psychological Trials – The RECAPT criteria. *Clinical Psychology in Europe, 3*(Special Issue), Article e6351. https://doi.org/10.32872/cpe.6351

IBM Corporation. (2018). *IBM SPSS Statistics for Windows* (Version 26.0). Armonk, NY, USA: IBM Corp.

Kane, J. C., Skavenski Van Wyk, S., Murray, S. M., Bolton, P., Melendez, F., Danielson, C. K., Chimponda, P., Munthali, S., & Murray, L. K. (2017). Testing the effectiveness of a transdiagnostic treatment approach in reducing violence and alcohol abuse among families in Zambia: Study protocol of the Violence and Alcohol Treatment (VATU) trial. *Global Mental Health, 4*, Article e18. https://doi.org/10.1017/gmh.2017.10

Murray, L. K., Dorsey, S., Haroz, E., Lee, C., Alsiary, M. M., Haydary, A., Weiss, W. M., & Bolton, P. (2014). A common elements treatment approach for adult mental health problems in low- and middle-income countries. *Cognitive and Behavioral Practice, 21*(2), 111-123. https://doi.org/10.1016/j.cbpra.2013.06.005

Nesterko, Y., Jäckle, D., Friedrich, M., Holzapfel, L., & Glaesmer, H. (2020). Prevalence of post-traumatic stress disorder, depression and somatisation in recently arrived refugees in Germany: An epidemiological study. *Epidemiology and Psychiatric Sciences, 29*, Article e40. https://doi.org/10.1017/S2045796019000325

Newby, J. M., McKinnon, A., Kuyken, W., Gilbody, S., & Dalgleish, T. (2015). Systematic review and meta-analysis of transdiagnostic psychological treatments for anxiety and depressive disorders in adulthood. *Clinical Psychology Review, 40*, 91-110. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2015.06.002

Rädiker, S., & Kuckartz, U. (2019). *Analyse qualitativer Daten mit MAXQDA: Text, Audio, and Video.* Wiesbaden, Germany: Springer VS.

Reinholt, N., & Krogh, J. (2014). Efficacy of transdiagnostic cognitive behaviour therapy for anxiety disorders: A systematic review and meta-analysis of published outcome studies. *Cognitive Behaviour Therapy, 43*(3), 171-184. https://doi.org/10.1080/16506073.2014.897367

Resnicow, K., Baranowski, T., Ahluwalia, J. S., & Braithwaite, R. L. (1999). Cultural sensitivity in public health: Defined and demystified. *Ethnicity & Disease, 9*(1), 10-21.

Rüdell, K., Bhui, K., & Priebe, S. (2009). Concept, development and application of a new mixed method assessment of cultural variations in illness perceptions: Barts Explanatory Model Inventory. *Journal of Health Psychology, 14*(2), 336-347. https://doi.org/10.1177/1359105308100218

Schick, M., Morina, N., Mistridis, P., Schnyder, U., Bryant, R. A., & Nickerson, A. (2018). Changes in post-migration living difficulties predict treatment outcome in traumatized refugees. *Frontiers in Psychiatry, 9*, Article 476. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2018.00476

PsychOpen GOLD

Shala, M., Morina, N., Burchert, S., Cerga-Pashoja, A., Knaevelsrud, C., Maercker, A., & Heim, E. (2020). Cultural adaptation of Hap-pas-Hapi, an internet and mobile-based intervention for the treatment of psychological distress among Albanian migrants in Switzerland and Germany. *Internet Interventions, 21*, Article 100339. https://doi.org/10.1016/j.invent.2020.100339

Shannon, P. J. (2014). Refugees' advice to physicians: How to ask about mental health. *Family Practice, 31*(4), 462-466. https://doi.org/10.1093/fampra/cmu017

Sijbrandij, M. (2018). Expanding the evidence: Key priorities for research on mental health interventions for refugees in high-income countries. *Epidemiology and Psychiatric Sciences, 27*(2), 105-108. https://doi.org/10.1017/S2045796017000713

Singla, D. R., Kohrt, B. A., Murray, L. K., Anand, A., Chorpita, B. F., & Patel, V. (2017). Psychological treatments for the world: Lessons from low- and middle-income countries. *Annual Review of Clinical Psychology, 13*, 149-181. https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-032816-045217

Turrini, G., Purgato, M., Ballette, F., Nosè, M., Ostuzzi, G., & Barbui, C. (2017). Common mental disorders in asylum seekers and refugees: Umbrella review of prevalence and intervention studies. *International Journal of Mental Health Systems, 11*(1), Article 51. https://doi.org/10.1186/s13033-017-0156-0

VERBI Software. (2018). *MAXQDA 2020*. Berlin, Germany: VERBI Software.

Weiss, W. M., Murray, L. K., Zangana, G. A., Mahmooth, Z., Kaysen, D., Dorsey, S., Lindgren, K., Gross, A., Murray, S. M., Bass, J. K., & Bolton, P. (2015). Community-based mental health treatments for survivors of torture and militant attacks in Southern Iraq: A randomized control trial. *BMC Psychiatry, 15*, Article 249. https://doi.org/10.1186/s12888-015-0622-7

EACLIPT

Clinical Psychology in Europe (CPE) is the official journal of the European Association of Clinical Psychology and Psychological Treatment (EACLIPT).

leibniz-psychology.org

PsychOpen GOLD is a publishing service by Leibniz Institute for Psychology (ZPID), Germany.

European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience (2021) 271:1017–1025
https://doi.org/10.1007/s00406-020-01124-z

ORIGINAL PAPER

Quality indicators for mental healthcare in the Danube region: results from a pilot feasibility study

Wolfgang Gaebel[1,2] · I. Lehmann[3] · D. Chisholm[4] · H. Hinkov[5] · C. Höschl[6] · G. Kapócs[7,12] · T. Kurimay[7,13] · D. Lecic Tosevski[8] · M. Milosavljevic[9] · V. Nakov[10] · P. Winkler[11] · J. Zielasek[3]

Received: 31 October 2019 / Accepted: 30 March 2020 / Published online: 8 April 2020
© Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature 2020

Abstract

Quality indicators are vital for monitoring the transformation of institution-based mental health services towards the provision of person-centered mental healthcare. While several mental healthcare quality indicators have been identified as relevant and valid, their actual usability and utility for routine monitoring healthcare quality over time is significantly determined by the availability and trustworthiness of the underlying data. In this feasibility study, quality indicators that have been systematically identified for use in the Danube region countries of Bulgaria, the Czech Republic, Hungary, and Serbia were measured on the basis of existing mental healthcare data in the four countries. Data were collected retrospectively by means of the best available, most standardized, trustworthy, and up-to-date data in each country. Out of 21 proposed quality indicators, 18 could be measured in Hungary, 17 could be measured in Bulgaria and in the Czech Republic, and 8 could be measured in Serbia. The results demonstrate that a majority of quality indicators can be measured in most of the countries by means of already existing data, thereby demonstrating the feasibility of quality measurement and regular quality monitoring. However, data availability and usability are scattered across countries and care sectors, which leads to variations in the quality of the quality indicators themselves. Making the planning and outputs of national mental healthcare reforms more transparent and evidence-based requires (trans-)national standardization of healthcare quality data, their routine availability and standardized assessment, and the regular reporting of quality indicators.

Keywords Quality · Mental healthcare · Quality indicator · Quality assurance · Mental healthcare reform

Introduction

Countries of the Danube region like Bulgaria, the Czech Republic, Hungary, and Serbia are aiming to transform their institution-based mental healthcare systems to more community-based systems, thereby improving and assuring quality of care [3, 4, 9, 14, 29]. In this context, quality indicators need to be applied to assess the status-quo and to monitor the development and success of the transformation and implementation processes. Healthcare system quality indicators are generally defined as "quantitative measures that can be used to monitor and evaluate the quality of important governance, management, clinical, and support functions that affect patient outcomes" (JCAHO 1989, quoted in [11], p. 524). They reflect aspects of the structures, processes, and outcomes on different healthcare hierarchy levels, including the care systems (macro-) level, the healthcare institutions (meso-) level, and the individual healthcare professionals and patients (micro-) level. Indicators can be used to benchmark quality of care, to assess the current state (as-is situation) and to establish the targeted future state of mental healthcare, and to monitor change processes [15, 17]. Topics such as deinstitutionalization, healthcare coverage and accessibility, workforce development, or anti-stigma activities are important quality domains in the transformation of mental healthcare systems in the four countries [3, 4, 9, 13, 14, 29, 30]. Accordingly, a global quality target as defined by the World Health Organization (WHO) Mental Health Action Plan is that by the year 2020, 80% of all countries

Communicated by Andrea Schmitt.

Wolfgang Gaebel and I. Lehmann have contributed equally to this work.

✉ Wolfgang Gaebel
Wolfgang.Gaebel@lvr.de

Extended author information available on the last page of the article

should be routinely collecting and reporting a set of core mental health indicators [25]. This requires a universal and agreed set of quality indicators to be developed, based on methodologically sound and thematically appropriate data sources [8, 23]. WHO's Mental Health Atlas is the most global attempt to capture a standard set of mental health care indicators across countries [27]. In Europe, quality indicators have already been developed and at least been partially implemented in some countries, such as Germany [6, 7, 10], Scotland [20], Switzerland [1], and the United Kingdom [16].

Against this background, a 2-year project lasting from April 2017 to March 2019, funded by the German Federal Ministry of Education and Research (BMBF), was conducted under the title "Development and Implementation of Quality Indicators for Mental Healthcare in the Danube Region" (DAQUMECA). The aim was to develop quality indicators for the mental healthcare systems of Bulgaria, the Czech Republic, Hungary, and Serbia, and to test these quality indicators regarding their data availability. It was focused on developing quality indicators for measuring the macro- and meso-level of healthcare. In a first project phase, international quality indicators were identified via a systematic literature search, subsequently narrowed down with reference to defined inclusion and exclusion criteria, and then rated for their validity, reliability, and feasibility in a two-stage Delphi study by a multi-disciplinary expert panel from Bulgaria, the Czech Republic, Hungary, and Serbia [15].

The ratings of the Delphi panelists ($n = 18$) in the first project phase provided a first overall impression of data availability for the quality indicators through an expert-based estimate [15]. However, actual data availability needs to be more objectively assessed in a feasibility study, where data sources are first to be identified for their availability, and then, the data-collection effort can be evaluated additionally. According to Lehmann et al. [15], the Delphi experts mostly agreed on the relevance and validity of the quality indicators. For only six indicators (QI 14, 17, 18, 19, 20, 22, Table 1), there was some uncertainty about the relevance or validity of the indicators with a tendency towards agreement. Overall, there was no disagreement on the relevance or validity of any of the quality indicators [15]. Accordingly, all identified quality indicators shown in Table 1 were tested in a feasibility study, with the exception of QI 22 relating to assisted housing, since the rating of data availability was extremely low for this QI (less than 10% of Delphi panelists expected electronic data to be available). The project consortium members, therefore, decided to not include QI 22 in the feasibility study, since they also agreed on the non-availability of data sources for this QI. Accordingly, 21 QI were evaluated for their feasibility by means of the existing databases in Bulgaria, the Czech Republic, Hungary, and Serbia.

An overview of the developed quality indicators from the first project phase is given in Table 1 [15].

Methods

The feasibility study of the 21 quality indicators focused on current data availability and data-collection effort in each country. Thus, the goal was to target data availability by sources within each country; it was not an aim to compare quality indicator results among countries, because this would have required trans-national standardized data collection.

In mental healthcare, different data sources with different levels of data standardization are available. Administrative data, which are typically used for insurance or reimbursement purposes, such as data on diagnostic and therapeutic procedures, are, in all countries, generally the most standardized and are available electronically. Routinely collected clinical data, such as documented data on adverse effects of therapeutic procedures, can be but are not necessarily standardized. They can be available electronically or in paper files. Finally, additional data, such as patient-reported data, may be collected electronically and can be used to measure quality indicators [22]. In this study, the term "routine data" is used to describe any officially and regularly documented data in the mental healthcare systems, including administrative and clinical 'routine' data.

To collect data for the present feasibility study the following potential data sources were defined:

- Overarching data sets from different care settings and sectors (= cross-sectoral routine data), e.g., data from (national) statistical offices, ministries of health, provider or patient registries, legislative texts, and policy/action plan documents
- Separate data sets from different care sectors (e.g., inpatient vs. outpatient vs. community care) (= sector-specific routine data), e.g., health insurance data
- Data generated from retrospective or prospective surveys (= data from additional data collections, either from continuous data collections or intermittent data collections), e.g., data from epidemiologic studies

Between March and August 2018, data were collected by all country partners from Bulgaria, the Czech Republic, Hungary, and Serbia in a retrospective manner. The aim was to collect the data from the best available/most trustworthy databases in each country with the latest available data. Data were summarized into data tables including the following information per quality indicator:

- Data availability (Yes/No)
- Data sources (please specify)

Table 1 Systematically developed quality indicators for Bulgaria, the Czech Republic, Hungary, and Serbia [15]

Quality indicators developed in a systematic Delphi study
QI 1 Mental health legislation
QI 2 Availability and content of a mental health action plan
QI 3 Health budget allocated to mental health services
QI 4 Total national expenditure on mental health services per capita per year
QI 5 Total beds for mental health care per 100,000 population
QI 6 Availability of mental health service facilities
QI 7 Utilization of mental health services (bipolar disorder and schizophrenia) (proportion of persons with bipolar disorder and schizophrenia who received mental health treatment)
QI 8 Utilization of mental health services (anxiety and depression) (proportion of persons with anxiety disorder and depression who received mental health treatment)
QI 9 Utilization of mental health services (dementia) (proportion of persons with dementia who received mental health treatment)
QI 10 Utilization of mental health services (alcohol-use disorder) (proportion of persons with alcohol-use disorder who received mental health treatment)
QI 11 Utilization of mental health services (substance-use disorder, other than alcohol-use) (proportion of persons with substance-use disorder who received mental health treatment)
QI 12 Utilization of mental health services (children and adolescents with intellectual disabilities) (proportion of children and adolescents with intellectual disabilities who received mental health treatment)
QI 13 Utilization of mental health services (children and adolescents with conduct disorder) (proportion of children and adolescents with conduct disorder who received mental health treatment)
QI 14 Multidisciplinary community mental health teams (proportion of mental health outpatient facilities that have multi-disciplinary community mental health teams that provide regular mental health care outside of the mental health facility)
QI 15 Follow-up of visits after mental health-related hospitalization
QI 16 Number of human resources working in or for mental health facilities per 100,000 population by profession
QI 17 Anti-stigma movement (availability of an officially/governmentally, either practically, ideationally, or financially supported anti-stigma movement per country either on a national, regional, or local levels)
QI 18 User associations and mental health policies, plans, and legislation (formal involvement of user/consumer's and carer's representatives in the formulation or implementation of mental health policies, plans, or legislation in the last 2 years)
QI 19 Equity (geographical accessibility of a. psychiatric beds and places and b. psychiatrists)
QI 20 Integration of care (existence of regulation and funding for the collaboration between different providers of mental healthcare with the goal to improve the continuity of mental healthcare for patients)
QI 21 Patient safety/involuntary inpatient admissions
QI 22 Assisted housing

- Calculation of numerator/denominator (if applicable to QI)
- Result of QI
- Calculation period
- Comments.

An interim discussion about the status of the data collection and possible obstacles took place in June 2018. After each country collected their data, the results were summarized in one table to identify similarities and differences with regard to the trustworthiness of the data sources and collected data. These topics were discussed in a structured group meeting with all project partners in March 2019. The aims of this meeting were to identify obstacles in the data-collection processes and to discuss the trustworthiness of the collected data.

Results

Table 2 shows all quality indicators and whether data were available in each country. 81–86% of the quality indicators could be measured based on the existing data sources in Bulgaria, the Czech Republic, and Hungary. Only 38% of all QI could be measured in Serbia.

Eight quality indicators (QI 1–6, QI 16, QI 19) could be measured in all four countries. Seven quality indicators (QI 8–11, QI 17, QI 18, QI 20) could be measured in three

Table 2 Data availability for QI differentiated by country

Quality indicator	B	CZ	S	H
QI 1: Mental health legislation	✓	✓	✓	✓
QI 2: Availability and content of a mental health action plan	✓	✓	✓	✓
QI 3: Health budget allocated to mental health services	✓	✓	✓	✓
QI 4: Total national expenditure on mental health services per capita per year	✓	✓	✓	✓
QI 5: Total beds for mental health care per 100,000 population	✓	✓	✓	✓
QI 6: Availability of mental health service facilities	✓	✓	✓	✓
QI 7: Utilization of mental health services (bipolar disorder and schizophrenia)	✓	✓		
QI 8: Utilization of mental health services (anxiety and depression)	✓	✓		✓
QI 9: Utilization of mental health services (dementia)	✓	✓		✓
QI 10: Utilization of mental health services (alcohol-use disorder)	✓	✓		✓
QI 11: Utilization of mental health services (substance-use disorder, other than alcohol-use)	✓	✓		✓
QI 12: Utilization of mental health services (children and adolescents with intellectual disabilities)				
QI 13: Utilization of mental health services (children and adolescents with conduct disorder)				
QI 14: Multidisciplinary community mental health teams		✓		✓
QI 15: Follow-up of visits after mental health-related hospitalization				✓
QI 16: Number of human resources working in or for mental health facilities* per 100,000 population by profession	✓	✓	✓	✓
QI 17: Anti-stigma movement	✓	✓		✓
QI 18: Involvement of user's and carer's representatives	✓	✓		✓
QI 19: Equity	✓	✓	✓	✓
QI 20: Integration of care	✓	✓		✓
QI 21: Involuntary inpatient admissions	✓			✓
Total	17 QI (81%)	17 QI (81%)	8 QI (38%)	18 QI (86%)

B Bulgaria, *CZ* Czech Republic, *H* Hungary, *S* Serbia, ✓ Data available to measure QI

countries. One quality indicator (QI 14) could only be measured in the Czech Republic and Hungary. One indicator (QI 15) could only be measured in Hungary. For the two indicators on the utilization of mental health services in children and adolescents (QI 12, QI 13), no data were available in any country.

Overall, the main data sources available to measure each quality indicator are summarized in Table 3. In some QI, multiple data sources were used to measure the numerators and denominators of the QI. For example, QI 7–QI 11 measure the number of persons with a certain diagnosed mental disorder who receive mental health treatment (numerator) in relation to all persons with the same but untreated either diagnosed or still undiagnosed (but diagnosable) mental disorder within a defined time period (denominator). The denominator was measured on the basis of (epidemiological) survey data, while the numerator was measured based on health care utilization or insurance data.

Five quality indicators could be measured with one data source (QI 1–4, QI 15). Fourteen quality indicators were measured with data from more than one data source (QI 5–11, QI 14, QI 16–21).

Most quality indicators (n = 13) were measured with routinely available data that are collected in central offices including national statistical offices, ministries of health and provider, and patient registries of persons with mental disorders or with information that can be extracted from legislative texts and policy/action plan documents (cf. Table 3). Twelve quality indicators were measured by means of health insurance data, including the quality indicators on the utilization of mental healthcare (QI 7–12). For the quality indicators on the utilization of mental healthcare also survey data that are collected in some of the participating countries either recurring or non-recurring were used (QI 7–12).

The data-collection effort was evaluated in the project meetings. The following observations were made in the participating countries:

- Routine data to measure quality indicators are not available for all quality indicators, leading to increased data-collection efforts.
- Collection from different data sources overall increased the data-collection effort.

Table 3 Main data sources per QI

QI	Main data sources (summarized)
QI 1 Mental health legislation	Legislative texts
QI 2 Availability and content of a mental health action plan	Ministries of Health
QI 3 Health budget allocated to mental health services	Statistical offices
QI 4 Total national expenditure on mental health services per capita per year	Statistical offices
QI 5 Total beds for mental health care per 100,000 population	Statistical offices, health insurance data
QI 6 Availability of mental health service facilities	Statistical offices, health insurance data
QI 7 Utilization of mental health services (bipolar disorder and schizophrenia)	Statistical offices, survey data, health insurance data
QI 8 Utilization of mental health services (anxiety and depression)	Statistical offices, survey data, health insurance data
QI 9 Utilization of mental health services (dementia)	Statistical offices, survey data, health insurance data
QI 10 Utilization of mental health services (alcohol-use disorder)	Statistical offices, survey data, health insurance data
QI 11 Utilization of mental health services (substance-use disorder, other than alcohol-use)	Statistical offices, survey data, health insurance data
QI 12 Utilization of mental health services (children and adolescents with intellectual disabilities)	–
QI 13 Utilization of mental health services (children and adolescents with conduct disorder)	–
QI 14 Multidisciplinary community mental health teams	Survey data, registries of social services
QI 15 Follow-up of visits after mental health-related hospitalization	Health insurance funds
QI 16 Number of human resources working in or for mental health facilities* per 100,000 population by profession	Health insurance funds, statistical offices
QI 17 Anti-stigma movement	Ministries of Health, national health institutes
QI 18 Involvement of user's and carer's representatives (in policies, plans and legislation)	Ministries of Health, national health institutes
QI 19 Equity (geographical accessibility)	Statistical offices, health insurance funds, national health institutes
QI 20 Integration of care	Legislative texts, policy/action plan documents
QI 21 Involuntary inpatient admissions	Registers of individual health care providers, health insurance funds, national health institutes

- Time spent on data collection varied between countries and the type of data needed. Time ranged between immediate data availability (e.g., from online published national health statistics) to a waiting time of up to 6 months before data were available (e.g., data queries for health insurance data).
- Possible prospective collection of additional data may be necessary to measure the complete quality indicator set. However, this was not feasible within this study.
- There is a shortage of epidemiologic data (including the incidence and prevalence of mental disorders) due to a lack of nationwide surveys in Hungary and Serbia. In Bulgaria, epidemiologic data are not available in open access.
- For some quality indicators, data were available, but the quality indicators' definitions should be aligned with available data to improve the validity of the measurement (i.e., the indicator measures what it intends to measure).

Both, the existence of mental health legislation (QI 1) and the existence of a mental health action plan (QI 2) form a framework, in which the requirements and strategies for high-quality person-centered mental healthcare can be further defined. Therefore, these two quality indicators are regarded as essential, and in the following, the results of each indicator are shown per country (Tables 4, 5).

For both indicators, information was extracted from legislative texts and mental health action plans.

Discussion

This pilot feasibility study provides a first overview of the feasibility of systematically developed mental health quality indicators to be used for regular quality monitoring in countries of the Danube region. Data availability is an important prerequisite in using indicators for measuring healthcare quality. The developed quality indicators mainly focus on structural—as opposed to process or outcome-based—aspects of the mental healthcare system (e.g., availability of mental health service structures, expenditures, and workforce). A survey across 18 member states of the

Table 4 Results of QI 1 mental health legislation

QI 1 Mental health legislation	B	CZ	H	S
a. A national mental health legislation* is available (Yes/No)	Yes	Yes	Yes	Yes
b. National mental health legislation explicitly includes provisions for the civil and human rights protection of persons with mental disorders (Yes/No)	Yes	Yes	Yes	Yes
c. A dedicated organization** for the inspection of compliance to quality standards exists (Yes/No)	No	Yes	No***	Yes

Data sources Bulgaria: Legislative text. Czech Republic: Legislative text. Hungary: Legislative text. Serbia: Legislative text

*Mental health legislation refers to specific legal provisions that are primarily related to mental health. These provisions typically focus on the following issues: civil and human rights protection of people with mental disorders, treatment facilities, personnel, professional training, and service structure. It can be independent legislation or integrated into a general legislation

**This organization/commission/agency may not specifically be limited to mental healthcare

***There is no dedicated organization/commission/agency for the inspection of compliance to quality standards. As the results of the WHO Atlas questionnaire [27] show, there is only a dedicated authority/independent body to assess compliance of mental health legislation with international human rights

Table 5 Results of QI 2 availability and content of a mental health action plan

QI 2 Availability and content of a mental health action plan	B	CZ	H	S
a. A mental health action plan* is available. (Yes/No)	No	Yes	No**	Yes
If yes to a.:	–	Yes	–	Yes
b. It includes actions on the following: (Yes/No) Promotion of mental health Prevention of mental disorders Treatment of persons with mental illness Rehabilitation of persons with mental illness The intent of addressing stigma and discrimination against persons with mental disorders				
c. There is dedicated funding for implementation of the mental health action plan, that is in line with the indicated resource needs (Yes/No)	–	Yes	–	No
d. If yes to c., has the funding been used to implement the mental health action plan? (Yes/No)	–	Yes	–	–

A mental health action plan is a detailed scheme for action on mental health, which usually includes setting priorities for strategies and establishing timelines and resource requirements. A mental health plan usually includes action for promoting mental health, preventing mental disorders and treating people with mental illnesses

Data sources Bulgaria: Ministry of Health. Czech Republic: Ministry of Health. Hungary: Ministry of Human Capacities, State Department of Health. Serbia: Ministry of Health

*Mental health action plan refers to an organized set of values, principles, and objectives to improve mental health and reduce the burden of mental disorders in a population **AND/OR**

**A mental health action plan has been drafted after the data collection for this indicators was closed

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) showed that availability of structural data is generally very good in mental healthcare [2]. While two countries (Bulgaria and Serbia) in our feasibility study are not OECD countries, all of the participating countries except for Serbia, which is also the only country that is not a member of the European Union, have a high data availability for the quality indicators in this study that focus on structural aspects. These indicators can be used to identify the quality of mental healthcare systems at the macro level, including the availability of legislation, mental health policies, and action plans, the level of mental health budget and expenditures on the health system and per capita, the availability of human resources for mental health, the utilization of services, and also anti-stigma activities. At the meso-level of mental health services, these quality indicators can also be used to measure important domains of service availability such as continuity of care, the number of employed workers, and the number of beds and places.

The different data sources that were used to measure the relevant data for the various quality indicators exhibit mainly the problem of fragmented information systems in parallel to fragmented healthcare systems in all four countries. Fragmented data sources are also internationally a still much more prevalent problem in mental healthcare compared to healthcare for somatic disorders [2, 12]. Data for mental healthcare processes and outcomes are even less readily available than structural data due to lacking data infrastructure [2, 12, 21]. The process indicators "QI 15 Follow-up of visits after mental health-related hospitalization" and "QI

21 Involuntary inpatient admissions", for example, are less measurable with currently existing data (Table 1).

The best available data sources include national surveys and registries as well as administrative hospital databases [2]. In general, national epidemiological surveys were available only in the Czech Republic and Bulgaria, demonstrating the need for such surveys in Hungary and Serbia. The results of the Bulgarian epidemiologic survey, however, are not accessible for external parties, other than the consortium that conducted the survey, so that they were not used in our study. All four countries were able to obtain data from national statistics offices that collect population data, which can be used for quality indicator measurement (Table 1). Administrative hospital databases were also available in each country. However, these are generally in-house data and not readily available for external parties.

The existence of mental health legislations (QI 1, Table 4) is an important prerequisite in prioritizing mental healthcare on political agendas and in the further formulation of mental health aims [24]. A mental health action plan (QI 2, Table 5) in turn specifies the strategies to reach the aims of legislation, to set priorities and establish resources and timelines. Mental health action plans, therefore, form important tools in the transformation of mental healthcare systems towards high-quality integrated care services. The results on the availability of quality indicators demonstrate that a mental health action plan is only available in two of the four countries (Czech Republic and Serbia, Table 4 and 5). The action plans in the Czech Republic and in Serbia comprise strategies and aims on the promotion of mental health, prevention, treatment, and rehabilitation of mental disorders and activities against stigma and discrimination of persons with mental disorders (Table 5) [5, 19, 14, 18, 28].

However, only the Czech mental health action plan has dedicated funding for its implementation available, and the budget has been used for this intended purpose as shown in the QI results in Table 5. The Serbian mental health action plan lacks funding and, therefore, has so far only an informative character.

Besides policy limitations and limitations due to fragmented mental healthcare provision, technical limitations form an important barrier in the overarching measurement of quality indicators in mental healthcare. Information technologies are lagging behind in mental healthcare in comparison to other fields of medicine, including a lack of electronic patient records and of routine collection and reporting of quality indicators [12].

While it is crucial to monitor mental healthcare quality, data collection needs to be meaningful and reliable, because inefficient and overwhelming demands for data collection can impede motivation and hamper the capacities for providing high-quality mental healthcare [26]. Ideally, quality indicators are linked to electronic health records that collect mental health data and are calculated based on systematic data collections [7, 12].

Therefore, as a follow-up to this quality indicator study, it is planned to develop and implement in the consortium partner countries a trans-national digital mental health platform including the quality indicators based on standardized data and also other functionalities to support the further reform process in these and other European countries. The platform should serve as an important information and navigation tool in increasing transparency of mental healthcare and in monitoring the transformation from a fragmented, hospital-based mental healthcare system towards integrated, needs-based, and people-centered mental healthcare.

The main responsibility for data collection on mental healthcare systems performance lies with each country. The comparison of universal quality indicators on an international level can be used within a benchmarking of mental healthcare performance, can support an improved international networking, and can initiate a learning from each other. For an international benchmarking, a core set of quality indicators should be used measuring important aspects of mental health system governance (legislation and policies), resources (financing and workforce), and availability (number and geographical distribution of facilities), all of which are included in our proposed quality indicator set. The WHO Mental health ATLAS [27] collects similar data that can be used as reference values for the quality indicators included in this analysis. However, the WHO ATLAS results show that data collections for quality assurance purposes still need to be improved, as the four countries incompletely report on the WHO ATLAS indicators.

Overall, there are limitations of this pilot feasibility study that need to be taken into account. First, the country-specific data-collection processes were not standardized, meaning that each country collected its most recent and most reliable data, which led to different, mostly not comparable data bases. In addition, the accessibility of data was different between countries as well as the quality of the data themselves. Therefore, results of quality indicators are mostly not comparable. However, it was possible to evaluate the feasibility of quality indicator measurements in each country, which is an important requirement in setting up a systematic quality monitoring system.

Conclusion

This feasibility study on quality indicators for the mental healthcare systems of four countries in the Danube region clearly demonstrates that the collection of a majority of quality indicators is feasible by means of available data. However, quality data for mental healthcare are scattered across

sectors, are reported from various and unconnected sources, and are of variable fidelity.

While quality indicators can serve as important measures in monitoring quality on different levels and in different domains of mental healthcare systems, besides trustful epidemiological data standardized, trans-sectoral routine data collection is needed to measure trans-national mental health quality objectively, timely, and repeatedly to monitor the development and success of mental healthcare reforms.

Acknowledgements This study was funded by the German Ministry for Education and Research (BMBF) under the title: "Development and Implementation of Quality Indicators for Mental Healthcare in the Danube Region" (DAQUMECA, project ID 01DS17020).

Conflict of interest The authors declare that they have no conflicts of interest.

References

1. ANQ-Nationaler Verein für Qualitätsentwicklung in Spitälern und Kliniken (2019) Psychiatrie. https://www.anq.ch/de/fachbereiche/psychiatrie/. Accessed 26 June 2019
2. Armesto SG, Medeiros H, Wie L. Information availability for measuring and comparing quality of mental health care across OECD countries. DELSA/ELSA/WD/HTP(2008)2. https://www.oecd.org/health/health-systems/41243838.pdf. Accessed 6 Aug 2008
3. Bitter I, Kurimay T (2012) State of psychiatry in Hungary. Int Rev Psychiatry 24(4):307–313
4. Dimova A, Rohova M, Moutafova E, Atanasova E, Koeva S, Panteli D, van Ginneken E (2012) Bulgaria: Health system review. Health Syst Transit 14(3):1–186. https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/169314/E96624.pdf. Accessed 2 July 2018
5. Dobiášová K, Tušková E, Hanušová P, Angelovská O, Ježková M (2016) The development of mental health policies in the Czech Republic and Slovak Republic since 1989. Cent Eur J Public Policy 10:35–46
6. Großimlinghaus I, Falkai P, Gaebel W, Janssen B, Reich-Erkelenz D, Wobrock T, Zielasek J (2013) Entwicklungsprozess der DGPPN-Qualitätsindikatoren. Nervenarzt 84:350–365
7. Großimlinghaus I, Falkai P, Gaebel W, Hasan A, Jänner M, Janssen B, Reich-Erkelenz D, Grüber L, Böttcher V, Wobrock T, Zielasek J (2015) Erhebung von Qualitätsindikatoren anhand von Routinedaten. Darstellung eines Machbarkeitstests in zehn Fachkliniken für Psychiatrie und Psychotherapie. Nervenarzt 86:1393–1399
8. Hermann R, Mattke S (2004) Selecting indicators for the quality of mental health care at the health systems level in OECD countries. OECD Health Technical Papers, No. 17, OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/388745076135
9. Höschl C, Winkler P, Pec O (2012) The state of psychiatry in the Czech Republic. Int Rev Psychiatry 24(4):278–285
10. IQTiG (2017) Aktualisierung und Erweiterung des QS-Verfahrens Versorgung von volljährigen Patienten und Patientinnen mit Schizophrenie, schizotypen und wahnhaften Störungen. Abschlussbericht. Stand: 22. Dezember 2017.https://iqtig.org/downloads/berichte/2017/IQTIG_QS-Verfahren-Schizophrenie_Abschlussbericht_2017-12-22.pdf. Accessed 23 June 2019
11. JCAHO-Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (1989) Characteristics of clinical indicators. Qual Rev Bull 163:6401–6406
12. Kilbourne A, Beck K, Spaeth-Rublee B, Ramanuj P, O'Brien RW, Tomoyasu N, Pincus HA (2018) Measuring and improving the quality of mental health care: a global perspective. World Psychiatry. 17:30–38
13. Krupchanka D, Winkler P (2016) State of mental healthcare systems in Eastern Europe: do we really understand what is going on? B J Psych Int 13(4):96–99
14. Lecic Tosevski D, Pejovic Milovancevic M, Popovic Deusic S (2007) Reform of mental health care in Serbia: ten steps plus one. World Psychiatry 6:115–117
15. Lehmann I, Chisholm D, Hinkov H, Höschl C, Kapócs G, Kurimay T, Lecic-Tosevski D, Nakov V, Winkler P, Réthelyi JM, Zielasek J, Gaebel W (2018) Development of quality indicators for mental healthcare in the Danube region. Psychiatr Danubina 30:197–206
16. MacDonald AJD, Fugard AJB (2015) Routine mental health outcome measurement in the UK. Int Rev Psychiatry 27(4):306–319
17. Mainz J (2003) Defining and classifying clinical indicators for quality improvement. Int J Qual Health Care 15(6):523–530
18. Ministry of Health of the Czech Republic (2013) Psychiatric care reform strategy. MHCR, Prague
19. Ministry of Health, Republic of Serbia (2007) Strategy for development of mental health care. Republic of Serbia, Ministry of Health
20. Mitchell J (2018) Mental health quality indicators: background and secondary definitions. Scottish Government. https://www.gov.scot/binaries/content/documents/govscot/publications/factsheet/2018/09/mental-health-quality-indicators-background-secondary-definitions/documents/00540532-pdf/00540532-pdf/govscot%3Adocument/00540532.pdf. Accessed 16 Oct 2019
21. Pincus HA, Hudson Scholle S, Spaeth-Rublee B, Hepner KA, Brown J (2016) Quality measures for mental health and substance use: gaps, opportunities, and challenges. Health Affairs 35:1000–1008
22. Reiter A, Fischer B, Kötting J, Geraedts M, Jäckel WH, Barlag H, Döbler K (2018) QUALIFY: instrument for the assessment of quality indicators. Version 1.0 (English). Düsseldorf, BQS gGmbH. Retrieved on 3rd August 2018. https://www.researchgate.net/publication/267256474_QUALIFY_Instrument_for_the_Assessment_of_Quality_Indicators
23. Spaeth-Rublee B, Pincus HA, Huynh PT, IIMHL Clinical Leaders Group (2010) Measuring quality of mental health care: a review of initiatives and programs in selected countries. Can J Psychiatry 55:539–548
24. WHO (1997) Quality Assurance in Mental Health Care – Checklists and Glossaries. Division of Mental Health and Prevention of Substance Abuse, 1 and 2. http://apps.who.int/iris/handle/10665/66931. Accessed 7 April 2020
25. WHO (2013) Mental Health Action Plan 2013—2020. Geneva: World Health Organization https://www.who.int/mental_health/publications/action_plan/en/. Accessed 26 June 2018
26. WHO Regional Office for Europe (2013) European Mental Health Action Plan 2013–2020. Copenhagen: World Health Organization https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/280604/WHO-Europe-Mental-Health-Acion-Plan-2013-2020.pdf. Accessed 3 Jan 2018
27. WHO (2018) Mental Health Atlas 2017. https://www.who.int/mental_health/evidence/atlas/mental_health_atlas_2017/en/. Accessed 20 June 2018
28. Winkler P, Koeser L, Kondrátová L, Broulíková HM, Páv M, Kališová L et al (2018) Cost-effectiveness of care for people with psychosis in the community and psychiatric hospitals in

the Czech Republic: an economic analysis. Lancet Psychiatry 5(12):1023–1031
29. Winkler P, Krupchanka D, Roberts T, Kondratova L, Machů V, Höschl C, Sartorius N, Van Voren R, Aizberg O, Bitter I, Cerga-Pashoja A (2017) A blind spot on the global mental health map: a scoping review of 25 years' development of mental health care for people with severe mental illnesses in central and eastern Europe. Lancet Psychiatry 4(8):634–642
30. Winkler P, Mladá K, Krupchanka D, Agius M, Ray MK, Höschl C (2016) Long-term hospitalizations for schizophrenia in the Czech Republic 1998–2012. Schizophr Res 175(1–3):180–185

Affiliations

Wolfgang Gaebel[1,2] · I. Lehmann[3] · D. Chisholm[4] · H. Hinkov[5] · C. Höschl[6] · G. Kapócs[7,12] · T. Kurimay[7,13] · D. Lecic Tosevski[8] · M. Milosavljevic[9] · V. Nakov[10] · P. Winkler[11] · J. Zielasek[3]

1 Department of Psychiatry and Psychotherapy, Medical Faculty, LVR-Klinikum Düsseldorf, Heinrich-Heine-University, Bergische Landstraße 2, 40629 Düsseldorf, Germany

2 WHO Collaborating Centre on Quality Assurance and Empowerment in Mental Health, Düsseldorf, Germany

3 LVR-Institute for Healthcare Research, Cologne, Germany

4 WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, Denmark

5 NCPHA-National Center of Public Health and Analyses, Sofia, Bulgaria

6 National Institute of Mental Health, Klecany, Czech Republic

7 Department of Psychiatry and Psychiatric Rehabilitation, Buda Family Centred Mental Health Centre, Teaching Department of Semmelweis University, Saint John Hospital, Budapest, Hungary

8 Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade, Serbia

9 Institute of Mental Health, School of Medicine, University of Belgrade, Belgrade, Serbia

10 Mental Health, National Center of Mental Health and Analyses, Sofia, Bulgaria

11 Department of Social Psychiatry, National Institute of Mental Health, Klecany, Czech Republic

12 Institute for Behavioral Sciences, Semmelweis University, Budapest, Hungary

13 Department of Psychiatry and Psychotherapy, Semmelweis University, Budapest, Hungary

European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience
https://doi.org/10.1007/s00406-020-01133-y

ORIGINAL PAPER

Upscaling e-mental health in Europe: a six-country qualitative analysis and policy recommendations from the eMEN project

Wolfgang Gaebel[1,2,3] · R. Lukies[3] · A. Kerst[1,2] · J. Stricker[1,2] · J. Zielasek[3] · S. Diekmann[3] · N. Trost[3] · E. Gouzoulis-Mayfrank[3] · B. Bonroy[4] · K. Cullen[5] · K. Desie[6] · A. P. Ewalds Mulliez[7] · G. Gerlinger[9] · K. Günther[9] · H. J. Hiemstra[10] · S. McDaid[5] · C. Murphy[8] · J. Sander[9] · D. Sebbane[7,10] · J. L. Roelandt[7,10] · L. Thorpe[8] · D. Topolska[5] · E. Van Assche[4] · T. Van Daele[4] · L. Van den Broeck[6] · C. Versluis[11] · O. Vlijter[11]

Received: 17 January 2020 / Accepted: 27 April 2020
© Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature 2020

Abstract

E-mental health (eMH) encompasses the use of digital technologies to deliver, support, or enhance mental health services. Despite the growing evidence for the effectiveness of eMH interventions, the process of implementation of eMH solutions in healthcare remains slow throughout Europe. To address this issue, the e-Mental Health Innovation and Transnational Implementation Platform North-West Europe (eMEN) project was initiated to increase the dissemination and quality of eMH services in Europe. In this project, status analyses regarding eMH in the six participating countries (i.e., Belgium, France, Germany, Ireland, The Netherlands, and the UK) were conducted and eight recommendations for eMH were developed. Expert teams from the six participating countries conducted status analyses regarding the uptake of eMH based on a narrative literature review and stakeholder interviews. Based on these status analyses, the eMEN consortium developed eight policy recommendations to further support the implementation of eMH in Europe. The status analyses showed that the participating countries are in different stages of implementing eMH into mental healthcare. Some barriers to implementing eMH were common among countries (e.g., a limited legal and regulatory framework), while others were country-specific (e.g., fragmented, federal policies). The policy recommendations included fostering awareness, creating strong political commitment, and setting reliable standards related to ethics and data security. The eMEN project has provided the initial recommendations to guide political and regulatory processes regarding eMH. Further research is needed to establish well-tailored implementation strategies and to assess the generalizability of the recommendations beyond the countries involved in the eMEN project.

Keywords e-Mental health · eMH · Mental health · Policy · Upscaling · Implementation

Communicated by Andrea Schmitt.

Electronic supplementary material The online version of this article (https://doi.org/10.1007/s00406-020-01133-y) contains supplementary material, which is available to authorized users.

✉ Wolfgang Gaebel
wolfgang.gaebel@uni-duesseldorf.de

[1] Department of Psychiatry, Medical Faculty, LVR-Klinikum Düsseldorf, Heinrich-Heine-University, Bergische Landstr. 2, 40629 Düsseldorf, Germany

[2] WHO Collaborating Centre for Quality Assurance and Empowerment in Mental Health, Düsseldorf, Germany

[3] LVR-Institute for Healthcare Research, Cologne, Germany

[4] Thomas More University of Applied Sciences, Geel, Belgium

[5] Mental Health Reform, Dublin, Ireland

[6] Pulso Europe, Leuven, Belgium

[7] WHO Collaborating Centre for Research and Training in Mental Health-EPSM Lille-Métropole, Lille, France

[8] Mental Health Foundation, London, UK

[9] German Association for Psychiatry, Psychotherapy and Psychosomatics e.V. (DGPPN), Berlin, Germany

[10] Inserm, Clinical Epidemiology and Economic Evaluation Applied to Vulnerable Populations (ECEVE), Paris Diderot University, Paris, France

[11] Stichting Arq, Diemen, The Netherlands

Published online: 11 May 2020

Introduction

Mental disorders are the largest contributor to chronic disability and the third largest cause of disease burden, measured in disability-adjusted life years [1]. In the European Union, 17.3% of the adult population is estimated to experience a mental disorder each year [2]. The field of e-mental health (eMH) promises options of accessible, high quality, and affordable mental health care in connection with existing mental healthcare services [3–6]. However, thus far, general and country-specific legal and administrative barriers limit the upscaling of eMH in Europe. Thus, the e-Mental Health Innovation and Transnational Implementation Platform North-West Europe (eMEN) aimed to develop recommendations for the implementation of eMH services in Europe based on status analyses in six European countries.

Mental health in Europe

Mental health is a vital component of overall health. Mental health describes a state of well-being, in which an individual is able to lead a happy and fulfilling life, to cope with every-day stress, and to work productively [2, 7]. Mental ill-health, in turn, is defined as a disturbance of an individual`s mental well-being and is often marked by a combination of disturbed thoughts, emotions, or behavior [1]. Mental ill-health has mild forms, such as mild psychological distress, or severe states reaching the clinical threshold of a mental disorder [2]. Mental illness is associated with a negative impact on physical health, life expectancy, educational achievement, employment, and health risk behaviors [1, 2]. Although governments throughout Europe have acknowledged the burden of mental illness and have proposed action to reduce the prevalence of mental disorders [2], the long-term burden of mental disorders is expected to increase [8]. In 2015, the total cost of direct and indirect expenditures related to mental ill-health was estimated to exceed 4% of the European Union's gross domestic product [2].

e-Mental health (eMH)

There is a need for innovative and cost-effective solutions in mental healthcare because of a growing demand and limited resources in more traditional mental healthcare systems. eMH encompasses the use of digital technologies to deliver, support, or enhance mental health services [9]. Riper et al. define eMH as "a generic term to describe the use of information and communication technology (ICT)—in particular the many technologies related to the Internet—when these technologies are used to support and improve mental health conditions and mental health care, including care for people with substance use and comorbid disorders. E-mental health encompasses the use of digital technologies and new media for the delivery of screening, health promotion, prevention, early intervention, treatment, or relapse prevention as well as for improvement of health care delivery (e.g., electronic patient files), professional education (e-learning), and online research in the field of mental health" [10]. Research on these interventions is expanding and there is promising evidence for their use in mental health care [11–13].

The eMEN project

Despite the growing evidence for the effectiveness of eMH interventions for those affected by mental disorders, the process of implementation and dissemination of eMH solutions in healthcare remains slow throughout Europe. To address this issue, the eMEN project was initiated as a six-country project in 2016, funded by the European Regional Development Fund within the funding area Interreg North-West Europe [14]. The project aimed to increase the dissemination and quality of eMH services. As part of the project's activities, a transnational policy with recommendations for upscaling eMH throughout the European Union and beyond has been created. The transnational policy maps out barriers and facilitators for the implementation of eMH, and proposes actions for EU policymakers and other eMH stakeholders. The following organizations from the six participating countries are members of the eMEN consortium: Arq Foundation (The Netherlands), German Association for Psychiatry, Psychotherapy and Psychosomatics (DGPPN, Germany)—German Alliance on Mental Health (ABSG, Germany), Interapy Nederland (The Netherlands), LVR (Rhineland State Council)—Institute for Healthcare Research (LVR-IVF, Germany), EPSM Lille Métropole—World Health Organization Collaborating Center for Research and Training in Mental Health (WHOCC, France), Mental Health Foundation (United Kingdom), Mental Health Reform (Ireland), Pulso Europe (Belgium), Thomas More University of Applied Sciences (Belgium), and VU University Amsterdam (The Netherlands).

The objective of this manuscript is to present the results of a transnational and multi-method study on the status quo of eMH implementation and dissemination in six countries of North-West Europe (Belgium, France, Germany, Ireland, The Netherlands, and the United Kingdom). Additionally, we present eight policy recommendations for a wider roll-out of eMH throughout Europe, which were developed within the eMEN project.

Methods

Status analysis of eMH in six European countries

The status analyses were conducted separately for each country by expert teams from the respective partner country in the eMEN project. The expert teams included psychotherapists, clinical psychologists, researchers in the field of clinical psychology, healthcare, and biomedical engineering, eMH consultants, and developers of online mental health tools. The composition of the expert teams differed between the participating countries. In the first step, all expert teams conducted a narrative literature review on eMH for their respective country. Current methodological guidelines recommend a narrative literature review rather than a systematic literature review when the relevant studies used diverse methodologies or when the topic of the literature review is broad in scope [15, 16]. As eMH covers a wide range of interventions that have been investigated in various different research designs, narrative literature searches were conducted that account for specificities of the participating countries.

There was a common framework for the status analyses including a narrative literature review and qualitative stakeholder interviews. The detailed search strategy for the narrative literature review differed to some extent between countries (e.g., due to the need to include country-specific databases). The following documents were included: scientific studies, policy solutions, public documents, national and regional policy agendas, legislation, and opinion papers concerning eMH. Documents published from January 2006 in English, Dutch, French, or German were included. Each expert group continuously developed and translated a set of keywords for their respective status analysis. These keywords indicated the type of literature (e.g., "clinical trial", "policy", or "legislation") combined with terms used for eMH (e.g., "e-health", "eMental Health"). The literature search was carried out between February and June 2017 with continuous updates until November 2019. The initial search until June 2017 yielded 172 relevant results, of which 103 were considered for the analyses. Online Appendix A provides a detailed overview of the literature search processes in the participating countries.

In addition to the narrative literature review, 52 expert interviews were conducted between April 2017 and May 2019. Table 1 provides an overview of the characteristics of the interviewed stakeholders. The first step in the sampling process was to define stakeholder groups that could provide relevant information. Science, politics, small-to-medium enterprises (SMEs), care providers, and patients were identified as relevant groups. For each stakeholder group, we selected a wide range of potential interview partners, considering a broad spectrum of knowledge, experience, and viewpoints. Interview participants were recruited via the partner organizations of the eMEN project. The partner organizations largely approached their already existing contacts. Selected contacts received an official invitation letter via e-mail (see Online Appendix B). Identified stakeholders who positively replied to the organizations' consultation were invited to the stakeholder interviews. At least five interviews were conducted in each country. The experts were national and regional health and mental health policy makers, representatives of EU eMH projects, social workers, nurses, patients associated with eMH, representatives of SMEs in the field of eMH, members of professional associations, representatives of mental health treatment centers, and interest groups in that field (see Table 1). We used semi-structured guideline-based interviews to investigate the interviewees' perspectives. Online Appendix C displays the semi-structured guideline for the stakeholder interviews

Table 1 Characteristics of interviewed stakeholder groups ($n = 52$)

	Belgium	France	Ireland	Germany	The Netherlands	United Kingdom	Overall
Health professionals	2		3	4	2		11
Service providers					4		4
Individuals who have experienced mental health problems	1		1				2
Patients associations/organizations	2	1					3
Health care policy makers							
National	2			1	2	2	7
Regional	1	1					2
Research				1	2	2	5
Small and medium enterprises	2	2		3	3	1	11
Others		1	1	1	3	1	7
Overall	10	5	5	10	16	6	52

including guidance on interview preparation, equipment, introduction, closing remarks, and transcription. The interviews were conducted either face-to-face or via telephone and were recorded and transcribed. The transcriptions built the basis for further content mapping. The national expert teams additionally summarized the content of each interview in a standardized template (see Online Appendix D).

The national expert teams conducted a content analysis of the stakeholder interviews and the information collected in the narrative literature reviews to identify the most relevant aspects for eMH implementation. This analysis was based on Mayring's guide on qualitative content analysis [17] and Schmidt's guide on analyses of guideline-based interviews [18].

For the narrative literature review, each national expert team used an excel template to map relevant information from the literature (see Online Appendix E). The template was divided according to the type of literature into scientific, policy, or grey literature. Bibliography data, type of evidence, a summary of the content, and its relevance for the eMEN project were reported within this template. Based on the collected information, thematic categories were built. These were continuously adapted according to the information retrieved from the literature. Aside from that, references to international theoretical frameworks or policies, relevant policies, legislations, initiatives, or projects were extracted and listed.

Regarding the reports of the qualitative interviews, an initial deductive analysis, which involved the identification and grouping of similar data into a coding scheme, was performed. Identified key topics and categories were verified by the categories identified through the narrative literature review. A second inductive analysis followed, which used iterative readings to validate the coding scheme. The coding scheme and categories were adapted if necessary. For example, too specific categories were removed and added to a similar category; and categories that were missing were added (inductive construction).

Based on the final coding scheme, all interviews were recoded using the adapted coding scheme by one member of the investigative team. In addition, joint coding and analysis sessions involving other investigators were conducted to ensure the high quality of coding. The final thematic categories identified were: policy situation and regulations, awareness and attitudes, education and training, privacy and data protection, implementation in practice, development process, and concrete suggestions. We used the results from the narrative literature review and the stakeholder interviews to describe the status of eMH in the participating countries and summarized findings regarding the legal situation and potential barriers and facilitators. The eMEN project followed the principles of the World Medical Association's Declaration of Helsinki. Participants provided their informed consent prior to the interviews (see Online Appendix F for the consent form).

Development of recommendations for the dissemination and implementation of eMH in Europe

In a series of meetings involving the expert groups from all participating countries, the eMEN consortium developed a set of eight recommendations for the dissemination and implementation of eMH in Europe. The potential barriers and facilitators identified in the narrative literature review and the stakeholder interviews formed the basis for the development of recommendations for European policy makers and stakeholders. All eMEN project partners jointly agreed upon all recommendations.

Results

In the following paragraphs we present the combined results of the narrative literature review and the stakeholder interviews for each country. The status analyses integrated information gathered from the literature search and the stakeholder interviews to provide a holistic picture of the eMH implementation in the respective countries. Information on the policy situation and regulations as well as privacy and data protection were summarized under "legal aspects of eMH implementation". Information on awareness and attitudes, education and training, implementation in practice, and the development process of eMH products were summarized under "barriers and facilitators".

Status analyses

Belgium

Legal situation eMH in Belgium is currently underrepresented at policy and practice levels, but awareness is increasing among policy makers. At the national level, a general policy paper on mobile health care was developed in 2014 and action plans on e-health for the years 2013–2018 and 2019–2021 have been published, which dedicate one section specifically to mobile health [19, 20]. As part of the first action plan, the federal government has started 24 pilot projects in 2017 to evaluate e-health services. Their goals are the development of a validation process for health applications as well as a juridical framework and reimbursement model for e-health [21]. At the regional level, the Flemish Action Plan Mental Health, and ten policy actions introduced to the Flanders' Care Congress for Welfare and Public Health have been developed by the Flemish Minister of Wellbeing and Health in 2015 and 2016 [22, 23]. All of

these policies, however, focus more on e-health in general than on eMH. Yet, an increasing number of projects concerning eMH is currently evolving.

A lack of regulations and a complex state structure are partly responsible for the slow implementation of eMH into routine care. As communities and regions hold their own juridical responsibilities and as Belgium has three different official languages, legislation processes are slow and no overall concept for the implementation exists. No general system for the reimbursement of eMH services has yet been established. This might, however, start to change with the recognition of clinical psychologists as a health profession in 2016 and with the start of a pilot project in autumn 2018 to reimburse their services as a standard part of Belgian mental health care [24, 25]. It remains to be seen whether these measures will be sufficient to accelerate the dissemination of eMH.

Barriers and facilitators Many health professionals mentioned lacking awareness of eMH solutions as a main implementation barrier. Furthermore, in addition to organizational difficulties, outdated Internet technology systems, and a lack of technical competencies, few options for training and education are available. The fear of being replaced also hinders the implementation of eMH. From a patient perspective, lacking knowledge and the fear of eMH services being impersonal and non-transparent are important reasons for the slow uptake of eMH. Active campaigning to inform public and health professionals about eMH services and promote their application is, therefore, seen as a tool to facilitate the acceptance of eMH.

Concerns about privacy and data protection additionally limit the implementation of eMH solutions. On one hand, regulations for access to data are either missing or not sufficiently defined, which leads to insecurities of users. On the other hand, outdated restrictions, e.g., for data storage, sharing of data, or the informed consent forms for research participants, keep developers from starting new projects. The EU General Data Protection Regulation, which has been applied since 2018 and provides updated guidance for secure data handling, is hence perceived as a tool to strengthen the uptake of eMH. In summary, a more supportive regulatory framework is needed to enable developers to work on suitable eMH solutions and to allow implementation into routine care. Additionally, active promotion might raise awareness and acceptance of health professionals and patients.

France

Legal situation Interest in e-health and eMH solutions is currently rising in France. In 2016, the first national e-health strategy was released by the government, which has the general scope to implement more digital resources into health care by the year 2020 [26]. Furthermore, a roadmap for mental health and psychiatry has been presented in 2018, which specifically includes the action 'mental health promotion 3.0′ on e-mental health by proposing the organization of educational seminars, exchange of knowledge and practices across Europe, and fostering further research [27]. The national health strategy *Ma santé 2022,* also published in 2018, plans to enable every patient to have digital access to their medical records and other services, such as online appointments or education and prevention tools [28]. The roadmap *Accelerating the Digital Shift* included in this strategy, equips France with a strategic vision. It articulates orientations towards strengthening digital governance in health, enhancing the security and interoperability of health information systems, accelerating the deployment of digital services, deploying digital health platforms at a national level, stimulating innovation, and fostering stakeholder engagement [29].

In 2018 as well, telemedicine became part of the common law of medical practice and one of its components, teleconsultation, is now reimbursed. Considering the context of the digital transformation in health, a ministerial working group was created on the theme of mental health 3.0 to anticipate this transformation in the mental health field.

More recently, at the end of 2019, the Minister of Health officially appointed a ministerial delegate for digital health, which continues to give concrete expression to the development of e-health in France.

Barriers and facilitators Implementation of eMH solutions in routine care is still slow-paced. From health professionals' perspective, conservative attitudes towards eMH are perceived as an important implementation barrier. These attitudes are often based on a few opportunities for training, organizational constraints, and the fear of losing relevance. On both the professionals' as well as patients' side, the awareness of existing services is lacking and concerns about data protection limit the use of eMH solutions. From the developers' perspective, development costs are relatively high and development ideas are often not financially viable. The market is unstable, since the development of eMH services is often not integrated into global business models. Additionally, legislative regulations for developers are often very restrictive and difficult to follow. To facilitate the dissemination of eMH services, health experts suggest the development of economic models and quality certification systems. Additionally, users may need to be involved in the development process to tailor eMH services to their needs and to increase their acceptability.

Germany

Legal situation Topics concerning e-health and eMH are met with increasing interest by policymakers in Germany. In 2015, a first law on e-health was approved, focusing on

the development of a digital infrastructure for health care providers and the introduction of an electronic health insurance card [30]. A further step was taken in 2018, when the Assembly of the German Medical Association as well as the Assembly of the Federal Chamber of Psychotherapists both decided to change their professional codes to permit physicians and therapists the use of remote consultations in routine care [31, 32]. Additionally, the reimbursement of video consultations irrespective of the indication was enabled in 2018 [33]. In November 2019, the Digital Health Care Act was approved by the federal parliament, which enables, among other things, the prescription of medical apps [34]. All of these laws address the uptake of e-health in Germany; however, no specific focus on eMH has been set. To accelerate the development, evaluation, and implementation of new solutions in health care, the Federal Government has created the German Innovation Fund [35]. Among other research programs, it also supports several projects in the field of eMH.

Barriers and facilitators The slow uptake of eMH may partly be due to low awareness and acceptance. Whereas professional organizations, like health insurances, mostly show a positive attitude and have implemented eMH solutions into their programs, health professionals often fear a devaluation of their profession or an increasing work load. Awareness of the general population about eMH services is currently still low. Professionals as well as patients fear that the use of eMH services will be too impersonal, especially in psychotherapy, where the human relationship is a key component. Privacy is also a topic of high concern within the population and among professionals. As long as there is a perceived uncertainty regarding data storage and protection, acceptance of eMH solutions will most likely remain low. Some of these concerns might be addressed with training and the provision of information materials. Awareness and informed decision-making are necessary to accelerate the implementation of eMH solutions. Additionally, a consistent digital infrastructure throughout health care institutions needs to be established first and liability issues should be clarified. Some of these barriers might be overcome with the Digital Health Care Act.

Ireland

Legal situation Ireland shows a strong interest in eMH solutions at policy and practice levels. In 2013, the Irish e-Health Strategy was published, which proposes a roadmap for the implementation of digital solutions into the Irish health care system and mentions mental health as one field in which digital services might be introduced [36]. Ireland's overall mental health strategy is currently based on *A Vision for Change*, which was published in 2006, and is currently being revised to cover current developments [37]. The 2006 version does not address the use of eMH. In 2015, a good practice guide on *Technology, Mental Health and Suicide Prevention in Ireland* was released by the non-profit organization ReachOut Ireland with the support of the Irish Health Service's (HSE) National Office for Suicide Prevention [38]. For children and young people, the implementation of age-appropriate eMH solutions into service provision was more recently, in 2017, recommended in a report by the Youth Mental Health Taskforce [39]. In 2017, the Irish Association for Counselling and Psychotherapy published a guideline on online counselling, even though it focuses more on remote counselling rather than eMH solutions for therapy [40]. A 2018 report funded by Mental Health Reform and the HSE provides an overview of the field of eMH in Ireland and suggests actions for its implementation in mainstream mental health services [41]. Overall, the HSE and adjacent non-governmental health organizations express a positive attitude towards eMH and a number of projects for products and services are currently under development.

Barriers and facilitators Deployment of eMH products in mainstream mental health services is still lacking. Individuals with mental health problems and health professionals interviewed in this study expressed the concern that while eMH products improve access to therapy, the human relationship is essential in psychotherapy and cannot be replaced. eMH solutions are, therefore, viewed as a good supplement to cognitive behavioral therapy or as a tool for prevention. Furthermore, on the health professionals' side, limited digital literacy, as well as missing guidance were perceived as barriers to implementation. More opportunities for training were, therefore, suggested for the uptake of eMH. Other concerns involved confidentiality and privacy issues, and the lack of standards and suitable certification systems to ensure high-quality eMH products. To accelerate eMH implementation, the interviewees recommended more transparent visibility, e.g., on social media and websites, but also in local settings like schools, more investment, and a demand-oriented approach.

The Netherlands

Legal situation Within the EU countries, The Netherlands is one of the early starters regarding the dissemination of eMH solutions. Research and development started at the end of the 1990s. In the beginning, the market developed in a rather fragmented way. In 2012, the *National Implementation Agenda e-health* was started, in which patient associations collaborate with general practitioners and health insurance providers to develop a systematic approach to implement e-health into routine care [42]. The Ministry of Health, Welfare and Sports announced the encouragement of e-health use in 2014 and set the goals to improve access to medical records, enable health

monitoring and online contact with care providers until the end of 2019 [43]. In 2017, a €105 million government-funded program, the *Acceleration programme information exchange patient and professional* (VIPP), was started to implement consistent standards for information exchange and to introduce value-based e-health and eMH throughout health care providing organizations [44, 45]. Since 2013, the National Competence Centre for e-health also publishes an annual report on the current state of e-health care in The Netherlands. The report of 2017 specifically mentions the field of eMH. Accordingly, most mental health nurse practitioners have used eMH products for some of their patients. A common opinion, however, is that eMH products do not suit all patients, since available options do not always match with the educational level or digital skills of patients [46]. Another report by the Dutch Health Care Authority on general mental health care from 2017 noticed that waiting lists for mental health treatments were long and that treatment of patients had shifted from specialized level to basic level (GP level) [47]. As a result, an action plan was developed by the Ministry of Health, health care insurers, caregivers, and local authorities. This action plan mentions, for example, thorough screening as an action to prevent unnecessary treatment and, therefore, to reduce waiting lists. The use of eMH at the level of general practice is now widespread and structurally integrated in treatment approaches. From 2022, a new activity-based model and reimbursement system for mental health care will be introduced in The Netherlands. The reimbursement system based on the currently used DBC (Diagnostic Treatment Combination) will be modified and will force service providers to fully and effectively integrate eMH into their mental health care pathways.

Barriers and facilitators Despite The Netherlands being more advanced compared to other European countries, some barriers to the broad implementation of eMH in routine care still remain. Health experts interviewed in this study mostly mentioned that the current reimbursement structure is hindering implementation. As mentioned before, a new reimbursement system is, however, planned for 2022. Furthermore, the added value of eMH solutions for the end-user is unclear to many interviewees and no urgency for change is seen. The topic of eMH is also not thoroughly taught in higher education curricula. Research was perceived as often lacking continuity or requiring too much time. Privacy issues are also of concern. Perceived facilitators are government guidance, for example by setting specific goals for eMH use, establishing quality and privacy standards, or by providing a platform for information sharing between researchers and developers.

United Kingdom

Legal situation Matters of health care in the United Kingdom are the responsibility of the parliaments and assemblies of its member countries: England, Northern Ireland, Scotland, and Wales. Every country therefore pursues differing policies and funding priorities.

In England, mental health care strategies have strongly targeted eMH solutions. In 2014, the National Information Board recommended within its framework for action to place digital solutions at the heart of mental health approaches [48]. The *Mental Health Five Year Forward View* in 2016 committed to expanding access to eMH services and to investing in digital infrastructure [49]. The *Framework of Mental Health Research* by the Department of Health also highlighted the opportunities of digital approaches to mental health and suggested the expansion of digital data use in mental health research [50]. Furthermore, NHS England supports digitally advanced mental health trusts to become *Global Digital Exemplars* [51]. These exemplars are already advanced in their implementation of digital technologies and agree to share their knowledge with the other trusts. Furthermore, web apps and smartphone apps for depression, anxiety, or stress are publicly available through the NHS Apps Library [52]. This all has led to an acceleration of eMH use in England, with two out of three general practitioners now already using eMH solutions for the treatment of depression [53].

Meanwhile, Northern Ireland's approach on e-health within its overall health strategy is rather minimal and focuses mostly on electronic patient records [54]. A report by Invest Northern Ireland mentions health care as one area of opportunity for digitalization, but no reference to mental health has been made [55]. An expert panel, which was set up to underpin the reconfiguration of health and social care services, underlined the importance of expansion of e-health to efficiently drive health care [56].

Scotland's overall health strategy released in 2016 recognizes the role of computerized cognitive behavioral therapy (cCBT) services for improving access to mental health support and aimed to roll out services nationally by 2018 [57]. However, Scotland's mental health strategy mentions digital approaches to mental health care only superficially, besides one specific goal to support the development of a digital tool for young people with eating disorders [58]. A digital health and care strategy has been released in 2018; however, no specific remark on eMH has been made [59].

In Wales, approaches for the implementation of eMH services currently play a minor role within the Welsh Assembly. The *Mental Health Delivery Plan* published in 2016 only includes education in digital rights for children [60]. The Welsh *Plan for Health and Social Care* aims at building a digital national architecture for health care from 2018

onwards; however, it does not make reference to eMH services specifically [61].

For all of the UK, *Thriving at Work: the Stevenson/Farmer review* published a total of 40 recommendations on how to support employees in need of mental health care. Among others, the report emphasized the role of digital tools and products as an opportunity for support [62]. The Government in England has accepted these recommendations, the Health and Safety Executive announced a revision of its stress guidance to address more mental health issues [63].

Barriers and facilitators Even though the four countries are differently advanced in their implementation of eMH services, some common barriers exist in all the UK countries. The health experts interviewed in this study identified the lack of knowledge about the availability and efficiency of eMH products, the lack of guidance for implementation, and communication issues between developers and service providers and service users as the most imminent barriers. Furthermore, for Wales, privacy issues, lack of technology infrastructure, and lack of budget for Welsh-language versions to give equal access for all members of the population add to the list of barriers. Northern Ireland is specifically hampered by the ongoing suspension of its Assembly, since January 2017, which has led to a lack of leadership, with responsibility for the government during this time lying with the parliament in Westminster. The interviewees recommended coproduction between developers, clinicians, and service users to create bottom-up designs and ongoing communication between researchers and providers as accelerators for the implementation of eMH. Additionally, ensuring that eMH is considered not only in mental health, but also in general health policies as well as in wider, cross-government policies (the *Mental Health in All Policies* approach) will further help the development of eMH in the UK.

Recommendations for the implementation and dissemination of eMH in Europe

To address the most relevant barriers for the implementation and dissemination of eMH in Europe, the eMEN consortium developed eight recommendations based on the status analyses in the six participating countries. These recommendations are directed towards policymakers at EU and at national level. More specific actions based on the recommendations are suggested to the European Commission and other politically involved parties at the national level [64]. The recommendations are as follows:

1. Promote and advocate strong political commitment, governance, and leadership for the development, dissemination, implementation, and adoption of eMH.
2. Ensure legal clarity and ethical correctness, and avoid insecurities in users with regard to the safeguarding of human rights, privacy, and data security in the digital age.
3. Develop adequate financing strategies and guarantee the financial viability of eMH in the long term.
4. Stimulate, promote, and fund eMH research within existing and future European research programs (e.g., Horizon Europe) and specifically focus on effectiveness, evaluation methods, and eMH implementation.
5. Promote and facilitate eMH development and research processes that are based on the highest standards of usability and interoperability.
6. Ensure that only high-quality eMH products and services are implemented in the (mental) health care sector.
7. Increase awareness and acceptance of eMH products and services, foster trust in digital tools in mental health care and prevention efforts, and enhance digital health literacy and skills in the public and the (mental) health workforce.
8. Integrate eMH into established (mental) health care models and other key areas of interest such as mental health in the workplace or mental health in schools.

Discussion

The eMEN project provides eight recommendations for the implementation and dissemination of eMH in Europe based on status analyses in six participating countries. The analyzed countries are in various stages of implementing eMH into mental healthcare. Whereas The Netherlands and the United Kingdom (particularly England) are relatively advanced, Germany and Belgium are rather slow in their uptake of eMH solutions. France has been a late-starter regarding eMH implementation, but has made progress at policy level within the past 3 years. Ireland can be placed somewhat in-between the early and the late starters. When eMH is available, it mostly relates to remote mental health care provision (teleconsultation or telepsychiatry).

Across all countries, there are currently shared barriers for the implementation of eMH solutions. Most importantly, awareness of eMH is still limited at the policy level, the organizational level, and the end-user level. All countries included in this study have started to incorporate e-health in their policy agendas. Limited awareness on the policy level is also the reason for another major barrier: the lack of a legal and regulatory framework, which is, in turn, a cause for the absence of a coordinated implementation approach in most involved countries. Additionally, comprehensive reimbursement schemes are still largely missing. Reasons for a lack of acceptance of eMH tools may also include the negative attitudes of professionals, which may stem from low expectancy towards performance versus a high effort expectancy [65]. A perceived loss of the therapeutic relationship

between patient and professional may also be regarded as a drawback of eMH [66]. Concerns regarding data security and privacy protection are also prevalent among providers and users of mental health services. Some of the current concerns may stem from a lack of education on eMH solutions, since medical professionals usually lack training on eMH interventions [67]. As eMH is a comparatively new research field and technology advancement is very dynamic, available long-term research on efficacy and cost-effectiveness is still limited, which might be another reason for some professionals' scepticism [68].

Future development of eMH in Europe and beyond

The eMEN project has provided the initial recommendations for the implementation of eMH in Europe. However, further research is needed to support the dissemination of eMH services. First, thus far, there is no common framework for quality control in the context of eMH. Quality indicators are required, particularly for mobile phone and web applications, which are currently still subject to very limited control. Second, the growing field of implementation science may provide insights into the most efficient strategies to upscale eMH in Europe. Thus far, a wide range of implementation strategies has been developed for mental healthcare [69]. The scope of these strategies ranges from simple single interventions such as seminars or the distribution of educational materials to multi-facetted strategies combining a variety of tools [69]. However, it is unclear which of these strategies is most efficient for the implementation of eMH services. Third, it is unclear which country-specific characteristics (e.g., concerns regarding privacy) predict the uptake of eMH. Identifying these predictors would allow the development of specifically tailored implementation programs for each country. This topic is closely connected with the question of whether and how a transnational policy such as the one provided by eMEN can facilitate the upscaling of eMH. Thus far, healthcare systems are largely in the hands of the EU member states (based on the principles of subsidiarity). However, the common barriers identified in this study highlight the potential of a common approach to eMH upscaling. It will be a great challenge to ensure that the results from the eMEN project enter the political and regulatory processes on both EU and national levels.

Limitations

There are several limitations to this study. The eMEN project was limited to six European countries, all of which are in the North-Western Region of the EU. Thus, the results from this study may not be representative for all EU member states. Particularly, perspectives from countries with fewer healthcare resources are missing. Further research is needed to test whether the recommendations developed in this project can be generalized to all EU member states and beyond. Additionally, we did not systematically assess the perspectives of specific vulnerable groups within the participating countries (e.g., refugees and migrant communities).

Another limitation was the distribution of the status analyses among different expert groups, which used slightly different methods for the literature search. This procedure had the advantage that country-specific experts could be involved, and national specificities could be taken into account. However, the use of country-specific keywords and databases for the literature search complicates comparisons between countries.

The expert interviews took place over the course of two years during the project phase. It therefore needs to be acknowledged that some of the shared knowledge and attitudes provided at a slightly earlier stage may not represent the most recent developments in a country. However, we sought to address this matter by constantly updating the policy context of the countries. Additionally, there were some differences between the participating countries in the characteristics of the interviewed stakeholders (see Table 1). We did not recruit persons who had experienced mental health problems in all participating countries. Some country-specific barriers may only become evident when interviewing those affected by mental health problems and may thus have been missed.

To date, there is no standard procedure for the development and evaluation of a transnational status analysis regarding the uptake of new practices in the field of mental healthcare. In our study, we included narrative literature reviews and stakeholder interviews conducted by country-specific experts. Future studies could use further data sources, such as healthcare records, the number of users of eMH online portals, or the number of downloads of eMH mobile applications. Additionally, a large proportion of the information gathered in this report focuses on barriers to eMH implementation rather than facilitators. Future research is needed that specifically focuses on the facilitators of eMH implementation in different European countries from the perspectives of different stakeholders.

Conclusion

This study provided status analyses of eMH implementation in six North-Western European countries. The selected countries are in various stages of implementing eMH in mental healthcare. Although awareness and implementation are increasing, policy and regulatory frameworks are still limited. Based on the status analyses, the eMEN consortium developed eight recommendations for the upscaling of eMH in Europe. Recommendations include fostering awareness,

creating strong political commitment, and setting reliable standards related to ethics and data security.

Funding The eMEN project received funding from the European Union's Interreg North-West-Europe program.

Compliance with ethical standards

Conflict of interests The authors declare that they have no conflicts of interest.

References

1. World Health Organization (2019) Fact sheet-mental health. https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/404851/MNH_FactSheet_ENG.pdf?ua=1. Accessed 7 May 2020
2. OECD/EU (2018) Health at a Glance: Europe 2018: State of Health in the EU Cycle. Paris. https://doi.org/10.1787/health_glance_eur-2018-en
3. Cuijpers P, Donker T, van Straten A, Li J, Andersson G (2010) Is guided self-help as effective as face-to-face psychotherapy for depression and anxiety disorders? A systematic review and meta-analysis of comparative outcome studies. Psychol Med 40(12):1943–1957. https://doi.org/10.1017/s0033291710000772
4. Richards D, Richardson T (2012) Computer-based psychological treatments for depression: a systematic review and meta-analysis. Clin Psychol Rev 32(4):329–342. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2012.02.004
5. Firth J, Torous J, Nicholas J, Carney R, Pratap A, Rosenbaum S, Sarris J (2017) The efficacy of smartphone-based mental health interventions for depressive symptoms: a meta-analysis of randomized controlled trials. World Psychiatry 16(3):287–298. https://doi.org/10.1002/wps.20472
6. Andersson G, Titov N, Dear BF, Rozental A, Carlbring P (2019) Internet-delivered psychological treatments: from innovation to implementation. World Psychiatry 18(1):20–28. https://doi.org/10.1002/wps.20610
7. World Health Organization (2018) Mental Health: Strengthening our Response. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response. Accessed 9 January 2020
8. Patel V, Chisholm D, Parikh R, Charlson FJ, Degenhardt L, Dua T, Ferrari AJ, Hyman S, Laxminarayan R, Levin C, Lund C, Medina-Mora ME, Petersen I, Scott JG, Shidhaye R, Vijayakumar L, Thornicroft G, Whiteford HA (2016) Global priorities for addressing the burden of mental, neurological, and substance use disorders. In: Jamison DT, Nugent R, Gelband H, Horton S, Jha P, Laxminarayan R, Mock CN (eds) Mental, neurological, and substance use disorders, 3rd edn. The World Bank, Washington, pp 1–27
9. World Psychiatric Association (2017) WPA position statement on e-mental health. https://imh.org.rs/wp-content/uploads/2017/07/1FINAL-WPA-Positionstatement-on-eMental-Health-10072017.pdf. Accessed 7 May 2020
10. Riper H, Andersson G, Christensen H, Cuijpers P, Lange A, Eysenbach G (2010) Theme issue on e-Mental Health: a growing field in internet research. J Med Internet Res 12(5):e74. https://doi.org/10.2196/jmir.1713
11. Gaebel W, Grossimlinghaus I, Kerst A, Cohen Y, Hinsche-Bockenholt A, Johnson B, Mucic D, Petrea I, Rossler W, Thornicroft G, Zielasek J (2016) European Psychiatric Association (EPA) guidance on the quality of eMental health interventions in the treatment of psychotic disorders. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 266(2):125–137. https://doi.org/10.1007/s00406-016-0677-6
12. Gaebel W, Grossimlinghaus I, Mucic D, Maercker A, Zielasek J, Kerst A (2017) EPA guidance on eMental health interventions in the treatment of posttraumatic stress disorder (PTSD). Eur Psychiatry 41:140–152. https://doi.org/10.1016/j.eurpsy.2017.01.001
13. Ebert DD, Van Daele T, Nordgreen T, Karekla M, Compare A, Zarbo C, Brugnera A, Øverland S, Trebbi G, Jensen KL, Kaehlke F, Baumeister H (2018) Internet- and mobile-based psychological interventions: applications, efficacy, and potential for improving mental health. Eur Psychol 23(2):167–187. https://doi.org/10.1027/1016-9040/a000318
14. e-Mental Health Innovation and Transnational Implementation Platform North West Europe (eMEN) (2020) Project Summary. https://www.nweurope.eu/projects/project-search/e-mental-health-innovation-and-transnational-implementation-platform-north-west-europe-emen/undefined. Accessed 9 Jan 2020
15. Baumeister RF (2013) Writing a literature review. In: Prinstein M (ed) The portable mentor. Springer, New York, pp 119–132
16. Siddaway AP, Wood AM, Hedges LV (2019) How to do a systematic review: a best practice guide for conducting and reporting narrative reviews, meta-analyses, and meta-syntheses. Annu Rev Psychol 70:747–770
17. Mayring P (2015) Qualitative inhaltsanalyse. In: Flick U, von Kardorff E, Steinke I (eds) Qualitative Forschung. Ein Handbuch, vol 11. Auflage, Rowohlt Taschenbuch Verlag, Hamburg, pp 468–475
18. Schmidt C (2015) Analyse von Leitfadeninterviews. In: Flick U, von Kardorff E, Steinke I (eds) Qualitative Forschung Ein Handbuch, vol 11. Auflage, Rowohlt Taschenbuch Verlag, Hamburg, pp 447–456
19. Steunpunt Welzijn VeG (2014) Bouwstenen voor een Vlaams Actieplan Onlinehulp. https://steunpuntwvg.be/images/rapporten-en-werknotas/bouwstenen-voor-een-vlaams-actieplan-online-hulp. Accessed 15 Mar 2018
20. Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (IMC VG) (2019) Protocolakkoord: Actieplan e-Gezondheid 2019–2021. https://www.e-health.fgov.be/file/view/AWjHQ9zDgwvToiwBkf13?filename=Actieplan%202019-2021%20e-Gezondheid_final.pdf. Accessed 9 Jan 2020
21. mHealthBELGIUM (2018) History of mHealthBELGIUM. https://mhealthbelgium.be/en/about-us/. Accessed 7 May 2020
22. Kabinet van Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn Volksgezondheid en Gezin (2016) Vlaams Actieplan Geestelijke Gezondheid. Strategisch plan 2017–2019. https://www.vlaanderen.be/publicaties/vlaams-actieplan-geestelijke-gezondheid-strategisch-plan-2017-2019. Accessed 7 May 2020
23. Vlaams Minister van Welzijn Volksgezondheid en Gezin (Jo Vandeurzen) (2015) Minister Vandeurzen schakelt versnelling hoger inzake onlinehulpverlening. https://files.onlinehulpverlening-ahs.webnode.nl/200000270-6d9686f8de/1%20-%20Persbericht_JoVandeurzen_Onlinehulp.pdf. Accessed 7 May 2020
24. Federal Public Service Health Food Chain Safety and Environment (2016) Mental health professions. https://www.health.belgium.be/en/health/mentalhealth-professions#article. Accessed 7 May 2020
25. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (Maggie de Block) (2018) 120.000 patients pourront se faire rembourser leur aide psychologique. https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.maggiedeblock.be%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F05%2F2018-05-18-FR-120.000-patients-pourront-se-faire-rembourser-leur-aide-psychologique.docx. Accessed 7 May 2020
26. Ministère des Affairs Sociales et de la Santé (2016) Stratégie nationale e-santé 2020. https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_e-sante_2020.pdf. Accessed 15 Mar 2017

27. Ministère des Solidarités et de la Santé (2018) Feuille de Route: santé mentale et psychiatrie. https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/180628_-_dossier_de_presse_-_comite_strategie_sante_mentale.pdf. Accessed 08 Sept 2018
28. Ministère des Solidarités et de la Santé (2018) Dossier de presse—Ma santé 2022: un engagement collectif. https://solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/ma_sante_2022_pages_vdef_.pdf. Accessed 7 May 2020
29. Ministère des Solidarités et de la Santé (2019) Feuille de Route: Accélérer le virage numérique. https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/190425_dossier_presse_masante2022_ok.pdf. Accessed 12 Dec 2019
30. Bundesministerium für Gesundheit (BMG) (2016) Gesetz für sichere digitale Kommunikation und Anwendungen im Gesundheitswesen sowie zur Änderung weiterer Gesetze. Bundesgesetzblatt Teil I (54)
31. Bundesärztekammer (Arbeitsgemeinschaft der deutschen Ärztekammern) (2018) Beschlussprotokoll des 121. Deutschen Ärztetages in Erfurt. Änderung des § 7 Abs. 4 MBO-Ä (Fernbehandlung). Deutsches Ärzteblatt Jg. 115 (Heft 20–21):285–296
32. Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) (2018) Videosprechstunde auch für Psychotherapeuten möglich. https://www.bptk.de/videosprechstunde-auch-fuer-psychotherapeuten-moeglich/. Accessed 25 Mar 2019
33. Bundestag D (2018) Gesetz zur Stärkung des Pflegepersonals (Pflegepersonal-Stärkungsgesetz-PpSG)
34. Beerheide R (2019) Der Weg der Apps in die Versorgung. Deutsches Ärzteblatt 116(29–30):1123–1124
35. Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA) (2018) Der Innovationsfonds und der Innovationsausschuss beim Gemeinsamen Bundesausschuss. https://innovationsfonds.g-ba.de/. Accessed 24 July 2018
36. Department of Health (2013) e-Health Strategy for Ireland. https://www.e-healthireland.ie/Knowledge-Information-Plan/e-health-Strategy-for-Ireland.pdf. Accessed 16 May 2018
37. Department of Health and Children (DOHC) (2006) A Vision for Change: Report of the Expert Group on Mental Health Policy. Stationery Office Dublin
38. Chambers D, Murphy F (2015) Technology, Mental Health and Suicide Prevention in Ireland—a Good Practice Guide. ReachOut Ireland.
39. National Youth Mental Health Task Force (YMHTF) (2017) National Youth Mental Health Task Force Report 2017. https://health.gov.ie/wp-content/uploads/2017/12/YMHTF-Final-Report.pdf. Accessed 23 Aug 2018
40. Irish Association for Counselling and Psychotherapy (IACP) (2017) Recommended Approach for Online Counselling and Psychotherapy. https://iacp.ie/onlinecounselling. Accessed 25 May 2018
41. Cullen K (2018) eMental Health: State-of-the-art & Opportunities for Ireland. Work Research Centre. https://www.mentalhealthreform.ie/wp-content/uploads/2018/05/eMental-health-review_report_final_may10_NEWcover.2.pdf. Accessed 25 May 2018
42. Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) (2012) Nationale Implementatie agenda (NIA) e-health. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2012/06/07/nationale-implementatieagenda-e-health-nia. Accessed 16 Aug 2018
43. Government of the Netherlands (2014) Government Encouraging Use of e-health. https://www.government.nl/topics/e-health/government-encouraging-use-of-e-health. Accessed 09 Aug 2017
44. Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (2017) Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional: de patiënt meer inzicht in zijn eigen zorg (VIPP) [Acceleration program information exchange patient and professional]. https://www.vipp-programma.nl/. Accessed 16 Aug 2018
45. De Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport (2016) Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 december 2016, kenmerk 159145-CZ houdende vaststelling van beleidsregels voor het subsidiëren van ziekenhuizen en de NVZ voor het stimuleren van elektronische gegevensuitwisseling tussen patiënt en zorgaanbieder (Besluit vaststelling beleidskader subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional). https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-68985.pdf. Accessed 7 May 2020
46. Nictiz, NIVEL (2017) Consciously choose e-health. Summary e-health monitor. https://www.e-health-monitor.nl/wp-content/uploads/2017/09/Nictiz_-Samenvatting_Eng.pdf. Accessed 7 May 2020
47. Nederlandse Zorgautoriteit (2017) State of the Healthcare Markets 2017. https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_3676_22/1/. Accessed 7 May 2020
48. National Information Board Department of Health (2014) Personalised health and care 2020. Using data and technology to transform outcomes for patients and citizens: a framework for action. https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/384650/NIB_Report.pdf. Accessed 7 May 2020
49. The Independent Mental Health Task Force (2016) Five year forward view on mental health: a report from the independent mental health task force to the NHS in England. https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2016/02/Mental-Health-Taskforce-FYFV-final.pdf. Accessed 7 May 2020
50. Department of Health (2017) A framework for mental health research. https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/665576/A_framework_for_mental_health_research.pdf. Accessed 7 May 2020
51. NHS England (2017) Mental health global digital exemplars. https://www.england.nhs.uk/digitaltechnology/info-revolution/exemplars/mental-healthglobal-digital-exemplars/. Accessed 7 May 2020
52. Bennion MR, Hardy G, Moore RK, Millings A (2017) E-therapies in England for stress, anxiety or depression: what is being used in the NHS? A survey of mental health services. BMJ Open 7(1):e014844. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2016-014844
53. Foley T, Woollard J (2019) The digital future of mental healthcare and its workforce: a Report on a mental health stakeholder engagement to inform the topol review. Health Education England. https://topol.hee.nhs.uk/wp-content/uploads/HEE-Topol-Review-Mental-health-paper.pdf. Accessed 15 Aug 2019
54. The Department of Health (Northern Ireland) (2016) Health and wellbeing 2026: delivering together. https://www.healthni.gov.uk/sites/default/files/publications/health/health-and-wellbeing-2026-delivering-together.pdf. Accessed 7 May 2020
55. Invest Northern Ireland (2017) Digital Northern Ireland 2020. https://www.investni.com/sites/default/files/documents/static/library/investni/documents/digital-northern-ireland-2020-report.pdf. Accessed 7 May 2020
56. Expert Panel Report (2016) Systems, not structures: changing health and social care. https://www.healthni.gov.uk/sites/default/files/publications/health/expert-panel-full-report.pdf. Accessed 7 May 2020
57. The Scottish Government (2016) Health and Social Care Delivery Plan. https://www.gov.scot/Resource/0051/00511950.pdf. Accessed 17 July 2018
58. The Scottish Government (2017) Mental health strategy 2017–2027. https://www.gov.scot/Resource/0051/00516047.pdf. Accessed 7 May 2020
59. The Scottish Government (2018) Scotland's digital health and care strategy: enabling, connecting and empowering. https://www.gov.scot/publications/scotlands-digital-health-care-strategy-enabling-connecting-empowering/. Accessed 7 May 2020

60. Welsh Government (2016) Together for Mental Health: Delivery Plan 2016–2019.
61. Welsh Government (2018) A Healthier Wales: our Plan for Health and Social Care.
62. Stevenson D, Farmer P (2017) Thriving at work: the Stevenson/farmer review of mental health and employers. England, London
63. Department for Work and Pensions, Department of Health and Social Care, Gauke D, Hunt J (2017) Improving lives: the future of work, Health and Disability
64. E-mental Health Innovation and Transnational Implementation Platform North-West Europe (eMEN), Gaebel W, Trost N, Diekmann S, Lukies R, Zielasek J (2019) Transnational Policy for e-Mental Health: A Guidance Document for European Policymakers and Stakeholders. Co-funded by the EU Interreg North-West-Europe programme. Düsseldorf/Köln: LVR-Institute for Healthcare Research (**forthcoming**)
65. Hennemann S, Beutel ME, Zwerenz R (2017) Ready for e-health? Health Professionals' acceptance and adoption of e-health interventions in inpatient routine care. J Health Commun 22(3):274–284
66. Stallard P, Richardson T, Velleman S (2010) Clinicians' attitudes towards the use of computerized cognitive behaviour therapy (cCBT) with children and adolescents. Behav Cogn Psychother 38(5):545–560
67. Drozd F, Vaskinn L, Bergsund HB, Haga SM, Slinning K, Bjorkli CA (2016) The implementation of internet interventions for depression: a scoping review. J Med Internet Res 18(9):e236. https://doi.org/10.2196/jmir.5670
68. Wozney L, Newton AS, Gehring ND, Bennett K, Huguet A, Hartling L, Dyson MP, McGrath P (2017) Implementation of eMental Health Care: Viewpoints from Key Informants from Organizations and Agencies with e-health Mandates. BMC Med Inform Decis Mak 17(1):78. https://doi.org/10.1186/s12911-017-0474-9
69. Girlanda F, Fiedler I, Becker T, Barbui C, Koesters M (2017) The evidence–practice gap in specialist mental healthcare: systematic review and meta-analysis of guideline implementation studies. Br J Psychiatry 210(1):24–30

Online publiziert: 20.07.2020

Thieme

Selbst- und Fremdwahrnehmung von Genesungsbegleitenden im klinisch-psychiatrischen Alltag

Self-Perception and External Perception of Peer Support Workers in Clinical Psychiatric practice

Autoren

Sophie E. Groß[1], Jürgen Zielasek[1], Friedhelm Kitzig[2], Monika Schröder[2], Bettina Jahnke[2], Euphrosyne Gouzoulis-Mayfrank[1]

Institute

1 LVR-Institut für Versorgungsforschung, Köln
2 LVR-Dezernat 8: Klinikverbund und Verbund Heilpädagogischer Hilfen, Fachbereich 84: Planung, Qualitäts- und Innovationsmanagement, Köln

Schlüsselwörter

Genesungsbegleitung, experienced involvement, ExIn, Versorgungsforschung, Zusammenarbeit

Keywords

peer support, experienced involvement, ExIn, health services research, collaboration

Bibliografie

DOI https://doi.org/10.1055/a-1181-4353
Psychiat Prax
© Georg Thieme Verlag KG Stuttgart · New York
ISSN 0303-4259

Korrespondenzadresse

Dr. Sophie E. Groß, LVR-Institut für Versorgungsforschung, LVR-Klinik Köln, Wilhelm-Griesinger Straße 23, 51109 Köln
Sophie.Gross@lvr.de

Die **Tab. 2** finden Sie online unter:
https://doi.org/10.1055/a-1181-4353

ZUSAMMENFASSUNG

Ziel Seit 2016 sind Genesungsbegleitende (GB) in einem Klinikverbund mit 9 psychiatrischen Kliniken im Einsatz. Ziel dieser Untersuchung war es, Erwartungen und Erfahrungen mit Genesungsbegleitung zu erheben.

Methodik Bei einem Projekttag erfolgte eine anonyme Befragung von 12 GB und 32 klinisch tätigen Personen (Schlüsselpersonen: SP) aus allen Kliniken.

Ergebnisse Die Bedeutung der Genesungsbegleitung, die Zusammenarbeit mit Stationsteams und die Unterstützung durch Vorgesetzte wurden positiv bewertet. SP schätzten die Bedeutung der GB höher ein als die GB selbst. GB wünschten sich tendenziell mehr Selbstständigkeit als von SP gewünscht. Im Vergleich zur Selbstwahrnehmung erlebten SP die GB als etwas unsicherer und belasteter.

Schlussfolgerung Es zeigte sich eine hohe Zufriedenheit mit der Arbeit der GB, aber auch Unterschiede zwischen Fremd- und Selbstwahrnehmung. Benötigt werden qualitative und umfangreichere quantitative Befragungen.

ABSTRACT

Objective Since 2016, peer support workers (PSW) have been working in a clinical group with nine psychiatric clinics. The aim of this study was to collect expectations and experiences with peer support work.

Method Twelve PSW and 32 clinicians (key informants, KI) from all clinics participated in an anonymous, written survey.

Results Both PSW and KI evaluated the overall importance of peer support, the cooperation between PSW and the clinical staff and the support from supervisors positively. KI rated the importance of peer support higher than the PSW themselves. PSW expressed the wish to act more independently. Compared to the self-perception of PSW, KI experienced them more insecure and burdened.

Conclusion Our findings speak in favor of a high level of satisfaction with peer support work, but they also point to critical differences between external and self-perceptions of PSW. Qualitative and more extensive quantitative surveys are required.

Einleitung

Genesungsbegleitende (GB) sind Menschen, die auf Grundlage eigener Erfahrungen mit psychischer Erkrankung und Behandlung durch eine spezifische Ausbildung als EX-IN-Fachkraft (*Ex*perienced *In*volvement) qualifiziert wurden, Patient*innen in ihrem Genesungsprozess zu unterstützen. Genesungsbegleitung orientiert sich an Konzepten von Partizipation, Empowerment, Salutogenese und Recovery.

Heruntergeladen von: Landschaftsverband Rheinland - Bibliothek. Urheberrechtlich geschützt.

Die Wirksamkeit gilt (noch) nicht als gesichert, wird aber im klinischen Setting als vielversprechend angesehen [1–6]. In der aktualisierten AWMF-S3-Leitlinie „Psychosoziale Therapien bei schweren psychischen Erkrankungen“ wird die Mitarbeit von GB in psychiatrischen Kliniken trotz unzureichender Evidenzlage empfohlen, denn „einzelne Befunde verweisen auf positive Effekte hinsichtlich Recovery-bezogener Outcomes und gleichwertige klinische Outcomes“ [7]. Entsprechend gewinnt der Einsatz in der psychiatrisch-psychotherapeutischen Versorgung zunehmend an Bedeutung [8].

Die Tätigkeit von GB im klinisch-therapeutischen Setting kann allerdings nur dann ausreichend Anerkennung finden, wenn die Rollenerwartungen und der Beitrag, den GB leisten können, klar definiert sind. Eine unklare Rollen- und Aufgabenbeschreibung hingegen könnte zu unzureichender Integration und geringer Wertschätzung führen [9]. Zudem hängt die Akzeptanz der GB durch die Klinikmitarbeitenden maßgeblich davon ab, wie der Einbezug und die Unterstützung der GB durch die Leitungskräfte gelebt wird [10]. Bisher liegen jedoch wenige Evaluationsstudien und kaum Studien oder Berichte über die Zusammenarbeit zwischen GB und Klinikpersonal vor [1, 9, 10]. In einem Klinikverbund mit 9 psychiatrischen Kliniken wurde Genesungsbegleitung seit 2016 implementiert. In der vorliegenden Studie wurde untersucht, wie die Arbeit der GB und ihre Zusammenarbeit mit klinischem Personal von den GB selber und anderen Berufsgruppen eingeschätzt werden.

Methode

Im Jahr 2018 richtete der Klinikverbund einen Projekttag für alle GB und eine Auswahl klinisch tätiger Mitarbeitender aus („Schlüsselpersonen“, SP). Letztere wurden durch die Klinikleitungen benannt und hatten Erfahrung in der Zusammenarbeit mit GB. Im Rahmen des Projekttags erfolgte eine freiwillige, anonyme Befragung der Teilnehmenden.

Im Vorfeld wurden 2 Fragebögen auf Grundlage von Literaturrecherchen und Diskussionen in der Arbeitsgruppe unter Einbezug einer EX-IN-Fachkraft entwickelt. Der Fragebogen für die GB enthält 41 Fragen (Items), der für die SP 44 Fragen, die post-hoc zu elf Bereichen zusammengefügt wurden (▶ **Tab. 1**). Inhaltlich korrespondieren die Items der Fragebögen miteinander (z. B. GB: „Die Zusammenarbeit mit dem Personal/Stationsteam gelingt gut.“, SP: „Die Zusammenarbeit zwischen Genesungsbegleitenden und dem Personal/Stationsteam gelingt gut.“). Jedes Item lässt sich auf einer 4-stufigen Likert-Skala beantworten (stimme: 1: überhaupt nicht zu; 2: eher nicht zu; 3: eher zu; 4: voll und ganz zu) oder mit der Angabe: „kann ich nicht beurteilen“. Zudem wurde die Tätigkeit der Befragten erhoben (GB, Arzt/Ärztin, Pflege, Sozialdienst, andere).

Die Datenauswertung erfolgte mit dem Statistikprogramm STATA MP15. Es wurden der Median (M) sowie der Mann-Whitney-U-Test berechnet. Fehlende Werte sowie Items, bei denen die Proband*innen „kann ich nicht beurteilen“ angaben, wur-

▶ **Tab. 1** Zusammenfassung der Ergebnisse und signifikante Unterschiede im Antwortverhalten zwischen Genesungsbegleitenden (GB, N = 10) und klinisch tätigem Personal (Schlüsselpersonen; SP, N = 31). Dargestellt sind die Mediane und der p-Wert des Mann-Whitney-U-Tests sowie die Effektstärke |r| nach Cohen.

Bereiche und Items der Fragebögen	GB (n)	SP (n)	p	|r|	Ergebnisinterpretation
Zusammenarbeit und Einbezug ins Team (8 Items)					Insgesamt positive Bewertung beiderseits.
Item: Gelingen der Zusammenarbeit	4 (10)	3 (25)	0,032	0,36	GB schätzen die Zusammenarbeit mit dem Personal/Stationsteam etwas besser ein als SP.
Item: Einbezug ins Team	4 (10)	3 (23)	0,003	0,53	SP bewerteten den Einbezug der GB ins Team schlechter als die GB selbst.
Item: Informationsaustausch	4 (9)	3 (25)	0,022	0,39	GB geben etwas häufiger als SP an, dass Informationen über Patient*innen regelmäßig ausgetauscht werden.
gewünschter Handlungsspielraum (4 Items)					GB wünschten sich tendenziell mehr Handlungsspielraum, als dies von SP gewünscht wurde (Unterschiede nicht signifikant).
Item: Handeln im Auftrag	2 (10)	3 (26)	0,005	0,44	Die Mehrheit der GB empfand, dass sie nicht im Auftrag des Stationsteams handeln sollten. Hingegen war knapp die Hälfte der SP der Meinung, dass GB im Auftrag des Stationsteams handeln sollten.
Wahrnehmung der GB (3 Items)					Beide Seiten empfanden, dass die Arbeit von GB ernst genommen wird. Nur tendenziell meinten etwas mehr SP, dass GB als psychisch kranke Personen wahrgenommen werden. GB selbst empfanden es kaum so.
Item: Wahrnehmung der psychischen Erkrankung von GB	1 (9)	2 (26)	0,010	0,44	SP empfanden etwas häufiger als GB, dass diese durch das Stationsteam als psychisch erkrankte Person wahrgenommen werden.

Heruntergeladen von: Landschaftsverband Rheinland - Bibliothek. Urheberrechtlich geschützt.

▶ **Tab. 1** (Fortsetzung)

Bereiche und Items der Fragebögen	GB (n)	SP (n)	p	|r|	Ergebnisinterpretation
Auftreten der GB (5 Items)					Tendenziell leicht unterschiedliche Einschätzungen; kongruente Bewertung der Zuverlässigkeit.
Item: Erfüllen der Erwartungen im Patient*innenkontakt	2 (9)	3 (23)	**0,043**	**0,36**	Die Hälfte der GB gab an, im Patientenkontakt überwiegend nicht entsprechend den Erwartungen des Stationsteams zu handeln. SP hingegen gaben mehrheitlich an, dass aus ihrer Sicht GB im Patientenkontakt entsprechend den Erwartungen des Stationsteams handeln.
Item: Unsicherheit	1 (10)	2 (24)	**0,003**	**0,46**	SP erlebten die GB als unsicherer als die GB sich selbst erlebten.
Unterstützung (4 Items)					Die Unterstützung im Rahmen des Einsatzes von GB wurde allgemein positiv bewertet.
Vermittlung und Annahme des Angebots der GB (3 Items)					Die Möglichkeiten der Vermittlung und die Annahme des Angebots der GB durch Patient*innen wurden von den GB und den SP positiv bewertet.
Empathie und Vertrauen (2 Items)					Die Empathie von GB für Patient*innen sowie das Vertrauen von Patient*innen in die GB wurde sowohl von den GB selbst als auch von den SP positiv bewertet.
(Selbst)Wirksamkeit (5 Items)					Die (Selbst)Wirksamkeit der GB sowie die Bedeutung der GB für Patient*innen wurde durchweg positiv eingeschätzt.
Item: Wirkung der GB im Rahmen der Krankheitsbewältigung	3 (10)	4 (25)	**0,010**	**0,40**	Insgesamt schätzten die SP die Bedeutung der GB für die Krankheitsbewältigung der Patient*innen noch höher ein als dies die GB selbst taten.
Anforderungen an und Stigmatisierung von GB (4 Items)					Hier wurden Diskrepanzen in den Angaben von GB und SP ersichtlich.
Item: Belastung durch Patient*innenkontakte	1 (10)	2 (24)	**0,000**	**0,62**	SP schätzten die Belastung der GB durch Patientenkontakte höher ein, als diese selbst.
Item: Belastung durch die Zusammenarbeit mit dem Stationsteam	1 (10)	2 (25)	**0,000**	**0,67**	SP schätzten die Belastung der GB durch die Zusammenarbeit mit dem Stationspersonal höher ein als diese selbst.
Item: Schwierigkeiten den Verpflichtungen nachzukommen	1 (10)	2 (26)	**0,002**	**0,51**	SP erlebten die GB belasteter durch die Patient*innenkontakte im Vergleich zum Eigenerleben der GB.
Sinnhaftigkeit (3 Items)					Die Sinnhaftigkeit der Arbeit von GB wurde von den GB und den SP betont.
Vorbereitung der Klinik auf GB (3 Items, nur bei SP gefragt)					Die meisten SP gaben an, dass ihnen, dem Stationsteam sowie den Patient*innen die Tätigkeiten und Kompetenzen von GB gut vermittelt wurden.

GB: Genesungsbegleitende, SP: Schlüsselpersonen (klinisch tätiges Personal); M: Median; Mann-Whitney-U-Test: fett markiert = signifikanter Gruppenunterschied im 95 %-Konfidenzintervall; n: Anzahl verwertbarer Angaben (fehlende Werte sind nicht in die Medianberechnung eingeflossen); |r|: Effektstärke berechnet nach Cohen: $|r| = z/\sqrt{N}$ (standardisierte Teststatistik z-Test/$\sqrt{42}$); $|r| < 0{,}3$: kleiner Effekt; $0{,}3 < |r| < 0{,}5$: mittlerer Effekt; $|r| > 0{,}5$: starker Effekt

den aus der deskriptiven Auswertung pairwise ausgeschlossen. Um die Bedeutsamkeit eines Ergebnisses zu beurteilen, werden Effektstärken berechnet: $|r| = z/\sqrt{N}$. Zur Beurteilung der Größe des Effektes dient die Einteilung nach Cohen [11]. Da mehrere voneinander abhängige Signifikanztests durchgeführt wurden, fand eine Korrektur für den Anstieg des Typ-I-Fehlers statt. Hierzu wurde die Bonferroni-Korrektur gewählt, die das Signifikanzniveau durch die Anzahl der durchgeführten Vergleiche dividiert [12].

Ergebnisse

Zum Zeitpunkt der Befragung waren 17 GB mit durchschnittlich 25 Wochenstunden angestellt und in den Bereichen Allgemeinpsychiatrie, Suchterkrankungen, soziale Rehabilitation und forensische Psychiatrie eingesetzt. An der Befragung nahmen 12 GB und 32 SP teil, davon 21 Pflegekräfte, 4 Ärzt*innen, ein/e Sozialarbeiter*in und 6 Personen mit anderer Tätigkeit. Der Rücklauf umfasste 43 Fragebögen. Zwei mussten ausge-

Heruntergeladen von: Landschaftsverband Rheinland - Bibliothek. Urheberrechtlich geschützt.

schlossen werden, da sich aus den Angaben nicht zweifelsfrei ergab, ob es sich um GB oder SP handelte. Somit wurden 41 Fragebögen (10 GB und 31 SP) in die Auswertung eingeschlossen (bereinigte Rücklaufquote: 93,2 %).

Die Zusammenarbeit zwischen GB und SP wurde beiderseits positiv bewertet. Bei den meisten Items gaben GB und SP ähnliche bzw. kongruente Antworten. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse auf Bereichsebene und die signifikanten Unterschiede im Antwortverhalten zwischen GB und SP auf Itemebene finden sich in ▶ **Tab. 1**. Die ausführliche Darstellung und Kommentierung der Ergebnisse auf Ebene aller Items findet sich in **Tab. 2** der Onlineversion dieser Arbeit. Nach Korrektur des alpha (0,05/42) bleiben lediglich 2 Gruppenunterschiede zwischen GB und SP signifikant: Die Belastung der GB durch Patient*innenkontakte und die Belastung der GB durch die Zusammenarbeit mit dem Stationsteam.

Diskussion

Die Arbeit der GB und die Zusammenarbeit zwischen GB und SP wurde beiderseits positiv bewertet. Die Ergebnisse sind in Einklang mit einer neueren, randomisiert-kontrollierten Studie aus Deutschland zur Selbstwirksamkeit Betroffener nach peer support [6] und dem Ergebnis einer qualitativ-partizipativen Studie [10]. Die Vermittlung der Aufgaben von GB an die Stationsteams war möglicherweise entscheidend für die hohe Akzeptanz der GB: Eine unklare Rollen- und Aufgabenbeschreibung kann zu unzureichender Integration und geringer Wertschätzung führen, und Leitungskräfte geben hier Orientierung [2, 9–10]. Eine entsprechende Organisationskultur, klare Rollenzuordnungen und Schulungen sind nach einem systematischen Review als wesentliche förderliche Faktoren für die Implementierung zu nennen [13].

Dennoch deuten die Ergebnisse auch auf möglicherweise kritische Unterschiede zwischen Fremd- und Selbstwahrnehmung der GB hin: So bewerteten die GB ihren Einbezug in das Team besser als die SP. Auch wünschten sich die GB tendenziell mehr Handlungsspielraum und Selbstständigkeit in der Begleitung von Patient*innen als von den SP gewünscht. Gewissermaßen im Kontrast dazu steht, dass die SP die GB im Vergleich zur Selbsteinschätzung etwas unsicherer und belasteter erlebten.

Die Interpretation der Ergebnisse muss aufgrund von Limitationen der Untersuchung zurückhaltend erfolgen. Grundsätzlich sind hier Faktoren des kleinen Stichprobenumfangs relevant, d. h. die Power der Berechnung ist nicht hoch genug, um sämtliche möglichen, klinisch relevanten, Effekte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Die Operationalisierung von Skalen auf Grundlage der Ein-Item-Messinstrumente in den Fragebögen (Faktorenanalysen, Reliabilitäts- und Validitätsmessungen) war wegen der geringen Fallzahl nicht möglich. Auch eine Verzerrung der Ergebnisse durch die Selektion der Befragten ist möglich, da die am Projekttag teilnehmenden SP dem Einsatz von GB eventuell überdurchschnittlich positiv gegenüberstanden. Für eine tiefergehende Analyse der Selbst- und Fremdwahrnehmung werden qualitative Befragungen und umfangreichere repräsentative quantitative Befragungen mit zusätzlicher Erhebung organisationaler Merkmale benötigt.

KONSEQUENZEN FÜR KLINIK UND PRAXIS

Die Bedeutung der Implementierung von GB im klinischen Kontext muss durch die Leitungsebene vermittelt werden, damit die Integration ins Stationsteam gelingt. Rolle, Aufgabenbereich und Handlungsspielraum müssen für GB und klinisch tätiges Personal klar geregelt und transparent sein. Bedeutsam sind offene Kommunikation zwischen Stationsteams und GB, kontinuierliche Supervision und Evaluation des Implementierungsprozesses.

Interessenkonflikt

Jürgen Zielasek erhielt als Mitglied des wissenschaftlichen Komitees des Jahreskongresses der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde e. V. (DGPPN) Reisekostenunterstützung und Gebührenbefreiung für die Teilnahme an Jahreskongressen der DGPPN.
Die anderen Autorinnen/Autoren geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

Literatur

[1] Mahlke C, Heumann K, Ruppelt F et al. Peer-Begleitung für Erfahrene schwerer und langfristiger psychischer Störungen und Angehörige – Hintergrund, Konzept und Baseline-Daten. Psychiat Prax 2015; 42: S25–S29

[2] Mahlke C, Kraemer U, Kilian R et al. Bedeutung und Wirksamkeit von Peer-Arbeit in der psychiatrischen Versorgung Übersicht des internationalen Forschungsstandes. Nervenheilkunde 2015; 34: 235–239

[3] Pitt V, Lowe D, Hill S et al. Consumer-providers of care for adult clients of statutory mental health services. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013; 3: CD004807

[4] Heumann K, Utschakowski J, Mahlke C et al. Implementierung von Peer-Arbeit. Nervenheilkunde 2015; 34: 275–278

[5] Gillard S, Edwards C, Gibson S et al. New ways of working in mental health services: a qualitative, comparative case study assessing and informing the emergence of new peer worker roles in mental health services in England. Health Serv Deliv Res 2014: 2

[6] Mahlke CI, Priebe S, Heumann K et al. Effectiveness of one-to-one peer support for patients with severe mental illness – a randomised controlled trial. European Psychiatry 2017; 42: 103–110

[7] DGPPN – Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde, Hrsg. S3-Leitlinie Psychosoziale Therapien bei schweren psychischen Erkrankungen. S3-Praxisleitlinien in Psychiatrie und Psychotherapie. 2 Auflage. AWMF. Berlin: Springer Verlag; 2019

[8] Hegedüs A, Seidel E, Steinauer R. Participants' employment status and experiences in the year after the Experienced Involvement training. International Journal of Social Psychiatry 2016; 62: 214–220

[9] Heumann K, Schmid C, Wilfer A et al. Kompetenzen und Rollen(-erwartungen) von Genesungsbegleitern in der psychiatrischen Versorgung – Ein partizipativer Forschungsbericht. Psychiat Prax 2019; 46: 34–40

[10] Ruppelt F, Mahlke C, Heumann K et al. Peer-Stadt Hamburg? Doppelte Peer-Beratung an der Schnittstelle ambulant-stationär. Nervenheilkunde 2015; 34: 259–262

[11] Cohen J. A power primer. Quant Meth Psychol 1992; 112: 155–159

[12] Bender R, Lange S. Adjusting for multiple testing – when and how? J Clin Epidemiol 2001; 54: 343–349

[13] Ibrahim N, Thompson D, Nixdorf R et al. A systematic review of influences on implementation of peer support work for adults with mental health problems. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2020; 55: 285–293

Heruntergeladen von: Landschaftsverband Rheinland - Bibliothek. Urheberrechtlich geschützt.

BMC Psychiatry

RESEARCH

Open Access

Homelessness among psychiatric inpatients in North Rhine-Westphalia: a retrospective routine data analysis

Ida Sibylle Haussleiter[1,2*†], Isabell Lehmann[3†], Bianca Ueberberg[1], Josephine Heinz[3], Jürgen Zielasek[3,4], Euphrosyne Gouzoulis-Mayfrank[3,5†] and Georg Juckel[1,2†]

Abstract

Background: Within the last five years the number of homeless persons in Germany has more than doubled, with many suffering from mental illnesses that require treatment. Whether the mental illness itself led to losing shelter or whether the state of being homeless increased the likelihood of developing symptoms of a mental disorder remains unclear. The current study assessed the interaction of homelessness and mental illness from a care provider perspective.

Methods: We conducted a retrospective analysis of inpatient routine data from 20 psychiatric hospitals in North Rhine-Westphalia (NRW), Germany, over a period of four years ($N = 366{,}767$ inpatient treatment cases). Patients were considered "homeless" if they had no fixed unique address.

Results: About 2.4% of the analyzed cohort was classified as homeless, with increasing tendency over the study period (+14% from 2016 to 2019). The percentage of homeless patients varied broadly between the hospitals (0.2–6.3%). Homeless patients were more often male and on average eight years younger than patients with a fixed address. Homeless patients experienced more involuntary measures (admission and restraint), had a shorter course of treatment and were more often discharged within one day. Every second homeless case was diagnosed with a substance use disorder and every third homeless case with a psychotic disorder, whereas affective disorders were diagnosed less frequently in this group. Psychiatric comorbidity occurred more often in homeless patients whereas somatic diseases did not.

Conclusions: Multiple patient-related sociodemographic and local factors are associated with homelessness of psychiatric inpatients. In addition, clinical factors differ between homeless and non-homeless patients, pointing to more severe mental illness and treatment complications (e.g., coercive measures) in homeless persons. Thus, homelessness of psychiatric inpatients can imply special challenges that need to be considered by healthcare providers and politicians, with the goal of optimizing mental and social care and the mental health outcomes of homeless persons.

Keywords: Homelessness, Mental healthcare, Mental disorders, Hospital data, Routine data analysis

*Correspondence: Ida.S.Haussleiter@rub.de
†Ida Sibylle Haussleiter and Isabell Lehmann contributed equally to this work.
†Euphrosyne Gouzoulis-Mayfrank and Georg Juckel contributed equally to this work.
[1] LWL Research Institute for Mental Health, Ruhr University Bochum, LWL University Hospital, Bochum, Germany
Full list of author information is available at the end of the article

Background

Homelessness is considered an increasing social problem in developed countries [20]. The overall mortality and morbidity, including mental health problems, are clearly higher among homeless persons than amongst the general population [2, 18]. Mental disorders are also among

© The Author(s) 2022. **Open Access** This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. If material is not included in the article's Creative Commons licence and your intended use is not permitted by statutory regulation or exceeds the permitted use, you will need to obtain permission directly from the copyright holder. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. The Creative Commons Public Domain Dedication waiver (http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/) applies to the data made available in this article, unless otherwise stated in a credit line to the data.

the risk factors for age-standardized excess mortality rates in this group [29], which are 2–5 times higher than in the general population. Since the burden of psychiatric morbidity in homeless persons is substantial and there are strong indications of a complex relationship between homelessness and mental disorders as they promote each other and lead to poor healthcare outcomes [3, 18].

In Germany, there were approximately 678,000 homeless persons in 2018, a figure that had doubled within four years (2014–2018) mainly due to the large numbers of refugees in that period [5]. Within the last 20 years, there have been some studies on the mental health situation of homeless persons in different German cities. The most recent of these local studies evaluated 232 randomly drawn homeless people in the Bavarian metropolitan city of Munich during 2010–2015 and reported that psychiatric treatment started on average of six years before the persons became homeless [3]. A recent meta-analysis of 11 German studies with an overall study population of 1220 homeless persons in Germany resulted in 77.4% clinical disorders [according to the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition (DSM-IV), axis I, pooled point prevalence of eight studies], primarily substance use disorders (SUD) [38]. These data thus yielded a mental illness rate 3.8 times higher than in the general population [21]. The gender ratio in this largest German meta-analysis on mental health in homeless people was 1:9 in favor of the male gender [38].

Another perspective on the problem of homelessness and mental disorders offers the analysis of homelessness in persons who receive mental hospital care. The prevalence of homelessness among psychiatric inpatients varies considerably between studies from 0.55-39% [30, 44]. The most recent German study on the housing situation of psychiatric inpatients was the WOHIN- study. This cross-sectional patient survey included 540 inpatients in Berlin with a defined catchment area in an underprivileged district with approximately 270,000 inhabitants [40]. Due to the study design, 43.2% of all admitted patients in the study period were included into the survey and out of those, only 68.7% of the patients lived in an own apartment, whereas 13.0% were homeless and 18.3% were accommodated in sociotherapeutic facilities. Another German Study [45] included all 3174 admissions within a 12months period and observed homelessness in 31% of the patients. This relatively high percentage results from homeless definition as "no private home" and therefore count of all patients who lived in sociotherapeutic facilities. Another European study from Switzerland analyzed the data on 16247 patients consecutively referred to psychiatric hospitals over a four-year time period and observed a rate of 1.60% homelessness among them. Unlike traditional homelessness interventions with prerequisites for treatment or sobriety, recovery-oriented interventions such as Housing First in the USA and At Home/Chez Soi in Canada [35] offer permanent housing to participants immediately [42] and have been shown to reduce use of several types of health and social services among homeless individuals with mental illness [7]. User experiences with Housing First compared to treatment-first approaches have been published in North American context, but less is known for European context. A recent study compared experiences in seven European countries [16], but so far there are no comparable German studies on such low-demand supportive housing. Our study "Homelessness in persons with mental illness – risk factors, impact and interventions: An overview in North Rhine-Westphalia" (WohnLos) aimed at identifying the magnitude of the problem of homelessness in mentally ill persons in North Rhine-Westphalia (NRW) and at identifying the risk profiles of persons affected by homelessness. In the present retrospective part of our study, we analyzed routine data from a large sample of inpatients from 20 mental hospitals regarding the prevalence of homelessness. The hospitals are spread over the federal state of NRW, the fourth largest state in Germany by area and the largest state by population size (17.9 million inhabitants). The hospitals have a catchment area for mental healthcare for about half of the population of NRW. In 2020, the state of NRW counted 49,987 homeless persons [26], which is about 0.28% of the NRW population. A nationwide survey is scheduled for 2022. Our study aimed to assess the prevalence of homelessness among psychiatric inpatients in different areas of NRW and to identify the risk factors for being homeless at time of admission. In addition, our study aimed to analyze the routine care provided to homeless people in psychiatric hospitals compared to non-homeless patients. Due to our high patient case number and the large geographic area analyzed, our routine data analysis may provide more representative data than former studies.

Methods

Setting

Data were collected from 20 psychiatric hospitals belonging to the two communal councils of the federal state of NRW: the Council of Westphalia [Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL), with eleven hospitals] and the Council of Northrhine [Landschaftsverband Rheinland (LVR), with nine hospitals]. Together, the LWL and LVR hospital groups form the biggest providers of psychiatric services in Germany, covering both rural and urban areas (6969 hospital beds). Each of the eleven LWL and nine LVR hospitals has a defined catchment area. The number of inhabitants at the hospital sites was 260,141 on average (range 12,933–1,087,863) or 1321 per km^2

(range 107–2860). According to the DeStatis [9] definition, most of the sites were classified as urban areas, four hospitals were located in semi-urban areas and no hospital was located in an exclusively rural area. The annual point-in-time count in 2019 registered an average of 1712 homeless persons (range 277–6198) at the hospital sites, corresponding to a rate of 1368 per 100,000 persons [26].

Procedures

A retrospective, large-scale multicenter comparative study of psychiatric treatment cases was carried out in the 20 LVR and LWL hospitals for the years 2016–2019. We analyzed hospital reimbursement data and additional routine data from the medical records of each case and combined these data with data on socioeconomic environments, such as urbanization. The hospital reimbursement data (Section 301 of Social Code Book V) are transferred to health insurance companies as part of the daily routine, thus leading to the accumulation of a reliable and comprehensive database of service utilization data for all patients treated in the LVR and LWL hospitals. Diagnoses according to the Tenth Revision of the International Classification of Diseases (ICD-10) were based on discharge records and up to 20 diagnoses were considered. The first two digits of the psychiatric main discharge diagnosis encoded in the system were used to specify the diagnostic subgroups of each case (such as ICD-10 code F2 for the group of psychotic disorders).

The housing status was categorized based on the documented housing situation at time of admission. For each hospital, we requested the common documentations for "homelessness". These included: "without permanent address" in the patients' address line; specific addresses, such as the address of the local train station or local homeless shelters; or the ZIP code "9999". Patients were subdivided into two groups corresponding to their housing situation (homeless vs. non-homeless). "Homeless" meant the absence of a fixed, unique address as defined by the European Commission [12]. This definition comprises the first two categories of the existing European Typology of Homelessness and Housing Exclusion (ETHOS) [11]: roofless (sleeping rough, unsheltered) and houseless (living temporarily with other persons or in transitional accommodation).

Pseudonymized data were provided by the IT department of the LWL and the LVR statistics database. All inpatient data were considered; 367,551 cases were registered in this period, of which 366,767 treatment cases were analyzed after data cleaning according to minimum data criteria (age, gender, main diagnosis). Readmissions were considered as new treatment cases in this design. The socioeconomic data at the hospital sites were obtained from official sources/databases such as Statistisches Bundesamt (destatis.de), Sozialberichterstattung NRW, Ministry of Work, Health and Social Matters of the federal state of NRW (Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales: MAGS) and from publications of the corresponding cities and communities (wegweiser-kommune.de). The study was approved by the responsible ethics committees for the LWL and LVR and all medical hospital directors gave their written consent.

Data analysis

Data were collected retrospectively. Analyses were carried out using a statistical software package (IBM SPSS Statistics 26.0®). Group differences (homeless vs. non-homeless cases) were analyzed using Pearson's chi-square test and/or Fisher's exact test for categorical variables and two-tailed *t*-tests for independent variables. A p value of less than 0.05 was interpreted as statistically significant. The main diagnosis was encoded dichotomously (F2 yes/no) and statistical testing was performed for each diagnosis separately. The housing status was also dichotomous (homeless or non-homeless). Principal component analysis (PCA) and binary logistic regression were performed.

Results

A total of 366,767 treatment cases (57.3% male, mean age 47.52 ± 18.31 years) were analyzed, of which 8636 cases (2.4%) were classified as homeless. The number of annual treatment cases decreased within the study period, from 92,837 in 2016 to 89,765 in 2019. Cases classified as homeless increased from 1998 to 2284 cases per year (+14%) in the same period, whereas the percentage of homeless patients increased only slightly (2016: 2.15%; 2017: 2.37%; 2018: 2.36%; 2019: 2.54%). Compared to the average prevalence of homelessness among the population at the hospital sites [26], the percentage among the inpatients of the psychiatric hospitals is higher. When looking at the different hospitals, the rate of homelessness among patients varied from 0.2% to 6.3%. The highest percentages were found in hospitals located in large and medium-size cities (Cologne: 6.3%,Münster: 5.8%; Düsseldorf: 3.7%; Paderborn: 3.2%; Essen: 3.1%) and the lowest percentages were found in small towns (Hemer: 0.2%; Gütersloh: 0.2%; Marsberg: 0.5%; Langenfeld: 0.9%).

Table 1 displays the demographic/clinical characteristics and group differences for the total cohort and Table 2 displays the results regarding hospital treatment. With regard to gender, 56.8% of the non-homeless and 80.2% of the homeless patients were male ($p < .001$). The two groups (homeless vs. non-homeless) differed significantly in age ($p < .001$), with the homeless patients being, on average, eight years younger. The three most frequent main diagnostic clusters were substance use (ICD-10 diagnostic code F1), psychotic

Table 1 Demographic/clinical characteristics and group differences

	Total (*N* = 366,767)	Non-homeless (*n* = 358,131)	Homeless (*n* = 8636)	Group comparison	*p*
Demographic characteristics					
Male gender (*n*, %)	210,228 (57.3)	203,306 (56.8)	6922 (80.2)	$\chi^2_{(1)} = 1884.85$	< .001
Age (years; mean, SD)	47.52 (18.31)	47.72 (18.39)	39.27 (12.3)	$t_{(9589.19)} = 62.15$	< .001
Clinical characteristics (main discharge diagnosis yes/no)					
F0 (*n*, %)	33,860 (9.2)	33,768 (9.4)	92 (1.1)	$\chi^2_{(1)} = 703.92$	< .001
F1 (*n*, %)	126,221 (34.4)	121,844 (34.0)	4377 (50.7)	$\chi^2_{(1)} = 1037.09$	< .001
F2 (*n*, %)	64,414 (17.6)	61,820 (17.3)	2594 (30.0)	$\chi^2_{(1)} = 950.58$	< .001
F3 (*n*, %)	100,546 (27.4)	99,850 (27.9)	696 (8.1)	$\chi^2_{(1)} = 1665.0$	< .001
F4 (*n*, %)	16,934 (4.6)	16,552 (4.6)	382 (4.4)	$\chi^2_{(1)} = 0.754$	.385
F5 (*n*, %)	645 (0.2)	643 (0.2)	2 (< 0.1)	$\chi^2_{(1)} = 11.75$	.001
F6 (*n*, %)	15,554 (4.2)	15,111 (4.2)	443 (5.1)	$\chi^2_{(1)} = 17.21$	< .001
F7 (*n*, %)	2947 (0.8)	2923 (0.8)	24 (0.3)	$\chi^2_{(1)} = 30.65$	< .001
F8 (*n*, %)	252 (0.1)	246 (0.1)	6 (0.1)	$\chi^2_{(1)} = 0.001$	.978
F9 (*n*, %)	884 (0.2)	876 (0.2)	8 (0.1)	$\chi^2_{(1)} = 8.10$	.004
F1 + F2 (*n*, %)	24,660 (6.7%)	22,852 (6.4%)	1808 (20.9%)	$\chi^2_{(1)} = 2848.37$	< .001
F1 + F6 (*n*, %)	19,276 (5.3%)	18,334 (5.2%)	942 (10.9%)	$\chi^2_{(1)} = 567.43$	< .001
add. psych. diagn. (mean, SD)	1.41 (1.49)	1.4 (1.5)	2.03 (1.74)	$t_{(8914.27)} = -33.22$	< .001
somatic diagn. (mean, SD)	2.29 (3.35)	2.32 (3.38)	1.18 (1.73)	$t_{(10299.27)} = 58.62$	< .001

F0 = organic, including symptomatic psychical disorders; F1 = substance use disorders; F2 = psychotic disorders; F3 = affective disorders; F4 = neurotic, stress-related and somatoform disorders; F5 = abnormal behavior with physical disorders and factors; F6 = personality disorders; F7 = reduction of intelligence; F8 = development disorders; F9 = behavioral and emotional disorders that begin in childhood and youth

Table 2 Treatment characteristics and group differences

	Total (*N* = 366,767)	Non-homeless (*n* = 358,131)	Homeless (*n* = 8636)	Group comparison	*p*
Treatment characteristics (mean, SD)					
Days of treatment	22.55 (28.16)	22.7 (27.96)	16.10 (35.08)	$t_{(8901.52)} = 17.37$	< .001
24-h cases (*n*, %)	37,744 (10.3)	36,195 (10.1)	1549 (17.9)	$\chi^2_{(1)} = 560.0$	< .001
Legal status at admission, PsychKG* (*n*, %)	39,959 (10.9)	38,427 (10.7)	1532 (17.7)	$\chi^2_{(3)} = 430.80$	< .001
Physical restraint (*n*, %)	6944 (1.9)	6711 (1.9)	233 (2.7)	$\chi^2_{(1)} = 30.83$	< .001
Number of days with restraint	0.1 (0.97)	0.10 (0.95)	0.14 (1.28)	$t_{(5414.45)} = -2.21$	.027
Days with restraint per treatment day	0.01 (0.13)	0.01 (0.13)	0.02 (0.12)	$t_{(5268.70)} = -2.47$	.013
Seclusion (*n*, %)	1379 (0.4)	1343 (0.4)	36 (0.4)	$\chi^2_{(1)} = 0.39$	.53
Number of days with seclusion	0.03 (0.63)	0.3 (0.64)	0.3 (0.51)	$t_{(5573.81)} = -0.63$	.53
Days with seclusion per treatment day	0.0022 (0.08)	0.0022 (0.08)	0.0028 (0.05)	$t_{(5577.43)} = -0.86$	.392
Number of somatic consultations	1.46 (0.93)	1.46 (0.93)	1.32 (0.72)	$t_{(56.40)} = 1.46$	.149
Somatic consultations per treatment day	0.10 (0.21)	0.10 (0.21)	0.09 (0.1)	$t_{(57.94)} = 1.14$	.258
Medical doctor units	3.4 (5.99)	3.42 (6.03)	2.21 (3.1)	$t_{(3350.88)} = 20.41$	< .001
Medical doctor units per treatment day	0.27 (0.83)	0.27 (0.84)	0.29 (0.44)	$t_{(3291.44)} = -1.80$	.071
Staff nurse units	11.42 (24.63)	11.53 (24.74)	5.59 (16.73)	$t_{(4933.44)} = 23.54$	< .001
Staff nurse units per treatment day	0.76 (3.82)	0.76 (3.86)	0.49 (1.13)	$t_{(6652.98)} = 14.85$	< .001
Social worker units	3.74 (5.47)	3.74 (5.47)	3.58 (4.89)	$t_{(965.99)} = 1.01$	.366
Social worker units per treatment day	0.25 (0.77)	0.25 (0.77)	0.27 (0.52)	$t_{(980.92)} = -1.25$	.211

* Legal status PsychKG = German Law on Help and Protective Measures for Mentally Ill Persons (Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten)

disorders (F2) and affective disorders (F3). Substance use (F1), psychotic disorders (F2) and personality disorders (F6) occurred more frequently within the homeless subgroup, with affective disorders (F3) diagnosed less frequently in this group. Every second homeless case was diagnosed with a SUD(F1: 50.7%) and every third case was diagnosed with a psychotic disorder (F2: 30.0%). Neurotic, stress-related and somatoform disorders did not differ between homeless and non-homeless patients but the overall occurrence was low, with less than 5% in all cases. In the homeless group, somatic comorbidity was less frequently diagnosed, whereas psychiatric comorbidity occurred more frequently. We tested two double diagnoses (F1+F2 and F1+F6) in relation to being homeless versus not being homeless and found significant associations between both double diagnoses and homelessness.

Table 2 shows that homeless patients had a shorter course of treatment and were significantly more often discharged within one day (24-hour cases). Involuntary admission and physical restraint occurred significantly more often in homeless patients. Regarding treatment resources, non-homeless patients obtained significantly more therapeutic units (one therapeutic unit = 25 minutes) from medical doctors and staff nurses. After adjusting for duration of treatment, this difference remained significant for staff nurse units but disappeared for medical doctor units (the trend even reversed). Groups did not differ in the quantity of social worker units obtained (Table 2).

PCA and logistic regression were chosen to determine the influential principal components on homelessness in psychiatric inpatients. The Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy was only .15, thus disabling factor analysis. Subsequently logistic regression was performed to determine predictive factors for dichotomous category membership (homeless vs. non-homeless). The model initially contained 19 independent variables, subdivided into patient-related (age, gender, psychiatric main discharge diagnosis, psychiatric comorbidity measured as number of secondary psychiatric diagnoses) and social–environmental variables at the hospital sites (number of inhabitants, homelessness, rate of migration and rate of poverty measured as number of households in the jobseeker subsistence system). The correlation between some predictor variables was high ($r > .75$), therefore rate of poverty measured as number of households in the jobseeker subsistence system was excluded as a variable and diagnoses were only considered if they had a frequency of at least 5% in the total sample. After this adjustment, multicollinearity was no longer a confounding factor in the analysis and correlations between predictor variables were low ($r < .75$). Goodness-of-fit was assessed using the Hosmer-Lemeshow test, indicating a poor model fit [$\chi^2(8) = 97.23, p < .001$].

The binomial logistic regression model was statistically significant [$\chi^2(10) = 8074.45, p < .001$] but Nagelkerke's R^2 was low at .110 and 97.6% of cases were already classified without further information. Thus, logistic regression was disabled as well.

Discussion

Homelessness in countries with developed economies is a difficult and significant social issue, especially when it comes to disadvantaged groups such as psychiatric patients. Our retrospective data analysis of more than 360,000 inpatient psychiatric treatment cases conducted identified a rate of 2.4% homeless patients (with distinct regional differences), who 1) were mainly male (80%) and eight years younger; 2) more likely to have a psychosis and SUD diagnosis; 3) had more additional psychiatric and less somatic diagnoses; 4) had fewer treatment days and were more often discharged within one day; and 5) had more involuntary admissions and physical restraints compared to non-homeless patients.

The rates of homelessness among psychiatric patients in international studies differ considerably. In this context, the different methodological approaches have to be considered: there have been European [4, 24, 28, 30–32, 40, 43, 45] and north American studies [13, 25, 41] vs. analysis from low-income Afro-Asian countries [17, 33, 37, 44], evaluation of a complete cohort [4, 24, 30, 32, 43, 45] vs. a defined subgroup with distinct patient characteristics [13, 17, 25, 28, 31, 33, 37, 40, 41, 44], the inclusion of current homelessness vs. probability and history thereof [13, 30], a definition of literally homeless vs. no private home [40, 45]. A rate of 2,4% homelessness as observed in the present study, is a relatively low prevalence, but other European studies with a similar design (inclusion of all consecutive psychiatric admissions) also found single digit prevalences of 0.5-1.58% in Denmark ("one-year cumulative probability of first homelessness after discharge", [30], 1.6% in Switzerland [24], and 3.8% in the UK (focus on ethnical differences in treatment, [4]. Previous Danish studies observed a rate of 6-8% [31, 32], and the recently published National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions in the US observed a rate of 5% homelessness between the two waves of the survey (only participants with Alcohol and Related Conditions, [13]. The rate of 13% homelessness in the German WOHIN-study was based ona homeless definition including literally homeless, emergency shelter, homeless shelter, women's refuge, refugee shelter, and improvised accommodation [40].

The sample of the present study is comprehensive and provides a large amount of representative data. The

coverage of four years enabled us to identify an increasing trend of homelessness among inpatients in psychiatric hospitals in NRW from 2016 to 2019 (+14%). Whereas half of the total sample as well as of the not homeless subgroup was attributed to the LWL sector, only one third of homeless treatment cases were registered there. If calculated per 100.000 people or treatment cases respectively, the rates differed significantly between hospitals. Since sociodemographic data could only be analyzed with reference to the hospitals' site (instead of the patients' whereabouts), conclusions are limited. The three hospitals with the highest percentage of homeless treatment cases (Düsseldorf, Münster, Cologne) were not congruent with the cities with the largest homeless populations (Bedburg-Hau, Lengerich, Langenfeld), but partly represented the most populated NRW cities (Köln, Düsseldorf, Dortmund) with 360,000 to 1 million inhabitants. Moreover, Cologne and Düsseldorf have the largest train stations in NRW. Homeless patients therefore might not be registered inhabitants of those cities but use the train station as an easily accessible shelter. Homelessness seems often linked not only to the general social support system and the availability of affordable accommodation, but also to the arrangement of such public space [10]. The train station not only offers basic infrastructure (such as sanitary facilities and social services), qualifies as a meeting place to stay without allowance, and represents, albeit precariously, a way of participating in social life [23]. Nevertheless, the large differences in homelessness rates between hospitals cannot be explained satisfactorily. Possibly factors of the local social support system for the homeless and local socioeconomic factors may play a role. Homelessness is often assumed to be an urban phenomenon [8], because homeless people are more numerous, more geographically concentrated, and more visible in urban areas. Today, most of the world's population is concentrated in urban centers. Urban homelessness, especially severe crowding, is the result of poverty and a lack of affordable housing and has risen disproportionately in areas with a shortage of affordable private rental housing and higher median rents [34]. But homelessness and housing exclusion are not just the prerogative of large cities [1].

With a focus on patient-immanent criteria, only one-fifth of our homeless sample was female. This result is congruent with other studies, which assessed male sex as a factor that most markedly differentiated homeless from domiciled patients [31, 32] and found about half (45%: [13] or even two thirds (70%: [24],75,8%: [40] of the homeless patients in psychiatry to be male. When interpreting this male predominance, it has to be taken into account that women more frequently tend to live "undercover" in hidden, insecure accommodation (such as in informal housing conditions, living temporarily with friends, relatives or a partner, living in women's shelters). These women are, therefore, effectively "hidden" from view, are generally not counted as homeless and therefore are not shown in the statistics [6]. At the same time, this group of hidden homeless women is very vulnerable because of reported mental illness, being in local authority care, experience of domestic violence and other forms of abuse and with current drug or alcohol dependencies [6].

Homeless patients in the current study had a mean age of 39.27 years and were on average eight years younger than non-homeless patients. Lauber et al. observed a mean age of 34.4 years in their homeless population (2005) and homeless participants in the WOHIN study were also significantly younger, but it remained unclear whether this was due to the increasing rate of homelessness among mentally ill people or to the increasing mental morbidity among homeless people [39, 40]. The Danish studies considered young age as risk factor for homelessness in psychiatric patients [31] and found their homeless patients to be most often under 45 years of age [32]. Whether the younger age of homeless patients means that homelessness precedes the onset of mental illness (and is therefore not the precursor) or that their mental illness is so severe that they lose their housing within a short period cannot be answered with our current data (no information on first onset of the disorder vs. last date of accommodation). It may be possible that previously homeless persons of higher age have received more extensive psychosocial services and are more often accommodated in (long-term, assisted) housing facilities, whereas younger homeless persons have not received such psychosocial services yet or to a smaller extent and tend to be living more often as homeless and/or they may opt to do so.

In accordance with other studies [24, 31, 32, 39], homeless patients in the present study more often had a diagnosis of psychosis and SUD. Moreover, as observed in the Swiss cohort, the homeless as compared to other psychiatric inpatients had lower rates of affective disorders, but higher rates of having a dual diagnosis [24]. Such dual diagnosis might not only interfere with compliance and treatment itself, but SUD would even occur before onset of homelessness [39] and increase the risk thereof after discharge [30]. The fact that the number of additional psychiatric diagnoses in the homeless sample was significantly higher is compatible with a higher severity of the disorder.

On the other hand, the number of somatic comorbidities in the present study was significantly lower in the group of homeless patients, as seen in Switzerland [24]. Homeless patients did not receive more somatic

consultations during the hospital treatment than patients with a fixed address. The significantly younger age of the homeless persons in our study may explain the low rates of somatic comorbidity. Still, this remains surprising because life on the street represents a major health burden, with evidence of accelerated ageing and high rates of acute and chronic infectious, circulatory, respiratory and musculoskeletal diseases [19, 22]. Again, access to sufficient but low-threshold and continuous medical care may be limited for the homeless and this may lead to underdiagnosis of somatic disorders. Or even if the homeless patients gain access as in our study, their shorter duration of treatment and as observed the high number of patients discharged within one day disables adequate physical examination with blood tests. Longer stays in somatic hospitals have been shown for homeless compared to house patients. But longer discharge delays were only significant in the absence of a psychiatric diagnosis [14]. The present data show this as well and are in accordance with the WOHIN study [40] and the analysis from Switzerland [24], where the length of hospital treatment was significantly shorter in homeless patients, who consecutively improved less [24]. The reasons for the shorter length of stay remain unclear and may include both patient- and service-related aspects. The higher number of 24-hour cases (discharged within one day) may be due to patient-related factors such as a diagnosis of substance use disorder, restlessness as a consequence of homelessness or individual pattern of coping. However, institutional factors also have to be considered and a long-term homeless patient without health insurance, with altered circadian rhythm and adjustment difficulties in strict institutional settings might be discharged earlier back onto the streets without adequate planning.

The present study found no difference between homeless and non-homeless patients in somatic consultations, medical doctor units or social worker units per treatment day and partly corresponds to Lauber et al., who did not observe disproportionate use of inpatient resources by homeless people (2005). Homeless psychiatric patients received or utilized even less staff nurse units per treatment day in this study. Homeless individuals are one socially disadvantaged population, sometimes experiencing stigma and discrimination in their psychosocial and health care seeking. Homeless persons in emergency situations might feel prejudged by clinicians as being drug-seekers. In a recent Canadian narrative inquiry, vulnerably housed individuals believed they received poor quality care or were even denied sufficient care for mental illness and addictions when clinicians became aware of their housing status [15]. Subsequently treatment can be further complicated by psychiatric comorbidities, missed appointments, and a lack of coverage for complementary therapies. Moreover, marginalizing behavior towards and inadequate address of patient's concerns can negatively impact on their overall health-seeking behavior and engagement in the long run [36]. The fact that almost every other of the homeless patients in the present study (44,67%) was admitted outside regular working hours validates this assumption. Moreover, they had a higher rate of involuntary and therefore emergency admissions than non-homeless patients. This finding is in accordance with the Swiss cohort [24]. The predominant involuntary legal status in the homeless group of the present study was the German Law on Help and Protective Measures for Mentally Ill Persons (so-called PsychKG), which includes endangerment of others as potential reason for involuntary admission. The alternative involuntary legal status based on §1906 of the German Civil Law Code (so-called BtG) makes the persons' welfare the most important priority and implies that a patient who refuses the admission to or tries to escape from hospital can be forced to receive clinical treatment if either a risk of endangerment of self exists or their health would be negatively affected. In order to issue an order for mental health care, the court requires not only a legal guardian's application, but also a medical certificate of a treating doctor about the indication and necessity of such court-ordered treatment against the person's will. In other words, to achieve such mandated treatment, some lead-time as well as targeted interdisciplinary cooperation is necessary. Not surprisingly, the rate of BtG admissions was low in the homeless group. Suicidal behavior and physical aggression against others often precede involuntary admission and behavioral aspects such as threats, agitation and physical aggression frequently lead to seclusion and use of restraint. There is no reason why a homeless patients per se would or should be more agitated or aggressive than domiciled patients. The later onset of treatment, a (comorbid) SUD, the feeling of discrimination through health care professionals and the loud, hectic and crowded emergency atmosphere with glaring lights and scarce privacy might nevertheless induce a certain agitation and confusion at the time of admission. Earlier research found that living situation was not associated with coercive measures [27]. Homeless patients in the present study still had more physical restraints, but the number of days with restraint as well as the rate of restraint events per treatment day did not differ between groups. This could be explained by the shorter duration of treatment in the homeless subgroup, but also by the need for restraint immediately following admission as mentioned above. In Contrast to Thomas et al. [41], who found forced medication to be more

likely instituted in psychiatric inpatients who are in a homeless living situation [41], the groups in this study did not differ significantly regarding forced medication (data not shown).

The present study has limitations that need to be taken into account when considering its results. The use of inpatient routine data enabled us to investigate the housing situation of the largest group of German psychiatric inpatients published so far. At the same time, the retrospective nature of this study and the structure of the data only allow limited conclusions. Due to the nature of our data (inpatient data with categories such as "zip code/city" and "place of residency"), the imminent risk of becoming homeless or living in precarious living conditions could not be considered. We had no information on mental and psychosocial care before and after the inpatient stays of the included patients, which might have given important further information about the risk of homelessness. A potential methodological limitation is the lack of standardized assessment and documentation of the housing situation of psychiatric inpatients in the medical records analyzed. We were able to identify the homeless persons by categorizing the documented addresses and zip codes as homeless or non-homeless. However, because there is no standardized documentation field "homeless", we may have slightly underestimated the percentage of homeless patients. Moreover, individual sociodemographic factors (such as income) and the local municipal support that may be available (and its use rate) were not available in our dataset. Such information would shed more light on the full extent of the problem of homelessness in mental healthcare inpatients and would enable specified analyses of the risk factors for homelessness among the mentally ill. Due to the structure of our data, we could only deduce assumptions from the sociodemographic data at the hospitals' sites. This does not represent reality directly, since not all patients (especially not the homeless ones) derive from the hospitals' catchment area, which furthermore can be quite large and inhomogeneous, especially in rural regions. The consideration of the sociodemographic profile of the patient's whereabouts might produce more valid results regarding this aspect, but were not available for analysis.The influence of other important factors (e.g., family background, physical and cognitive development status, education, suicidality and aggressive behavior, treatment variables such as medication or past experiences regarding the healthcare system) on the housing status also could not be investigated because they are not documented in a standardized way or are currently documented in separate documentation systems that were not available in our dataset (such as medication data).

The presented retrospective part of our WohnLos-study considered housing situation prior to hospital admission and the nature of data did not allow analysis of the housing situation after psychiatric hospitalization discharge. Other work packages of this study explicitly dealt with the problem of homelessness as nonmedical reason for hospital discharge delays as well as with post-discharge pathways to subsequent housing (Ueberberg et al., in preparation).

The observed high regional variability of homelessness rates indicates that local factors (e.g., sociodemographic and socioeconomic factors) or the degree of development of the local municipal social support system may interact with individual risk factors at patient level. Further studies are warranted to include such potential local sociodemographic and social support factors with a view to identifying the strength of the relative contributions of these factors towards homelessness among inpatients with mental illness.

Conclusions

Homelessness is an increasing social problem in Western European countries. In Germany, there has been an increase in homelessness in recent years. The coexistence of homelessness and mental disorders is evident. Mental illness is a risk factor for becoming homeless, but homelessness in itself also negatively affects mental health. Our study analyzed the problem of homelessness in a sample of 366,767 inpatient cases in 20 psychiatric hospitals in NRW, Germany, in the years 2016–2019. The routine data analysis established a 2.35% prevalence of homelessness, with vast differences of prevalence between hospitals (range: 0.2–6.3%).

Our analysis found that multiple individual sociodemographic and local factors are associated with the homelessness of psychiatric inpatients. In addition, clinical factors differ between homeless and non-homeless patients, pointing to more severe mental illness and treatment complications (e.g., more coercive measures) in homeless compared to non-homeless persons. Thus, homelessness of psychiatric inpatients can imply special challenges that need to be considered by healthcare providers and politicians, with the goal of optimizing mental and social care and the mental health outcomes of homeless persons.

Abbreviations

DSM-IV: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition; ETHOS: European Typology of Homelessness and Housing Exclusion; ICD-10: International Classification of Diseases, Tenth Revision; LVR: Landschaftsverband Rheinland; LWL: Landschaftsverband Westfalen-Lippe; MAGS: Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales; NRW: North Rhine-Westphalia; PCA: principal component analysis; SUD: Substance Use disorder.

Acknowledgements

The authors gratefully acknowledge the collaborative partners in the psychiatric hospitals of the LWL and LVR.

Authors' contributions
E.G.M. and G.J. designed the study and all authors contributed to the study protocol. I.S.H., I.L., B.Ü. and J.H. managed the collection and preparation of data, I.S.H. and I.L. conducted the analysis and J.Z. supported the interpretation of data. I.S.H. wrote the first draft of the manuscript. All authors contributed to and approved the final manuscript.

Funding
Open Access funding enabled and organized by Projekt DEAL. This work was supported by a research grant from the Ministry of Work, Health and Social Matters of the federal state of North Rhine-Westfalia (Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW).

Availability of data and materials
Aggregated data are available on request. Please contact I.S.H. as corresponding author.

Declarations

Ethics approval and consent to participate
The research has been performed in accordance with the Declaration of Helsinki. The study has been approved by the ethics committee of the North Rhine Medical Association (2019437) and by the medical ethics committee of the Ruhr University Bochum (20-6858). Written consent from all medical directors to conduct the study has been obtained. Due to the analysis of pseudonymized (personally not identifiable) data a written informed consent of all patients was not necessary according to the approving Ethics committees.

Consent for publication
Not applicable.

Competing interests
The authors declare that they have no competing interests.

Author details
[1]LWL Research Institute for Mental Health, Ruhr University Bochum, LWL University Hospital, Bochum, Germany. [2]Department of Psychiatry, Ruhr University Bochum, LWL University Hospital, Alexandrinenstrasse 1, 44791 Bochum, Germany. [3]LVR Institute for Healthcare Research, LVR Institute for Research and Education, Wilhelm-Griesinger-Strasse 23, 51109 Cologne (Köln), Germany. [4]Medical Faculty, Heinrich Heine University, Düsseldorf, Germany. [5]LVR Clinics Cologne, Cologne, Germany.

Received: 20 November 2021 Accepted: 8 February 2022
Published online: 19 February 2022

References

1. Abbé Pierre Foundation and FEANTSA. Sixth Overview of Housing Exclusion in Europe. 2021. (https://www.feantsa.org/public/user/Resources/News/6th_Overview_of_Housing_Exclusion_in_Europe_2021_EN.pdflast accessed 28 Dec 2021).
2. Aldridge RW, Story A, Hwang SW, et al. Morbidity and mortality in homeless individuals, prisoners, sex workers, and individuals with substance use disorders in high-income countries: A systematic review and meta-analysis. Lancet. 2018;391:241–50.
3. Bäuml J, Brönner M, Baur B, Fischer A, Pitschel-Walz G, Jahn T. Die SEEWOLF-Studie Seelische Erkrankungsrate in den Einrichtungen Der Wohnungslosenhilfe Im Großraum München. Gesundheitswesen. 2016;78 - V83. https://doi.org/10.1055/s-0036-1578898.
4. Bruce M, Smith J. Length of stay among multi-ethnic psychiatric inpatients in the United Kingdom. Compr Psychiatry. 2020;102: 152201. https://doi.org/10.1016/j.comppsych.2020.152201.
5. Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe. Zahl der Wohnungslosen in Deutschland. www.bagw.de/de/themen/zahl_der_wohnungslosen/index.html (last accessed 15 Dec 2021).
6. Casey R, Goudie R, Reeve K. Homeless women in public spaces: Strategies of resistance. Hous Stud. 2008;23(6):899–916.
7. Chu CMT, Moodie EEM, Streiner DL, Latimer EA. Trajectories of Homeless Shelter Utilization in the At Home/Chez Soi Trial of Housing First. Psychiatr Serv. 2020;71(7):648–55. https://doi.org/10.1176/appi.ps.201900260.
8. Demaerschalk E, Hermans K, Steenssens K, Van Regenmortel M. Homelessness. Merely an urban phenomenon? Exploring hidden homelessness in rural Belgium. European Journal of Homelessness. 2019;13(1):99–118.
9. DeStatis. https://www.destatis.de/DE/Themen/Laender.Regionen/Regionales/Gemeindeverzeichnis/Administrativ/Archiv/Definition_STL_bis_30122011.pdf? blob=publicationFile (last accessed 15 Dec 2021)
10. Doherty J, Busch-Geertsema V, Karpuskiene V, Korhonen J, O'Sullivan E, Sahlin I, et al. Homelessness and exclusion: regulating public space in European cities. Surveillance & Society. 2008;5(3):290-314.
11. Edgar W, Doherty J, Meert H. Third Review of Statistics on Homelessness in Europe. In: Developing an Operational Definition of Homelessness. Brussels: FEANTSA; 2004.
12. Edgar B, Harrison M, Watson P, Busch-Geertsema V. Measurement of Homelessness at European Union Level. Brussels: European Commission; 2007. (http://ec.europa.eu/employment_social/social_inclusion/docs/2007/study_homelessness_en.pdflast accessed 15 Dec 2021).
13. Elbogen EB, Lanier M, Wagner HR, Tsai J. Financial Strain, Mental Illness, and Homelessness: Results From a National Longitudinal Study. Med Care. 2021;59(Suppl 2):S132–8. https://doi.org/10.1097/MLR.0000000000001453.
14. Feigal J, Park B, Bramante C, Nordgaard C, Menk J, Song J. Homelessness and discharge delays from an urban safety net hospital. Public health. 2014;128(11):1033–1035. https://doi.org/10.1016/j.puhe.2014.06.001.
15. Gilmer C, Buccieri K. Homeless Patients Associate Clinician Bias With Suboptimal Care for Mental Illness, Addictions, and Chronic Pain. J Prim Care Community Health. 2020;11:2150132720910289. https://doi.org/10.1177/2150132720910289.
16. Greenwood RM, Manning RM, O'Shaughnessy BR, Vargas-Moniz MJ, Loubière S, Spinnewijn F, Lenzi M, Wolf JR, Bokszczanin A, Bernad R, Källmén H, Ornelas J, HOME-EU Consortium Study Group. Homeless Adults' Recovery Experiences in Housing First and Traditional Services Programs in Seven European Countries. Am J Community Psychol. 2020;65(3–4):353–68. https://doi.org/10.1002/ajcp.12404.
17. Gureje O, Bamidele R. Thirteen-year social outcome among Nigerian outpatients with schizophrenia. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 1999;34(3):147–51.
18. Gutwinski S, Schreiter S, Deutscher K, Fazel S. The prevalence of mental disorders among homeless people in high-income countries: An updated systematic review and meta-regression analysis. PLoS Med. 2021;18(8):e1003750. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003750.
19. Henwood BF, Lahey J, Rhoades H, Winetrobe H, Wenzel SL. Examining the health status of homeless adults entering permanent supportive housing. J Public Health (Oxf). 2018;40(2):415–8.
20. IGH (Institute of Global Homelessness). https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2019/05/CASEY_Louise_Paper.pdf (last accessed 15 Dec 2021).
21. Jacobi F, Wittchen HU, Holting C, et al. Prevalence, co-morbidity and correlates of mental disorders in the general population: Results from the German Health Interview and Examination Survey (GHS). Psychol Med. 2004;34:597–611.
22. Kaduszkiewicz H, Bochon B, van den Bussche H, Hansmann-Wiest J, van der Leeden C. The medical treatment of homeless people. Dtsch Arztebl Int. 2017;114(40):673–9.
23. Kesselring, A. / Bohonnek, A. / Smoliner, S. (2013): HOPE in stations: Homeless People in European train stations. Final evaluation report (Paris: ANSA) http://www.garesolidaire.net/attachments/Rapporto_finale_Hope_in_stations_EN.pdf last accessed on 15 Dec 2021
24. Lauber C, Lay B, Rössler W. Homelessness among people with severe mental illness in Switzerland. Swiss Med Wkly. 2005;135(3–4):50–6.
25. Lévesque IS, Abdel-Baki A. Homeless youth with first-episode psychosis: A 2-year outcome study. Schizophr Res. 2020;216:460–9. https://doi.org/10.1016/j.schres.2019.10.031.
26. MAGS (Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales). http://www.sozialberichte.nrw.de/sozialberichterstattung_nrw/kurzanalysen/Kurzanalyse-2-2021.pdf last accessed 15 Dec 2021

27. McLaughlin P, Giacco D, Priebe S. Use of Coercive Measures during Involuntary Psychiatric Admission and Treatment Outcomes: Data from a Prospective Study across 10 European Countries. PloS one. 2016;11(12):e0168720. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0168720.
28. Moloney N, O'Donnell P, Elzain M, Bashir A, Dunne CP, Kelly BD, Gulati G. Homelessness amongst psychiatric Inpatients: a cross-sectional study in the mid-west of Ireland. Ir J Med Sci. 2021. https://doi.org/10.1007/s11845-021-02546-x.
29. Nielsen SF, Hjorthøj CR, Erlangsen A, Nordentoft M. Psychiatric disorders and mortality among people in homeless shelters in Denmark: A nationwide register-based cohort study. Lancet. 2011;377:2205–14.
30. Nilsson SF, Laursen TM, Hjorthøj C, Nordentoft M. Risk of homelessness after discharge from psychiatric wards in Denmark: a nationwide register-based cohort study. Acta Psychiatr Scand. 2019;140(5):477–89. https://doi.org/10.1111/acps.13082.
31. Nordentoft M, Knudsen HC, Jessen-Petersen B, Krasnik A, Saelan H, Brodersen AM, Treufeldt P, Løppenthin P, Sahl I, Ostergård P. Copenhagen Community Psychiatric Project (CCPP): characteristics and treatment of homeless patients in the psychiatric services after introduction of community mental health centres. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 1997;32(7):369–78. https://doi.org/10.1007/BF00788176.
32. Nordentoft M, Knudsen HC, Schulsinger F. Housing conditions and residential needs of psychiatric patients in Copenhagen. Acta Psychiatr Scand. 1992;85:385–9.
33. Onofa L, Fatiregun AA, Fawole OI, Adebowale T. Comparison of clinical profiles and treatment outcomes between vagrant and non-vagrant mentally ill patients in a specialist neuropsychiatric hospital in Nigeria. Afr J Psychiatry (Johannesbg). 2012;15(3):189–92. https://doi.org/10.4314/ajpsy.v15i3.25.
34. Parkinson S, Batterham D, Reynolds M, Wood G. (2019) The changing geography of homelessness: a spatial analysis from 2001 to 2016, AHURI Final Report No. 313, Australian Housing and Urban Research Institute Limited, Melbourne, https://doi.org/10.18408/ahuri-5119601 https://www.ahuri.edu.au/research/final-reports/313 last accessed 28 Dec 2021
35. Peng Y, Hahn RA, Finnie RKC, Cobb J, Williams SP, Fielding JE, Johnson RL, Montgomery AE, Schwartz AF, Muntaner C, Garrison VH, Jean-Francois B, Truman BI, Fullilove MT, Community Preventive Services Task Force. Permanent Supportive Housing With Housing First to Reduce Homelessness and Promote Health Among Homeless Populations With Disability: A Community Guide Systematic Review. J Public Health Manag Pract. 2020;26(5):404–11. https://doi.org/10.1097/PHH.0000000000001219.
36. Rae BE, Rees S. The perceptions of homeless people regarding their healthcare needs and experiences of receiving health care. J Adv Nurs. 2015;71(9):2096–107. https://doi.org/10.1111/jan.12675.
37. Ran MS, Chan CL, Chen EY, Xiang MZ, Caine ED, Conwell Y. Homelessness among patients with schizophrenia in rural China: a 10-year cohort study. Acta Psychiatr Scand. 2006;114(2):118–23. https://doi.org/10.1111/j.1600-0447.2006.00746.x.
38. Schreiter S, Bermpohl F, Krausz M, et al. The prevalence of mental illness in homeless people in Germany. Dtsch Arztebl Int. 2017;114(40):665–72. https://doi.org/10.3238/arztebl.2017.0665.
39. Schreiter S, Fritz FD, Rössler W, Majić T, Schouler-Ocak M, Krausz MR, Bermpohl F, Gutwinski S. Wohnsituation von Menschen mit Substanzgebrauchsstörungen im akut-psychiatrischen Behandlungssetting in Berlin – eine querschnittliche Patientenbefragung [Housing Situation Among People with Substance Use Disorder in a Psychiatric Centre in Berlin, Germany - A Cross-Sectional Patient Survey]. Psychiatr Prax. 2021;48(3):156–60.
40. Schreiter S, Heidrich S, Zulauf J, et al. Housing situation and healthcare for patients in a psychiatric centre in Berlin, Germany: A cross-sectional patient survey. BMJ Open. 2019;9:e032576.
41. Thomas TE, Lane SD, Elkhatib RM, Hamilton JE, Pigott TA. Race, History of Abuse, and Homelessness Are Associated With Forced Medication Administration During Psychiatric Inpatient Care. J Psychiatr Pract. 2020;26(4):294–304. https://doi.org/10.1097/PRA.0000000000000485.
42. Tsemberis S, Eisenberg RF. Pathways to housing: supported housing for street-dwelling homeless individuals with psychiatric disabilities. Psychiatr Serv. 2000;51(4):487–93. https://doi.org/10.1176/appi.ps.51.4.487.
43. Tulloch AD, Fearon P, David AS. Timing, prevalence, determinants and outcomes of homelessness among patients admitted to acute psychiatric wards. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2012;47(7):1181–91. https://doi.org/10.1007/s00127-011-0414-4.
44. Wang L, Zhang Z, Yan Q, Lu J, Gao B, Zhao Y, Pang Y. Diagnostic dilemma of pulmonary tuberculosis among adults with severe mental illness in Beijing, China. BMC Infect Dis. 2017;17(1):83. https://doi.org/10.1186/s12879-017-2190-6.
45. Wessel T, Pörksen N, Zechert C. Wohnungslose Patienten in der Psychiatrischen Klinik. Psychiatr Prax. 1997;24:167–71.

Publisher's Note

Springer Nature remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.

Ready to submit your research? Choose BMC and benefit from:

- fast, convenient online submission
- thorough peer review by experienced researchers in your field
- rapid publication on acceptance
- support for research data, including large and complex data types
- gold Open Access which fosters wider collaboration and increased citations
- maximum visibility for your research: over 100M website views per year

At BMC, research is always in progress.

Learn more biomedcentral.com/submissions



Online publiziert: 26.01.2022

Thieme

Psychosoziale Komplexbetreuung bei schwerer psychischer Erkrankung: Implementierung und Begleitevaluation eines sektorübergreifenden Versorgungsmodells an einem psychiatrischen Fachkrankenhaus

Person-Centered Psychosocial Complex Care for People with Severe Mental Illness: Implementation and Evaluation of a Cross-Sectoral Care Model at a Psychiatric Hospital

Autoren

Isabelle Reinhardt[1], Josephine Heinz[1], Jürgen Zielasek[1], Sandra Engemann[1], Euphrosyne Gouzoulis-Mayfrank[1,2]

Institute

1 LVR-Institut für Forschung und Bildung, LVR-Institut für Versorgungsforschung
2 LVR-Klinik Köln, Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität zu Köln

Schlüsselwörter

schwere psychische Erkrankung, sektorübergreifende Versorgung, psychosoziales Versorgungsmodell, Zwangsaufnahmen

Keywords

severe mental illness, cross-sectoral care, psychosocial care model, compulsory admissions

Bibliografie

Psychiat Prax
DOI 10.1055/a-1706-0217
ISSN 0303-4259
© 2022. Thieme. All rights reserved.
Georg Thieme Verlag KG, Rüdigerstraße 14, 70469 Stuttgart, Germany

Korrespondenzadresse

Dr. Isabelle Reinhardt, LVR-Institut für Forschung und Bildung, LVR-Institut für Versorgungsforschung, Wilhelm-Griesinger-Straße 23, 51109 Köln, Deutschland
isabelle.reinhardt@lvr.de

ZUSAMMENFASSUNG

Studienziel Implementierung und Evaluation eines sektorübergreifenden Komplexmodells für Menschen mit schwerer psychischer Erkrankung („severe mental illness“, SMI).
Methodik Das Versorgungsmodell wurde an einer psychiatrisch-psychotherapeutischen Fachklinik implementiert. Mithilfe eines intensiven Fallmanagements setzte das patientenzentrierte und bedarfsorientierte Komplexmodell für Menschen mit SMI am Übergang zwischen stationärer und ambulanter Behandlung an. Die Evaluation erfolgte mittels einer gematchten Kontrollgruppe (Interventionsgruppe: n = 46; Kontrollgruppe: n = 21).
Ergebnisse Nach klinischer Einschätzung profitierten zwei Drittel der Patient*innen vom Versorgungsmodell. Bei den Betroffenen zeigte sich im Behandlungsverlauf eine signifikante Reduktion der Inanspruchnahme stationär-psychiatrischer Versorgungsstrukturen sowie eine Verbesserung der klinischen Symptomatik.
Schlussfolgerung Für Menschen mit SMI besteht eine Versorgungslücke beim Übergang von der stationären in die ambulante Versorgung, die durch das Versorgungsmodell partiell geschlossen werden konnte.

ABSTRACT

Aim of the study Implementation and evaluation of a cross-sectoral complex care model for persons with severe mental illness (SMI).
Methods The care model was implemented at a psychiatric-psychotherapeutic specialized clinic. Within this patient-centered and needs-oriented complex care model, intensive case management was applied to transition persons with SMI between inpatient and outpatient mental health care. Evaluation was conducted using a matched control group design (n = 46/21).
Results According to clinical assessment, two thirds of the patients benefited from the care model. In the course of treatment, the patients showed a significant reduction in the use of inpatient psychiatric care structures and an improvement in clinical symptoms.
Conclusion For people with SMI, there is a care gap in the in the transition from inpatient to outpatient care, which could be partially closed.

Heruntergeladen von: LVR-Klinik Köln. Urheberrechtlich geschützt.

Einleitung

„Menschen mit einer schweren psychischen Erkrankung (‚severe mental illness', SMI) haben […] komplexe Behandlungsbedarfe [die] oft mit einer intensiven Inanspruchnahme medizinischer und psychosozialer Hilfen verbunden sind." ([1], S. 5). Die Versorgung von Menschen mit SMI ist durch häufige Akutaufnahmen in psychiatrischen Kliniken [2], Zwangsunterbringungen [3] und freiheitseinschränkenden Maßnahmen während stationärer Aufenthalte [4] belastet, während die Sicherstellung der längerfristigen ambulanten Behandlung oft schwierig ist [2].

Während sich international in der ambulanten Versorgung von Menschen mit SMI einige Ansätze als erfolgreich herausgestellt haben (z. B. [5, 6]), existieren in Deutschland (noch) keine flächendeckenden intensivierten ambulanten Versorgungsstrukturen für die Betroffenen. Aus Modellvorhaben gibt es Hinweise auf eine Reduktion stationärer Behandlungstage (z. B. [7, 8]) und Zwangsmaßnahmen [9]. Die Modelle wurden bislang jedoch nicht über die jeweilige Modellregion wesentlich hinausgehend umgesetzt und waren meist nur für bestimmte Patient*innengruppen vorgesehen [10]. Stationsersetzende Versorgungsmodelle (z. B. Home Treatment, stationsäquivalente Behandlung) konnten sich bislang ebenfalls nicht flächenhaft durchsetzen [11]. Psychiatrische Institutsambulanzen können aufgrund ihrer überwiegend limitierten und pauschalierten Finanzierung den intensiven Versorgungsbedarf von Menschen mit SMI meistens nicht decken. Gemeindepsychiatrische Modelle fokussieren auf die psychosoziale Betreuung im außerklinischen Bereich und sehen die Klinik allenfalls als die letzte Möglichkeit der Krisenhilfe [12–15]. Bei klinikbasierten Modellen mit Elementen von Home Treatment und intensivierter ambulanter Betreuung ist die soziale Teilhabe seltener im Fokus (z. B. [16]). Schließlich wird die Versorgung somatischer Komorbiditäten – obwohl dringend erforderlich [17] – häufig nicht ausreichend berücksichtigt.

Vor diesem Hintergrund wurde ein bedarfsorientiertes und personenzentriertes, sektorübergreifendes, *psy*chosoziales *Kom*plexbetreuungsmodell *(PsyKom-Modell)* für Menschen mit SMI entwickelt, implementiert und begleitend evaluiert. Das PsyKom-Modell setzte am Übergang zwischen stationärer und ambulanter Behandlung an. Hauptziele waren die Reduktion stationärer Wiederaufnahmen und Zwangsaufnahmen, die klinische Besserung und Stabilisierung der Betroffenen sowie eine verbesserte soziale Teilhabe. Nach erfolgter Stabilisierung sollte eine Überleitung in die ambulante Regelversorgung vollzogen werden können, ohne dass es zu einer erneuten Dekompensation kommt.

Das PsyKom-Modell wurde im Rahmen eines vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS) des Landes Nordrhein-Westfalen geförderten Projekts von 2017 bis 2020 entwickelt und implementiert. Die Begleitevaluation wurde von der zuständigen Ethikkommission (Ärztekammer Nordrhein) beraten.

Methoden

Setting

Die Implementierung erfolgte in einer für ca. 600 000 Einwohner*innen einer Großstadt zuständigen psychiatrisch-psychotherapeutischen Fachklinik der regionalen Pflichtversorgung. Das Modell wurde in einem Teilbereich einer Abteilung für Allgemeine Psychiatrie und Psychotherapie umgesetzt (eine geschützte Aufnahmestation und eine offen geführte, sozialpsychiatrisch ausgerichtete Station sowie die Institutsambulanz). Pro Jahr versorgen die beiden beteiligten Stationen ca. 1228 voll- und teilstationäre Fälle. Die zu der Abteilung zählende Institutsambulanz versorgt jährlich ca. 3665 ambulante Patient*innen.

Zielgruppe

In das Modell wurden Menschen mit SMI aufgenommen, die mindestens 2 der folgenden Kriterien erfüllten, darunter obligat Kriterium 1 oder Kriterium 2: 1) mindestens ein unfreiwilliger stationär-psychiatrischer Aufenthalt in den vergangenen 12 Monaten; 2) erhebliche Beeinträchtigung der selbstständigen Inanspruchnahme von Hilfemaßnahmen oder der Teilhabe; 3) hoher individueller psychosozialer Unterstützungsbedarf; 4) Komorbidität von psychischer und somatischer Erkrankung; 5) Risiko für forensische oder öffentlich-rechtliche Zwangsunterbringung; 6) häufige regel- oder grenzüberschreitende Verhaltensweisen; 7) eingeschränkte Funktionsfähigkeit (GAF-Wert < 50).

Versorgungsmodell

Das PsyKom-Modell setzte vornehmlich am Übergang von der stationären zur ambulanten Weiterbehandlung an [18]. Die meisten Patient*innen wurden noch während des stationären Aufenthalts rekrutiert und sie willigten zur Teilnahme am Versorgungsmodell und der Evaluation im Rahmen der Studie ein. Im Rahmen des Modells wurden die Patient*innen sektorübergreifend – zumeist in personeller Kontinuität – von ausgewähltem Stationspersonal in den ambulanten Bereich hinein weiterbetreut. Zentrales Element war ein intensives Fallmanagement, das die Leistungen bedarfsgerecht auf der Grundlage eines individuellen, partizipativ mit dem/der Betroffenen erstellten Hilfeplans (IHP) steuerte und koordinierte. Diese Funktion übernahmen Pflegekräfte und/oder Sozialarbeiter*innen (*Kom*plex*be*treuende: „KOBs"), die sich neben ihrer Haupttätigkeit im stationären Setting auch im PsyKom-Projekt engagierten. Sie waren den Betroffenen häufig bereits aus vorhergehenden stationären Aufenthalten bekannt und vertraut. Die KOBs waren mit insgesamt 2 Vollzeitstellen tätig (verteilt auf 2 Sozialarbeitende, 6 Pflegekräfte und 1 Facharzt). Der Arbeitsumfang der KOBs im PsyKom-Projekt variierte zwischen 4–19 Wochenstunden. Die Intensität der Betreuung war zu Beginn der Intervention meist am stärksten, wenn notwendig, konnten mehrfach in der Woche aufsuchende Kontakte stattfinden. Die KOBs wurden durch eine Fachärztin und einen externen Supervisor supervidiert.

Die benötigten Unterstützungsleistungen wurden gemeinsam mit den Betroffenen identifiziert und durch die KOBs – teils

Heruntergeladen von: LVR-Klinik Köln. Urheberrechtlich geschützt.

in Klinikräumen und teils aufsuchend im Lebensumfeld der Patient*innen – erbracht. Die Leistungen umfassten ein effektives Medikamenten- und Nebenwirkungsmanagement, die Koordination somatischer Versorgungsbedarfe, die Vermittlung psychotherapeutischer und psychoedukativer Elemente, ein zielorientiertes Skills-Training, die Arbeit im sozialen Umfeld, Angehörigenarbeit, den Einbezug komplementärer Dienste und Versorgungskoordination sowie die Zusammenführung von Ressourcen aus SGB V und SGB IX. Ausdrücklich möglich war dabei auch eine niederschwellige Unterstützung und Begleitung durch die KOBs im Alltag der Betroffenen, z. B. beim Einkaufen, bei der Wohnungssuche, bis hin zu einer dringlichen Wohnungsrenovierung. Bei Kontaktlatenzen erfolgte proaktiv die Kontaktaufnahme seitens der KOBs. Es wurde eine individuelle Behandlungsdauer und -dichte ermittelt, die bedarfsorientiert im Zeitverlauf angepasst wurde. Bei erfolgreichem Verlauf und ausreichender Stabilisierung erfolgte die Beendigung der PsyKom-Behandlung und Überleitung in die ambulante Regelversorgung.

Evaluation

Die Evaluation wurde mithilfe einer gematchten Kontrollgruppe durchgeführt. Die Interventionsgruppe wurde zwischen September 2017 bis Dezember 2018 gemäß der Ein- und Ausschlusskriterien für die Aufnahme in die Komplexbehandlung durch die KOBs rekrutiert. Die Teilnahme an der Evaluation war Teil der Einwilligung zur Studie, Patient*innen wurden jedoch nicht vom Versorgungmodell ausgeschlossen, wenn sie an der Fragebogenerhebung nicht teilnehmen wollten oder konnten. Die Kontrollgruppe wurde im Zeitraum von April bis Dezember 2018 in einer anderen Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie dieser Klinik rekrutiert, in der das Versorgungsmodell nicht eingeführt worden war. Hierfür wurden Matching-Kriterien vorab festgelegt (Hauptdiagnose; Anzahl stationär-psychiatrischer Behandlungstage in den letzten 24 Monaten [<100 Tage vs. >100 Tage]). Die Endpunkte wurden in Bezug auf die oben genannten Ziele des Modells vorab definiert und operationalisiert.

Datenerhebung

Die Datenerhebung erfolgte zu 3 Messzeitpunkten (vor Einschluss in das Modell [t_0] sowie 12 und 18 Monate später [t_{12} und t_{18}]). Sie umfasste Routinedaten aus dem elektronischen Krankenhausinformationssystem (Anzahl Wiederaufnahmen und stationäre Behandlungstage in der sektorversorgenden Klinik), klinische Fremdbeurteilungen durch die Behandelnden (GAF [19] und CGI [20]) sowie Fragebogenerhebungen bei den Patient*innen (Soziodemografische Daten, Behandlungszufriedenheit [21], Lebenszufriedenheit [22], Soziale Inklusion und Teilhabe [23]). Nach Beendigung der PsyKom-Behandlung gaben die KOBs – wann immer möglich gemeinsam mit den Patient*innen – eine globale Bewertung der Behandlung ab. Grundlage für die Einteilung in erfolgreiche, teilweise erfolgreiche oder nicht erfolgreiche Behandlung war die Bewertung der Erreichung der zuvor gemeinsam entwickelten und im Behandlungsplan festgehaltenen Ziele. Die Bewertung wurde nach Abschluss der Behandlung im Behandlungsteam diskutiert und konsentiert. Schließlich fand eine anonyme schriftliche Befragung der KOBs kurz nach Projektstart (‚Erwartungen an das Modell') und 12 Monate später (‚Erfahrungen mit dem Modell') statt.

Datenauswertung

Die Daten wurden mittels SPSS 25 ausgewertet. Häufigkeiten bei nominalskalierten Variablen wurden mittels Chi-Quadrat-Test berechnet. Für Prä-Post-Vergleiche bei verbundenen Stichproben wurde der Wilcoxon- bzw. der Friedmann-Test genutzt. Gruppenvergleiche wurden mithilfe des Mann-Whitney-U-Test berechnet, bei mehreren Messzeitpunkten wurden gemischte zweifaktorielle Varianzanalysen (‚mixed ANOVA') berechnet, da das Verfahren als ausreichend robust gegenüber Verletzungen der Normalverteilungen gilt [24]. Die Effektstärke r wurde aus den Prüfgrößen und den Stichprobengrößen berechnet [25]. Berichtet werden Analysen nach dem Intention-to-treat Prinzip (ITT), wobei fehlende Werte mithilfe eines einfachen Imputationsverfahrens (LOCF) ersetzt wurden. Zusätzlich erfolgten Analysen nach Ausschluss der Drop-outs (Treatment per Protocol, TPP). Alle statistischen Verfahren wurden mit zweiseitiger Testung verwendet. Ein Fehler I. Ordnung unter 5 % ($p < 0{,}05$) wurde als statistische Signifikanz der beobachteten Gruppenunterschiede interpretiert.

Ergebnisse

Beschreibung der Interventions- und Kontrollgruppe bei Studieneinschluss

Insgesamt wurden 46 Patient*innen für das PsyKom-Modell rekrutiert. Die Rekrutierung der Kontrollgruppe war schwierig, da diese Patient*innen im Gegensatz zur Interventionsgruppe keinen Mehrwert aus der Studie für sich ausmachen konnten. Schließlich musste die Rekrutierung bei 21 Kontrollpatient*innen beendet werden. Die Daten bei Einschluss in die Untersuchung (▶ **Tab. 1**) zeigen, dass sich die 2 Gruppen trotz Matching in einigen Variablen zuugunsten der Interventionsgruppe unterschieden.

Klinische Bewertung des Behandlungserfolgs in der Interventionsgruppe

Die 46 Patient*innen der Interventionsgruppe verblieben durchschnittlich 15 ± 9 Monate im Versorgungsmodell (456 ± 278 Tage; Median 483 Tage; Spannbreite 1–890 Tage). Die durchschnittliche Betreuungsintensität durch die KOBs betrug ca. 3,5 Stunden pro Patient*in pro Woche. Nach Abschluss des Projekts wurden die Patient*innen durch das KOB-Betreuungsteam und die supervidierende Fachärztin überwiegend gemeinsam mit den Patient*innen je nach Zielerreichung in 3 Kategorien eingeteilt (▶ **Tab. 2**).

29 von 46 Fällen (63 %) wurden als erfolgreich (Kategorie A: Behandlungsziele erreicht oder überwiegend erreicht und erfolgreiche Überleitung in die ambulante Regelversorgung) oder zumindest in Teilen erfolgreich bewertet (Kategorie B). Die anhand des individuellen Hilfeplans gemeinsam mit den Patient*innen vereinbarten Behandlungsziele umfassten psychosoziale Bereiche (z. B. Verbesserung der Wohnsituation, Krisen-

Heruntergeladen von: LVR-Klinik Köln. Urheberrechtlich geschützt.

▶ **Tab. 1** Beschreibung der Stichprobe bei Studieneinschluss.

	Interventionsgruppe		Kontrollgruppe		p
soziodemografische Angaben					
Alter (MW; SD)	41	12	41	13	0,887
Geschlecht: weiblich *(n; %)*	20	44	9	43	0,962
höchster Schulabschluss: ohne/gering *(n; %)*	22	47,8	11	52,4	0,776
aktuelle berufliche Situation: arbeitslos *(n; %)*	21	45,6	11	52,4	0,144
Lebensunterhalt: ALG II/Hartz IV *(n; %)*	20	43,5	9	45,0	0,585
Migrationshintergrund *(n; %)* eigene Migrationserfahrung kein Migrationshintergrund	 8 20	 17,4 43,5	 2 14	 9,5 66,7	0,470
Wohnsituation (letzte 6 Monate) *(n; %)* eigene Wohnung wohnungslos	 25 3	 54,3 6,5	 8 3	 38,1 14,3	0,138
Paarbeziehung: alleinstehend *(n; %)*	32	69,6	13	61,9	0,565
klinische Charakteristika					
Hauptdiagnosegruppe nach ICD-10 *(n; %)* F1 (Sucht) F2 (Psychose) F3 (Affektive Störung) F6 (Persönlichkeitsstörung)	 0 35 5 6	 – 76,1 10,9 13,0	 1 16 3 1	 4,8 76,2 14,3 4,8	0,351
Anzahl Nebendiagnosen *(MW; SD)*	2,2	1,6	1,2	1,5	**0,008**
davon **psychiatrische Nebendiagnosen** (F-Diagnosen) *(MW; SD)*	1,3	1,1	0,8	1,1	**0,018**
davon **somatische Nebendiagnosen** (nicht F-Diagnosen) *(MW; SD)*	0,9	1,3	0,4	0,8	0,127
Funktionsniveau (GAF), *(MW; SD)*	29	9,5	36	12,5	**0,017**
Schweregrad (CGI), *(MW; SD)*	2,2	0,8	2,8	0,6	**0,006**
Fragebogenerhebung (Selbstbeurteilung)					
Behandlungszufriedenheit (ZUF-8) *(MW; SD)*	24,2	5,0	24,7	4,4	0,707
Lebensqualität (WHOQOL-BREF), Gesamtskala *(MW; SD)*	82,1	15,8	82,7	19,1	0,819
Lebensqualität (WHOQOL-BREF), Unterskala psychische Gesundheit *(MW; SD)*	56,8	20,2	53,8	24,0	0,903
Anzahl Kontaktpersonen (F-INK) *(MW; SD)*	4,4	2,3	6,2	2,6	**0,022**
Inklusion (F-INK) *(MW; SD)*	1,7	0,6	1,9	0,6	0,323
Partizipation (F-INK) *(MW; SD)*	0,8	0,3	0,9	0,4	0,731
frühere stationäre Behandlungen (Routinedaten)	**Interventionsgruppe**		**Kontrollgruppe**		**p**
	MW (*Mdn*)	SD (range)	MW (*Mdn*)	SD (range)	p
durchschnittliche Anzahl stationärer Behandlungstage (letzte 12 Monate)	119 (106)	76 (0–337)	72 (69)	60 (8–225)	**0,007**
davon **durchschnittliche Anzahl stationärer Behandlungstage** mit **Zwangsunterbringung**	59 (46)	61 (0–316)	32 (14)	40 (0–118)	**0,041**
durchschnittliche Anzahl stationärer Aufenthalte (letzte 12 Monate)	4 (3)	3,7 (0–18)	3 (2)	2,3 (1–9)	**0,039**
davon **durchschnittliche Anzahl stationärer Aufenthalte** mit **Zwangsunterbringung**	2 (2)	1,7 (0–7)	1 (1)	1,5 (0–5)	**0,022**

MW = Mittelwert; n = Anzahl; SD = Standardabweichung; p = Signifikanz; *Mdn* = Median; range = Spannbreite

Heruntergeladen von: LVR-Klinik Köln. Urheberrechtlich geschützt.

▶ **Tab. 2** Einteilung der Patient*innen der Interventionsgruppe hinsichtlich des Behandlungserfolgs (Bewertung der KOBs, überwiegend in Abstimmung mit Patient*innen).

Kategorie	Anzahl Patient*innen von 46 (n, %)	klinische Bewertung	Verweildauer (in Tagen)	
			n (SD)	Mdn (range)
A	26 (56,5)	erfolgreiche/weitgehend erfolgreiche und mit der Überleitung in die ambulante Regelversorgung regelhaft abgeschlossene PsyKom-Behandlung	545 (242)	599 (97–890)
B	3 (6,5)	in Teilen erfolgreiche PsyKom-Behandlung und/oder keine erfolgreiche Überleitung in die ambulante Regelversorgung	785 (42)	786 (754–832)
C	17 (37)	PsyKom-Behandlung ohne Erfolg/Drop-out	265 (245)	293 (1–757)

n = Anzahl; % = Prozent; SD = Standardabweichung; Mdn = Median; range = Spannbreite

hilfe, Bereitstellung dauerhafter ambulanter psychosozialer Hilfen), medizinisch-therapeutische Aspekte (z. B. Symptomreduktion, Motivation zur Suchtmittelabstinenz, Aufbau einer Tagesstruktur, Sicherung oder Wiederherstellung der körperlichen Gesundheit) sowie individuelle Ziele (z. B. Förderung sozialer/familiärer Kontakte). Die Hilfen wirkten sich nach klinischer Einschätzung auch positiv auf die körperliche Gesundheit der Betroffenen aus. Als wesentliche Wirkfaktoren des vorliegenden Modells wurden die Behandlungsintensität und -dauer sowie die (personelle) Behandlungskontinuität und Patient*innenzentrierung betrachtet.

In 17 Fällen (37 %) war die Behandlung ohne Erfolg bzw. sie wurde – teilweise sehr rasch nach der Entlassung – durch die Betroffenen abgebrochen (Drop-out). In 2 Fällen wurde die Komplexbehandlung seitens der KOBs beendet. Grund hierfür waren nicht tolerierbare, grenzüberschreitende Verhaltensweisen seitens der Patient*innen. Wesentliche den Behandlungserfolg limitierende Faktoren waren aus Sicht der Komplexbetreuenden eine diskontinuierliche Medikamenteneinnahme, fortgesetzter Suchtmittelkonsum, aber auch psychosoziale Faktoren wie Wohnungslosigkeit und/oder prekäre Wohnverhältnisse und fehlende soziale Unterstützung [26]. Bei 3 Patient*innen gelang auch nach sehr langer Dauer im Modell keine adäquate Überleitung in die Regelversorgung, schließlich endete bei diesen Patient*innen die Behandlung aufgrund der begrenzten Projektdauer.

Klinischer Verlauf und Versorgungsverlauf

Stationäre Aufenthalte und Behandlungstage (Routinedaten)

Im Vergleich der 3 Messzeitpunkte (t_0, t_{12}, t_{18}) der Interventionsgruppe zeigten sich signifikante Reduktionen der stationär-psychiatrischen Behandlungstage und der Aufenthalte, jeweils gesamt und mit Zwangsunterbringung. Post-hoc-Tests zeigten signifikante Unterschiede zwischen Einschluss in das Versorgungsmodell (t_0) und t_{12} sowie zwischen t_0 und t_{18}. Die Unterschiede zwischen t_{12} und t_{18} waren statistisch nicht signifikant (▶ **Tab. 3**).

Im Gruppenvergleich über alle 3 Messzeitpunkte zeigten sich signifikante Haupteffekte, die Interaktionseffekte blieben jedoch unter dem Signifikanzniveau. Lediglich bei den stationär-psychiatrischen Behandlungstagen zeigte sich ein Trend in Richtung einer stärkeren Reduktion bei der Interventionsgruppe ($p = 0{,}09$). Da der Messzeitpunkt t_{18} bei 33 % der Patient*innen der Kontrollgruppe (und bei 6,5 % der Interventionsgruppe) mit der ersten Welle der COVID-19-Pandemie zusammenfiel (Zeitraum März–Juni 2020), wurde eine Zusatzanalyse ohne den t_{18}-Messzeitpunkt durchgeführt, um den konfundierenden Faktor der Pandemie mit ihren erheblichen Veränderungen hinsichtlich Versorgungsangeboten der Klinik und Inanspruchnahmeverhalten der Patient*innen auszugrenzen. Dabei zeigte sich eine signifikante Interaktion bei der Anzahl der stationär-psychiatrischen Behandlungstage. Eine Kontrastanalyse zeigte eine signifikante Reduktion der stationären Behandlungstage von t_0 zu t_{12} in der Interventionsgruppe ($p = 0{,}01$), aber nicht in der Kontrollgruppe ($p = 0{,}40$) (▶ **Tab. 3**).

Funktionsniveau und klinischer Gesamteindruck (Fremdbeurteilung)

Die Beurteilungen der Behandelnden liegen zu t_0 für 44 Patient*innen der Interventionsgruppe (96 %) und 19 Patient*innen der Kontrollgruppe (90 %) vor. Bei insgesamt 4 Patient*innen wurde die Dokumentation seitens der Behandelnden zu t_0 versäumt. Zu t_{12} liegen die Beurteilungen bei 36 PsyKom- (78 %) und 5 Kontrollpatient*innen (24 %) vor; und zu t_{18} bei 9 PsyKom- (20 %) und 0 Kontrollpatient*innen. Hauptgründe für fehlende Werte war ein Kontaktabbruch oder diskontinuierliche Kontaktgestaltung seitens der Betroffenen, oder aber die Behandlung war abgeschlossen und Patient*innen konnte nicht mehr erreicht werden. Der t_{18}-Messzeitpunkt wurde aufgrund der hohen Anzahl fehlender Werte nicht in die Auswertung einbezogen. Patient*innen der Interventionsgruppe wiesen im Prä-Post-Vergleich (t_0–t_{12}) eine signifikante Verbesserung des Funktionsniveaus und eine signifikante Verringerung des Schweregrads der Erkrankung auf. Im Gruppenvergleich über 2 Messzeitpunkte (t_0, t_{12}) zeigte sich eine signifikante Interaktion beim Schweregrad der Erkrankung: Die Interventionsgruppe zeigte eine stärkere Verbesserung des Schweregrads der Erkrankung im Vergleich zu der Kontrollgruppe (▶ **Tab. 4**). Die Er-

Heruntergeladen von: LVR-Klinik Köln. Urheberrechtlich geschützt.

▶ **Tab. 3** Versorgungsverlauf: stationär-psychiatrische Behandlungstage (durchschnittliche monatliche Verweildauer) und Anzahl stationärer Aufenthalte.

	Interventionsgruppe (n = 46)			**Kontrollgruppe (n = 21)**			**ANOVA (t_0/t_{12}/t_{18}; nur Interventionsgruppe)**				**Mixed ANOVA (t_0/t_{12}/t_{18}; beide Gruppen)**			**Mixed ANOVA (t_0/t_{12}; beide Gruppen)**		
	t_0	**t_{12}**	**t_{18}**	**t_0**	**t_{12}**	**t_{18}**	**Test**	**Sign.**	**Post-hoc Test**	**Test; Effektstärke**	**Zeit x Gruppe**	**Zeit**	**Gruppe**	**Zeit x Gruppe**	**Zeit**	**Gruppe**
	MW (SD)	**MW (SD)**	**MW (SD)**	**MW (SD)**	**MW (SD)**	**MW (SD)**	**χ^2**	**p**			**F p**	**F p**	**F p**	**F p**	**F p**	**F p**
durchschnittliche monatliche stationäre **Verweildauer**[*1]	9,9 (6,4)	7,2 (8,8)	5,7 (8,9)	6,0 (5,0)	7,4 (6,9)	5,0 (7,9)	23,4	**0,001**	**t_0–t_{12}: 0,001**	$\chi^2 = 3,43$; r = 0,28	2,5 0,09	**3,8 0,03**	0,7 0,40	**4,6 0,04**	0,50 0,48	1,26 0,27
									t_{12}–t_{18}: 0,292	–						
									t_0–t_{18}: 0,001	$\chi^2 = 4,48$; r = 0,32						
davon durchschnittliche monatliche stationäre Verweildauer **mit Zwangsunterbringung**[*1]	4,9 (5,0)	1,9 (4,7)	2,2 (4,7)	2,6 (3,4)	1,6 (3,3)	0,8 (1,7)	26,9	**0,001**	**t_0–t_{12}: 0,001**	$\chi^2 = 3,95$; r = 0,30	1,0 0,37	**6,4 0,00**	2,8 0,10	1,54 0,21	**6,90 0,01**	2,11 0,15
									t_{12}–t_{18}: 0,874	–						
									t_0–t_{18}: 0,001	$\chi^2 = 3,80$; r = 0,29						
durchschnittliche monatliche **Anzahl stationärer Aufenthalte**	0,36 (0,3)	0,28 (0,4)	0,30 (0,7)	0,22 (0,2)	0,22 (0,2)	0,18 (0,3)	12,7	**0,002**	**t_0–t_{12}: 0,018**	$\chi^2 = 2,37$; r = 0,23	0,2 0,72	0,4 0,61	1,5 0,23	1,05 0,31	1,26 0,27	2,09 0,15
									t_{12}–t_{18}: 0,429	–						
									t_0–t_{18}: 0,002	$\chi^2 = 3,16$; r = 0,27						
davon durchschnittliche monatliche Anzahl stationärer Aufenthalte mit Zwangsunterbringung	0,16 (0,1)	0,08 (0,2)	0,13 (0,4)	0,10 (0,1)	0,06 (0,1)	0,05 (0,9)	27,1	**0,001**	**t_0–t_{12}: 0,001**	$\chi^2 = 3,69$; r = 0,28	0,4 0,57	1,5 0,23	**1,7 0,03**	1,05 0,31	**6,87 0,01**	2,14 0,15
									t_{12}–t_{18}: 0,833	–						
									t_0–t_{18}: 0,001	$\chi^2 = 3,90$; r = 0,29						

alle Parameter wurden für die letzten 12 Monate (t_0 und t_{12}) bzw. die letzten 6 Monate (t_{18}) erhoben; MW = Mittelwert; SD = Standardabweichung; p = Signifikanz; r = Effektstärke; χ^2 = Chi-Quadrat-Test; F = Prüfwert Mixed ANOVA
[*] kumulierte Tage stationär/Anzahl der Monate

Reinhardt I et al. Psychosoziale Komplexbetreuung bei… Psychiat Prax | © 2022. Thieme. All rights reserved.

Heruntergeladen von: LVR-Klinik Köln. Urheberrechtlich geschützt.

▶ **Tab. 4** Klinische Einschätzung, Behandlungszufriedenheit, Lebensqualität, Inklusion und Partizipation.

	Interventionsgruppe (IV)			Kontrollgruppe (KG)			Prä-Post Interventionsgruppe t_0/t_{12}; ITT/LOCF		Prä-Post Interventionsgruppe t_0/t_{12}; TPP-Analyse		Mixed ANOVA (IV/KG vs. t_0/t_{12})		
	t_0	t_{12}	t_{12} LOCF	t_0	t_{12}	t_{12} LOCF	Test	Sign.	Test	Sign.	Zeit x Gruppe	Zeit	Gruppe
Variablen	**MW (SD)**	**MW (SD)**	**MW (SD)**	**MW (SD)**	**MW (SD)**	**MW (SD)**	**Z**	**p**	**Z**	**p**	**F p**	**F p**	**F p**
Funktionsniveau (GAF)	28,7 (9,5)	37,1 (12,7)	35,1 (12,6)	36,2 (12,4)	34,4 (15,3)	36,8 (13,2)	2,95	**0,003**	2,95	**0,003**	2,10 0,152	**5,25 0,026**	3,86 0,054
Schweregrad (CGI)	2,2 (0,8)	3,0 (0,8)	2,8 (0,9)	2,8 (0,8)	2,6 (1,1)	2,7 (0,8)	3,63	**0,001**	3,63	**0,001**	**7,42 0,008**	**7,42 0,008**	2,08 0,154
Behandlungszufriedenheit (ZUF-8)	24,2 (5,0)	26,1 (2,8)	26,3 (3,2)	24,7 (4,4)	24,5 (5,2)	23,9 (5,0)	2,28	**0,023**	2,28	**0,023**	**5,43 0,025**	1,06 0,308	0,721 0,401
Lebensqualität (WHOQOL-BREF) *Gesamtscore*	82,1 (16,6)	94,2 (16,1)	86,0 (19,6)	82,7 (19,1)	92,3 (10,8)	84,5 (17,7)	1,36	0,176	1,36	0,176	2,45 0,127	1,32 0,258	0,43 0,837
Lebensqualität (WHOQOL-BREF), Skala psychische Gesundheit *Transf. Score*	56,8 (20,2)	58,9 (17,6)	58,1 (18,8)	53,8 (24,0)	63,5 (7,6)	56,2 (21,3)	0,48	0,678	0,48	0,678	0,42 0.521	0,66 0,422	0,002 0,964
Anzahl Kontaktpersonen (F-INK)	4,4 (2,2)	3,7 (2,1)	4,1 (2,2)	6,2 (2,6)	4,4 (2,1)	5,4 (2,8)	0,37	0,715	0,37	0,715	0,71 0,406	0,71 0,406	**4,81 0,034**
Skala Inklusion (F-INK, G)	1,66 (0,6)	1,87 (0,7)	1,78 (0,7)	1,87 (0,6)	2,14 (0,3)	1,91 (0,5)	0,54	0,586	0,54	0,586	0,19 0,891	0,65 0,423	1,090 0,303
Skala Partizipation (F-INK, C)	0,8 (0,3)	1,0 (0,5)	0,9 (0,49)	0,9 (0,4)	1,0 (0,4)	0,9 (0,4)	0,53	0,596	0,53	0,596	0,64 0,430	0,07 0,792	0,00 0,994

n = Anzahl; MW = Mittelwert; SD = Standardabweichung; Z = Prüfwert Wilcoxon-Test; ITT = Intention-to-treat-Analyse; LOCF = last observation carried forward; TPP = Treatment-per-protocol-Analyse; zweiseitige Testung: p = Signifikanz

Heruntergeladen von: LVR-Klinik Köln. Urheberrechtlich geschützt.

▶ **Tab. 5** Erwartungen und Erfahrungen der Komplexbetreuenden.

Item	Erwartungen an das Versorgungsmodell t_0 (n = 7)		Erfahrungen mit dem Versorgungsmodell t_{12} (n = 9)		Signifikanz
	MW (Median)	SD (Spannweite)	MW (Median)	SD (Spannweite)	p
Item 1: Betreuungsintensität	1,3 (1)	0,5 (1–2)	1,2 (1)	0,4 (1–2)	0,837
Item 2: Vertrauensverhältnis zu den betreuten Patient*innen	1,7 (2)	0,5 (1–2)	1,8 (2)	0,4 (1–2)	0,837
Item 3: Individuelle, patient*innengerechte Versorgung	2 (2)	0 (2)	1,4 (2)	0,7 (0–2)	0,142
Item 4: Planung der Versorgung im nachstationären Bereich und im Bereich der sozialen Integration	1,7 (2)	0,5 (1–2)	1,1 (1)	0,6 (0–2)	0,298
Item 5: Versorgungssituation für die Patient*innen	1,8 (2)	0,5 (1–2)	1,4 (1)	0,5 (1–2)	0,091
Item 6: Meine Arbeitsbedingungen	0,1 (0)	0,4 (0–1)	–0,2 (0)	0,4 (–1–0)	0,299
Item 7: Art und Intensität, mit der ich mich um Patient*innen kümmern kann	1,4 (1)	0,5 (1–2)	1,2 (1)	0,7 (0–2)	0,606

Die Erwartungen und Erfahrungen konnten auf einer 5-stufigen Skala von – 2 (geringe Erwartungen/schlechte Erfahrungen) bis + 2 (hohe Erwartungen/gute Erfahrungen) angegeben werden.
n = Anzahl, MW = Mittelwert, SD = Standardabweichung; Mann-Whitney-U-Test, zweiseitige Testung.

gebnisse der hier vorgestellten ITT/LOCF-Analysen unterschieden sich nicht grundlegend von den TPP-Analysen.

Behandlungzufriedenheit, Lebensqualität, soziale Inklusion und Teilhabe (Selbstbeurteilung)

An der Fragebogenerhebung nahmen zu t_0 25 der 46 Patient*innen der Interventionsgruppe und alle 21 Kontrollpatient*innen teil. Für die Nichtteilnahme gaben 18 Patient*innen erkrankungsbezogene Gründe an (Belastung durch lange Befragung), weitere 3 Patient*innen gaben keine Gründe an. Auch hier wurde der t_{18}-Messzeitpunkt aufgrund einer sehr hohen missing-Quote in den Nachbefragungen (s. o.) beider Gruppen nicht in die Auswertung einbezogen. Im Prä-Post-Vergleich (t_0, t_{12}) der Interventionsgruppe zeigte sich eine signifikante Besserung der Behandlungszufriedenheit, im Gruppenvergleich wurde eine signifikante Interaktion bei der Behandlungszufriedenheit deutlich (▶ **Tab. 4**). Auch hier unterschieden sich die Ergebnisse der ITT/LOCF-Analysen nicht grundlegend von den TPP-Analysen.

Bewertung des Komplexmodells durch die Komplexbetreuenden (KOBs)

Die sieben befragten KOBs (78 % aller KOBs) äußerten zu Projektbeginn (t_0) hohe Erwartungen an das Komplexmodell (höchste Zustimmung für „individuelle patientengerechte Versorgung“ und „Versorgungssituation für Patient*innen“). Die geringsten Erwartungen wurden an das Item „Meine Arbeitsbedingungen“ gestellt. Die 9 nach 12 Monaten (t_{12}) zu ihren Erfahrungen befragten KOBs (100 % aller KOBs) äußerten eine hohe bis sehr hohe Zufriedenheit mit dem Modell, insbesondere beim „Vertrauensverhältnis zu den Patient*innen“ und bei der „Individuellen, patientengerechten Versorgung“. Die Unterschiede zwischen den beiden Zeitpunkten waren statistisch nicht signifikant (▶ **Tab. 5**).

Diskussion

Das Projekt PsyKom zeigte die Machbarkeit und klinische Effektivität der Einführung eines sektorübergreifenden, psychosozialen Komplexversorgungsmodells für schwer psychisch Erkrankte am Übergang von der stationären zur ambulanten Versorgung an einer psychiatrisch-psychotherapeutischen Fachklinik. Für diese Patient*innen hatte es zuvor – ausweislich vielfacher, häufig unfreiwilliger stationärer psychiatrischer Akutaufnahmen – keine zufriedenstellende ambulante Versorgungsform gegeben.

Das PsyKom-Modell zeichnet sich durch eine besondere Flexibilität in der Behandlungsintensität und -dauer sowie eine (personelle) Behandlungskontinuität und Patient*innenzentrierung aus. Es zeigte sich in der klinischen Bewertung des Versorgungsverlaufs, dass etwa zwei Drittel der Gruppe der Patient*innen mit SMI von dem Versorgungsmodell profitierten und anschließend überwiegend in die Regelversorgung übergeleitet werden konnten. Die Dauer der Komplexbehandlung war interindividuell sehr variabel (wenige Wochen/Monate bis zu mehr als 2 Jahren). Einige therapeutische Erfolge waren sehr beeindruckend und selbst dann erzielbar, wenn zuvor lange Phasen sehr ungünstiger Verläufe mit Chronifizierung von

Heruntergeladen von: LVR-Klinik Köln. Urheberrechtlich geschützt.

Krankheitssymptomen und erheblichen psychosozialen Einschränkungen vorlagen.

Die Begleitevaluation zeigte, dass das Versorgungsmodell klinisch effektiv hinsichtlich einer Reduktion der stationär-psychiatrischen Behandlungstage, der Anzahl der stationären Aufenthalte und der Zwangsunterbringungen war. Im Versorgungsmodell behandelte Patient*innen erreichten im Verlauf eine bessere Funktionsfähigkeit und einen geringeren Schweregrad der Erkrankung und sie waren zufriedener mit der Behandlung im Vergleich zu einer Kontrollgruppe. Diese Ergebnisse stehen im Einklang miteinander und mit Ergebnissen aus anderen personenzentrierten Versorgungsmodellen (vgl. [5, 8, 27]). Die Kombination aus administrativen und klinischen Datenquellen stellt eine Stärke dieser Studie dar und kann bei der Interpretation der Daten hilfreich sein. Eine reduzierte Inanspruchnahme könnte theoretisch auch auf Unter- oder Fehlversorgung hindeuten. In dem vorliegenden Modell spricht die parallel verbesserte klinische Symptomatik aber eher für die Wirksamkeit des Versorgungsmodells.

Verantwortlich für das Fehlen signifikanter Veränderungen in Bezug auf Inklusion, Partizipation und Lebenszufriedenheit der Betroffenen könnte die eher kleine Stichprobe dieser Studie sein, allerdings sind die Ergebnisse hierzu auch in der Literatur eher uneinheitlich [27]. Die Effekte der PsyKom-Intervention werden im Gruppenvergleich möglicherweise unterschätzt, da die Kontrollgruppe im Vergleich zu der Interventionsgruppe trotz Matching weniger schwer krank und sozial beeinträchtigt war. Dies hängt damit zusammen, dass es sehr schwer war, gerade schwer psychisch Erkrankte zur Studienteilnahme als Kontrollpatient*innen zu motivieren (kein Mehrwert durch ein therapeutisches Angebot).

In der Rückschau zeigten sich aus Sicht der Behandelnden eine Reihe förderlicher und hinderlicher Faktoren für den Erfolg der Komplexbehandlung, die bei der Weiterentwicklung des Modells berücksichtigt werden sollten. Die Modellimplementierung gestaltete sich für die Behandlungsteams herausfordernd aufgrund der zeitlich parallelen Tätigkeit der Teammitglieder im Stationsdienst. Andererseits wurde gerade die Flexibilität in Bezug auf die Versorgungsleistungen vonseiten der Behandelnden als notwendig und vorteilhaft empfunden. Damit bieten Modellvorhaben wie PsyKom – anders als z. B. die bereits gesetzlich verankerte stationsäquivalente Behandlung (STäB) [11] – wesentliche Vorteile für die Versorgung schwer Erkrankter. Es stellt sich die Frage, warum Modellvorhaben trotz zahlreicher positiver Evaluationen (z. B. [7, 8, 16]) noch nicht Eingang in die Regelversorgung gefunden haben. Auch die S3-Leitlinie für psychosoziale Therapien empfiehlt aufsuchende Behandlung mit einem hohen Empfehlungscharakter [28].

Vonseiten der Patient*innen stieß das Modell an seine Grenzen bei wohnungslosen Menschen und fortgesetztem Substanzkonsum. Ferner zeigte sich, dass die Überleitung in die Regelversorgung frühzeitig geplant und langfristig vorbereitet werden muss. Ausgehend von den bisherigen Erfahrungen soll das Modell weiterentwickelt und in einer größeren, methodisch anspruchsvolleren Studie – auch mit gesundheitsökonomischer Evaluation – evaluiert werden.

Limitationen der Evaluation

Es wurde eine methodisch einfache Begleitevaluation ohne Randomisierung bei der Gruppeneinteilung durchgeführt. Die eingeschränkte Vergleichbarkeit von Interventions- und Kontrollgruppe könnte möglicherweise zu einer Unterschätzung der Interventionseffekte führen. Außerdem schränkt die kleine Stichprobengröße der Kontrollgruppe möglicherweise die statistische Power ein. Die schriftliche Befragung war für viele Patient*innen krankheitsbedingt nur mit Einschränkungen durchführbar. Aus diesem Grund sind die Stichprobengrößen bei den Befragungsergebnissen kleiner als bei den Routinedaten zu Wiederaufnahmen und stationären Behandlungstagen. Die Letzteren dürften aber auch im Verlauf – selbst bei Drop-outs – (weitgehend) vollständig vorliegen, da die Patient*innen aufgrund der Sektorzuständigkeit der Klinik nur selten oder gar nicht in anderen Kliniken aufgenommen werden.

KONSEQUENZEN FÜR KLINIK UND PRAXIS

Für schwer psychisch erkrankte Menschen mit komplexem Hilfsbedarf besteht eine Versorgungslücke beim Übergang vom stationären in den ambulanten Bereich, die mit der PsyKom-Intervention in etwa zwei Dritteln der Fälle gefüllt werden konnte. Um eine Komplexbetreuung wie beim PsyKom-Projekt erfolgreich und nachhaltig aufstellen zu können, sind eine bedarfsadaptierte Betreuungsintensität und ausreichende Zeitperspektiven erforderlich.

Interessenkonflikt

JZ: Member of the Scientific Committee of the annual congress of the DGPPN. Member of the DGPPN.

Literatur

[1] DGPPN – Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde, Hrsg. S3-Leitlinie Psychosoziale Therapien bei schweren psychischen Erkrankungen. Kapitel 1: Zielsetzung, Anwendungsbereich und Adressaten. 2. Auflage. Berlin: Springer; 2019: https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/038-020l_S3_Psychosoziale_ Therapien_bei_schweren_psychischen_Erkrankungen_2019-07.pdf

[2] Frick U, Frick H, Langguth B et al. The revolving door phenomenon revisited: time to readmission in 17 415 patients with 37 697 hospitalisations at a German psychiatric hospital. PLOS One 2013: 8; e75612

[3] Zielasek J, Gaebel W. Mental health law in Germany. Br J Psych International 2015; 12: 14–16

[4] Adorjan K, Steinert T, Flammer E et al. Zwangsmaßnahmen in deutschen Kliniken für Psychiatrie und Psychotherapie. Nervenarzt 2017; 88: 802–810

[5] Dieterich M, Irving CB, Bergman H et al. Intensive case management for severe mental illness. Cochrane Database Syst Rev 2017; 1: CD007906. doi:10.1002/14651858.CD007906.pub3

Heruntergeladen von: LVR-Klinik Köln. Urheberrechtlich geschützt.

[6] Wheeler C, Lloyd-Evans B, Churchard A et al. Implementation of the crisis resolution team model in adult mental health settings: a systematic review. BMC Psychiatry 2015; 15: 74. doi:10.1186/s12888-015-0441-x

[7] Schöttle D, Schimmelmann BG, Karow A et al. Effectiveness of integrated care including therapeutic assertive community treatment in severe schizophrenia spectrum and bipolar I disorders: the 24-month follow-up ACCESS II study. J Clin Psychiatry 2014; 75: 1371–1379. doi:10.4088/JCP.13m08817

[8] Neumann A, Baum F, Seifert M et al. Verringerung vollstationärer Behandlungstage in psychiatrischen Kliniken mit Modellvorhaben zur patientenzentrierten Versorgung mit globalem Budget (§ 64b SGB V). Psychiat Prax 2021; 48: 127–134. doi:10.1055/a-1274-3731

[9] Wullschleger A, Berg J, Bermpohl F et al. Can "Model Projects of Need-Adapted Care" Reduce Involuntary Hospital Treatment and the Use of Coercive Measures? Front Psychiatry 2018; 9: 168. doi:10.3389/fpsyt.2018.00168

[10] Schmid P, Steinert T, Borbé R. Systematische Literaturübersicht zur Implementierung der sektorenübergreifenden Versorgung (Regionalbudget, integrierte Versorgung) in Deutschland. Psychiat Prax 2013; 40: 414–424

[11] Knorr R, Huter J, Dittmeyer V et al. Zwei Jahre stationsäquivalente Behandlung: Ein Werkstattbericht. Fortschr Neurol Psychiatr 2021; 89: 12–22. doi:10.1055/a-1183-4140

[12] Aktion Psychisch Kranke. Personenzentrierte Hilfen im gemeindepsychiatrischen Verbund. Bonn: Psychiatrie-Verlag; 2006

[13] Steinhart I, Wienberg G. Das Funktionale Basismodell für die gemeindepsychiatrische Versorgung schwer psychisch kranker Menschen – Mindeststandard für Behandlung und Teilhabe. Psychiat Prax 2016; 43: 65–68

[14] Magez J, Ruppert D, Valentini J et al. „Die Krücke steht in der Ecke…" – Erfahrungen psychisch kranker Menschen in einem Versorgungsmodell der ambulanten sektorenübergreifenden vernetzten Versorgung. Eine qualitative Studie. Psychiat Prax 2018; 45: 359–366

[15] Ruppert D, Stegbauer C, Bramesfeld A et al. „Die Hoffnung stirbt zuletzt…" – sektorenübergreifende Kooperation in der Integrierten Versorgung. Eine qualitative Studie. Psychiat Prax 2017; 44: 134–140. doi:10.1055/s-0041-109470

[16] Weinmann S, Wiedmann S, Breidert T et al. Klinische Wirksamkeit von „FlexiTeam" (Home Treatment und intensivierte ambulante Behandlung) – Vergleich einer Behandlung in einem Modellprojekt nach § 64b in Berlin mit der stationären Behandlung. Psychiat Prax 2019; 46: 249–255. doi:10.1055/a-0881-1124

[17] Richter D, Gühne U, Stein J et al. Die Effekte nicht-pharmakologischer, gesundheitsfördernder Interventionen bei Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen. Ein systematischer Literaturüberblick. Psychiat Prax 2018; 45: 347–357

[18] Heinz J, Engemann S, Reinhardt I et al. Personenzentrierte, psychosoziale Komplexbetreuung – ein Versorgungsmodell mit schwer psychisch Erkrankten im Fokus. Soziale Psychiatrie 2019; 163: 24–26

[19] Saß H, Wittchen HU, Zaudig M et al. Diagnostische Kriterien des Diagnostischen und Statistischen Manuals Psychischer Störungen – DSM-IV-TR. Deutsche überarbeitete Version. Göttingen: Hogrefe; 2003

[20] Busner J, Targum SD. The Clinical Global Impression Scale. Applying a Research Tool in Clinical Practice. Psychiatry (Edgmont) 2007; 4: 28–37

[21] Schmidt J, Lamprecht F, Wittmann WW. Zufriedenheit mit der stationären Versorgung. Entwicklung eines Fragebogens und erste Validierungsuntersuchung. Psychother med Psycho 1989; 39: 248–255

[22] Angermeyer MC, Kilian R, Matschinger H. WHOQOL-100 und WHOQOL-BREF. Handbuch für die deutschsprachige Version der WHO. Instrument zur Erfassung von Lebensqualität. 1. Auflage, Göttingen: Hogrefe; 2000

[23] Schützwohl M, Souza PML, Rackel Y. Fragebogen zur Erfassung von Partizipation und sozialer Inklusion chronisch psychisch erkrankter Menschen (F-INK). Psychiat Prax 2017; 44: 65–74

[24] Salkind NJ. Encyclopedia of Research Design (Vol. 2). Los Angeles: Sage; 2010

[25] Lenhard W, Lenhard A. Berechnung von Effektstärken. Abgerufen unter: Dettelbach: Psychometrica; 2016. doi:10.13140/RG.2.2.17823.92329

[26] Gouzoulis-Mayfrank E. Projekt PsyKom: Implementierung und Evaluation eines Modells der personenzentrierten, psychosozialen Komplexbetreuung schwer Betroffener mit psychischen Störungen an der LVR-Klinik Köln. Unveröffentlichter Abschlussbericht an das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW; 2020

[27] DGPPN – Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde, Hrsg. S3-Leitlinie Psychosoziale Therapien bei schweren psychischen Erkrankungen. Kapitel 10: Systeminterventionen. 2. Auflage. Berlin: Springer; 2019

[28] DGPPN – Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde, Hrsg. S3-Leitlinie Psychosoziale Therapien bei schweren psychischen Erkrankungen. Kapitel 7: Darstellung aller Empfehlungen und Statements im Überblick. 2. Auflage. Berlin: Springer; 2019: https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/038-020l_S3_Psychosoziale_Therapien_bei_schweren_psychischen_Erkrankungen_2019-07.pdf

Heruntergeladen von: LVR-Klinik Köln. Urheberrechtlich geschützt.

European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience
https://doi.org/10.1007/s00406-021-01251-1

ORIGINAL PAPER

Online therapy: an added value for inpatient routine care? Perspectives from mental health care professionals

Julia Sander[1] · Felix Bolinski[2,3] · Sandra Diekmann[4] · Wolfgang Gaebel[4,5] · Kristina Günther[1] · Iris Hauth[1] · Andreas Heinz[1,6] · Annet Kleiboer[2,3] · Heleen Riper[2,3] · Nadine Trost[4] · Oyono Vlijter[7] · Jürgen Zielasek[4,5] · Gabriel Gerlinger[1]

Received: 25 September 2020 / Accepted: 3 March 2021
© Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature 2021

Abstract

Internet-delivered interventions can be effective in treating mental disorders. However, their rate of use in German psychiatric inpatient routine care is low. The current study aimed to investigate the attitude of mental health care professionals working in inpatient care regarding internet-delivered interventions, including presumed benefits, barriers and facilitators. In total, 176 health professionals from ten inpatient psychiatric hospitals throughout Germany were surveyed on site. The professionals' attitude towards internet-delivered interventions in inpatient care was assessed by an adapted version of the 'Attitude toward Telemedicine in Psychiatry and Psychotherapy' (ATTiP) questionnaire. To identify benefits, barriers and facilitators, we developed open-response questions that were based on the 'Unified Theory of Acceptance and Use of Technology' (UTAUT) and analyzed by a qualitative content analysis. Professionals reported little experience or knowledge about internet-delivered interventions. Their attitude towards internet-delivered interventions in psychiatric inpatient care was rather indifferent. The most frequently mentioned potential benefits were an optimised treatment structure and patient empowerment; the most frequently anticipated barriers were too severe symptoms of patients, the feared neglect of face-to-face contacts and insufficient technical equipment; and the most frequently mentioned facilitators were high usability of the internet-based intervention, a sufficient functional level of the patient and further education of staff. For successful implementation in the inpatient sector, internet-delivered interventions must be adapted to the special needs of severely mentally ill patients and to the hospital management systems and workflow. In addition, technical preconditions (internet access, devices) must be met. Last, further education of mental health care professionals is needed.

Keywords E-mental health · Professionals' attitude · Psychiatric inpatient care · Barriers · Benefits · Facilitators to implementation

✉ Julia Sander
j.sander@dgppn.de

[1] German Association for Psychiatry, Psychotherapy and Psychosomatics E.V. (DGPPN), Reinhardtstraße 27b, 10117 Berlin, Germany

[2] Vrije Universiteit Amsterdam, Faculty of Behavioural and Movement Sciences, Clinical, Neuro- and Developmental Psychology, Amsterdam, The Netherlands

[3] Amsterdam Public Health Research Institute, Faculty of Behavioural and Movement Sciences, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands

[4] LVR-Institute for Healthcare Research, Cologne, Germany

[5] Medical Faculty, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany

[6] Department of Psychiatry and Psychotherapy, Charité, Universitätsmedizin Berlin, Campus Charité Mitte, Berlin, Germany

[7] ARQ National Psychotrauma Centre, Diemen, The Netherlands

Published online: 16 March 2021

Introduction

There is growing evidence for the effectiveness of e-mental health interventions [1–4]. In this study, we use the terms e-mental health and online therapy to refer to all digitally delivered psychotherapeutic interventions, including apps and programmes for use on a computer, tablet, or smartphone. We do not use these terms to refer to standard face-to-face psychotherapy that takes place via video conferencing tools. e-mental health interventions can be delivered with various degrees of professional support, i.e. unguided/self-guided and guided [2]. Guidance is beneficial for the outcome of internet-delivered interventions [3] because guided treatment provides better outcomes than unguided treatment [2–4]

Blended treatment integrates face-to-face sessions and online therapy into one treatment protocol. Compared with stand-alone face-to-face psychotherapy, blended treatment can have several advantages. For example, adding online modules may enhance patient self-management. Additionally, the therapy structure may become more transparent and face-to-face sessions may be optimally used because they are prepared in the online environment [5]. Thus, blended treatment may save clinicians time. There is also evidence that blended treatment may lead to lower dropout rates and greater abstinence rates in patients with substance use or may help maintain in the long run any changes that were initially achieved during psychotherapy [6]. Psychotherapy in inpatient care was found to be more efficient after adding an online self-help programme to the treatment protocol [7]. Conceivably, blended treatment could be facilitated during inpatient care and may lead to the listed benefits. However, to date most studies investigating blended treatment protocols have focussed on outpatient care only [8, 9].

Professionals' attitudes towards e-mental health

Health care providers, such as doctors, psychologists and nursing staff, are the gatekeepers of health care delivery and the integration of digital health technologies into routine clinical practice [10]. In addition to legal and technical preconditions, acceptance of e-mental health by key stakeholders is relevant for the uptake of e-mental health into routine care [11].

The acceptance of e-mental health depends on certain predictors. Venkatesh et al. [12] formulated the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT), which proposes four direct determinants of user acceptance and behaviour, i.e. performance expectancy, effort expectancy, social influence and facilitating conditions. The first three are strong indicators of the intention to use; whereas the fourth, together with intention to use, predicts usage behaviour directly.

European mental health care professionals appear to be rather open towards therapeutic app use, with or without the support of a health care professional [13]. However, in many European countries, the acceptability of blended treatment is higher than that of unguided stand-alone internet treatments [14].

In contrast to the amount of research in the outpatient sector [15], little research has been performed on professionals' acceptance of e-mental health in German inpatient care. Hennemann et al. [16] surveyed 152 participants from four German rehabilitation hospitals with different diagnostic specialisations. In this multi-professional sample, doctors', psychologists', physical therapists', nurses', nutritionists' and others' intention to use e-health interventions during inpatient rehabilitation was rather low (5-point Likert scale: $M = 2.47$, $SD = 0.9$); whereas, their acceptance of online aftercare was moderate [$M = 3.08$, $SD = 0.96$, $t(127) = 8.22$, $p < 0.001$]. However, this study did not specifically examine the attitude towards e-mental health within psychiatric inpatient care. A first insight into stakeholders' attitude towards e-mental health in a German inpatient psychiatric hospital was given by Dorow et al. [17]. The group asked patients ($n = 181$) and mental health professionals ($n = 31$, primarily psychologists and nurses) what they thought about implementing an internet-based self-management tool for treating depression in inpatient care. Most of the health care professionals stated that the presented self-management tool could be easily integrated into the hospital workflow as an additional therapy option and that they would recommend it, and patients also reported moderate to high user acceptance. Thus, the professionals tended to have a rather positive attitude. However, the sample was comparatively small [17]. Therefore, the question of how professionals think about e-mental health in psychiatric inpatient care remains open.

Benefits of e-mental health

The primary incentives to implement e-mental health into health care services, perceived by different organisations throughout Europe, are expected cost-effectiveness and increased access [14]. A recent systematic review revealed flexibility with timing and location as the main benefits of implementing e-mental health [18]. However, reaching patients that you might not reach otherwise cannot be seen as a benefit of e-mental health in inpatient treatment settings, where patients are already receiving care. Thus, the question remains whether e-mental health has additional advantages in inpatient care.

One of the main expected advantages of blended treatment is that clinicians can concentrate on process-related

treatment components and use internet-delivered modules to deliver practical therapy components, such as assignments, diaries and psychoeducation [5]. Thus, compared with stand-alone face-to-face therapy, blended treatment may save clinicians time [6], although there is also evidence to the contrary [19]. Blended treatment may improve therapy quality and outcome: Dutch therapists working with blended cognitive behaviour therapy reported that the pre-set structure made them and their patients more adherent to the treatment protocol [19]. As mentioned above, blended treatment may also help to reduce dropout rates and to maintain changes achieved during psychotherapy [6].

To date, no studies have investigated the specific benefits of internet-delivered interventions in psychiatric inpatient care from the perspective of mental health care professionals.

Barriers to the integration of e-mental health

Several barriers may explain the rather low degree of implementation of e-mental health in routine health care. In 2014, different European stakeholders considered the low feasibility of delivery within existing health care systems to be a primary barrier for integrating internet-delivered psychotherapy [14]. Other barriers include the potential clinical inferiority of e-mental health compared with treatment as usual, limited internet literacy and access and suspected reluctance of mental health professionals and patients [14, 20], as well as the confidentiality and security of patient data [18].

In Germany, the main barriers perceived by professionals are data safety issues, technical problems, a severe course of disease [17] and insufficient e-mental health education and infrastructure [16]. Five German psychotherapists who implemented e-mental health into their outpatient therapy routine reported 'limited customizability and autonomy of decisions concerning blending the therapy', 'disease-related contraindications', 'negative affect caused by burden through technical problems' and 'hampered establishment of therapeutic alliance by technical issues' to be the main barriers [11]. There is also evidence that blended treatment is not time efficient [19] or cost effective from a societal perspective [9] compared with stand-alone face-to-face therapy. Further barriers may exist that are specific for psychiatric inpatient care and have not yet been investigated.

Facilitators for the integration of e-mental health

Titov et al. [21] searched for common features of hospitals that have implemented internet-delivered cognitive behaviour therapy (ICBT) successfully into routine care. They compared five hospitals in Sweden, Denmark, Norway, Canada and Australia. Thus, all five hospitals were in high-income countries with publicly funded health care and high internet use, all of which are obvious facilitators for e-mental health. The authors summarized eight key success factors, including 'strong clinical, Information Technology (IT) and organisational governance', 'use of well-developed and validated ICBT programmes', 'safe and effective provision of online therapy programmes' and 'well trained and supported therapists'. Recent systematic literature reviews revealed the acceptance of patients and professionals and the appropriateness of e-mental health in addressing patients' mental health disorders as facilitators [18, 22]. Davies et al. [18] found that health professionals supported online therapies only for patients with relatively straightforward, low-risk diagnoses, strong motivation and engagement, high computer literacy and access and low need for tailored content. The availability and reliability of the technology required for e-mental health applications and the interoperability of these applications with other existing technologies are further facilitators [22]. Additionally, researchers have emphasised the need for targeted training of professionals and organisational support to manage changed workflows [18]. Therapists who gained first experience with blended treatment reported that having sufficient training on how to work in a blended way and how to communicate online are key components for enabling online therapies [19]. However, research to date has not yet explicitly determined facilitators for e-mental health in inpatient psychiatric care in Germany from the professionals' point of view.

The current study

This study was part of the European project eMEN, which aims to increase knowledge on e-mental health implementation and was funded by the European Commission (Interreg North-West Europe Programme) [23, 24]. The study had two objectives. First, it aimed to assess the attitude of mental health care professionals working in inpatient care settings towards online therapy, regardless of the level of guidance. Second, it aimed to identify potential barriers, facilitators and benefits of the implementation of e-mental health in German psychiatric inpatient care from the professionals' perspective. We chose a mixed-methods approach to answer these research questions [25].

Methods

Participants and procedure

To ensure that not only those professionals with an affinity for the topic participated in our survey on e-mental health,

rather than conducting an online survey, we engaged with professionals by holding workshops directly on site. We held the workshops (duration: 90 min) at ten different psychiatric hospitals throughout Germany that were located in both urban and rural areas in the states of Schleswig–Holstein, Berlin, Brandenburg, North Rhine-Westphalia and Bavaria. The hospitals varied in size and in their approach to care, i.e. they consisted of both university and specialist hospitals, so that the study covered a wide range of settings. Existing weekly dates for internal training that are part of the hospital routine were used for the workshops. Thus, all health care professionals who treat patients with mental disorders were welcome to attend.

Two weeks in advance of the workshops, participants were provided with free access to the online therapy platform moodbuster (https://www.moodbuster.science/), which was developed by Vrije Universiteit Amsterdam, and asked to explore the online therapy modules on their own. We used moodbuster as an example to ensure that every participant had experienced an internet-delivered intervention before participating in the workshop. At the time of the workshops, moodbuster consisted of a cognitive behavioural therapy approach for depression. It offered six online modules that included psychoeducation, cognitive restructuring and behavioural activation. In moodbuster, texts and videos guide the user through the modules, which also use exercises and homework assignments. The moodbuster platform consists of a web portal for patients and practitioners and a mobile application with which many variables, such as mood and daily activities, can be monitored (also called ecological momentary assessment) [26].

In case any participants did not have the time or opportunity to learn about moodbuster or any other internet-delivered intervention in advance of the workshop, an expert of the moodbuster platform development team presented the programme at each on-site workshop (20-min presentation). After the presentation, participants answered a paper-and-pencil survey consisting of closed questions on their attitudes towards internet-delivered interventions and open-response questions on perceived barriers, anticipated benefits and facilitators of internet-delivered intervention in inpatient mental health routine care (see measures section below for details). To further develop the moodbuster platform and to adapt it to inpatient care needs, participants were asked to fill in a usability questionnaire on moodbuster. The results of this questionnaire are not reported here, but please see the questionnaire in Supplementary Appendix A for details on usability items. After data collection, there was some time for discussion within the groups. However, that content was not coded and, thus, not analyzed and is not reported here.

Measures

This study took a mixed-methods approach [25]. Attitude towards e-mental health was assessed by items on an ordinal scale and scores were quantitatively analyzed. In contrast, the potential benefits, barriers and facilitators of implementing online therapy in inpatient routine care were assessed by open-response questions and answers were qualitatively analyzed with the inductive approach. Both methods and the data analyses are described in more detail below.

Sociodemographic characteristics

The survey consisted of items on age, sex, occupation, years of professional experience and time spent with moodbuster in preparation for the workshop. To maintain participants' anonymity, we did not record the psychiatric unit or the participants' exact workplace.

Attitudes towards online therapy

First, we evaluated the attitudes of mental health professionals towards e-mental health by the 8-item ATiPP questionnaire [27]. A 5-point Likert scale was used with anchors ranging from (1) 'I strongly disagree' to (5) 'I strongly agree'. For every participant, we calculated an ATiPP score by summing the item values and dividing this sum by the number of items answered. Thus, an individual's ATiPP score could range from 1 to 5, with higher values indicating a more positive attitude towards online therapy. The ATiPP questionnaire was originally designed to assess attitudes towards telemedicine in psychiatry and psychotherapy and showed very good reliability (Cronbach's $\alpha > 0.8$). For the current study, the broader concept of telemedical interventions was narrowed down to the use of online therapy. The adapted questionnaire showed an average inter-item covariance of 0.22 and good reliability (Cronbach's $\alpha = 0.73$). For the items, see Supplementary Appendix A, questions 1–8. See Supplementary Appendix B for details on the psychometrics of the adapted ATiPP questionnaire.

Second, we evaluated the intention to use online therapy in inpatient care as a proxy for attitude (see Supplementary Appendix A, question 23).

Third, we assessed social influence, i.e. the expected attitude of others, on a 5-point scale (see Supplementary Appendix A, questions 24–25). Social influence is a predictor of behavioural intention to use the technology [12].

Potential benefits, barriers and facilitators of implementing online therapy in inpatient routine care

The survey of benefits, barriers and facilitators of implementing online therapy in inpatient routine care was inspired by the UTAUT model predictors [12]. Questions from previous research were adapted to meet the needs of the current study. Personal IT literacy and experience with online therapy programmes were assessed (see Supplementary Appendix A, questions 21–22). Additionally, we evaluated potential barriers and facilitators, i.e. preconditions, that need to be fulfilled and the perceived usefulness and potential benefits of online therapy in inpatient care. An open-response format was used for the respective questions (see Supplementary Appendix A, questions 26–36).

Data analysis

In addition to quantitative descriptive analysis of the scale scores [mean values (*M*), standard deviations (SD), frequencies, and percentages], we performed a qualitative analysis of the responses to the open questions, as follows: in accordance with the inductive approach [28], codes were developed by paraphrasing and summarising the raw data that addressed potential benefits, barriers and facilitators of online therapy in psychiatric inpatient care. Raw data from free text responses were coded by one psychologist who was involved in data collection during the workshops. By paraphrasing and summarizing the responses, she first developed a list of codes that were based on 40% of material. Then, she searched the rest of the qualitative data material (60%) for statements related to the original code list. During this coding process, she added new codes and adjusted the existing ones to fit the data. A sentence or paragraph could be assigned to one or more codes. The number of participants that referred to a code was counted. All qualitative analyses were conducted with the software MaxQDA Analytics Pro 2020 (Release 20.0.07). The raw data with assigned codes are available from the corresponding author.

Results

In total, 176 participants aged between 20 and 65 years ($M = 37.6$, SD = 11.5) answered the questionnaire; 67% of participants were females. Occupation was specified by 171 participants, as follows: 81 stated that they had a background in psychology, 74 were medical doctors (36 of whom were doctors in training) and 16 described themselves as nursing or other health care staff in psychiatry. A great majority of participants described their personal experience with online therapy as poor (Table 1).

Table 1 How much experience have you gained with online therapies?

	n	%	Cumulative %
[0] Very little	136	77	77
1	27	15	93
2	9	5	98
3	3	2	99
[4] A lot	1	1	100
Total	176	100	100

Table 2 How common is knowledge about internet-based interventions for the treatment of mental illness in the hospital where you work?

	n	%	Cumulative %
[1] A little	65	38	38
2	71	41	79
3	30	17	97
4	5	3	99
[5] Very	1	1	100
Total	172	100	

Also, the knowledge about online therapy for the treatment of mental illness in one's own hospital was rated as being rather low (Table 2).

Attitudes towards online therapy in inpatient care

The first objective of the study was to assess the attitude of German mental health care professionals working in an inpatient care setting towards online therapy. The participants' answers tended towards the center of the 8-item ATiPP scale ($N = 172$, $\text{Median}_{\text{ATiPP score}} = 3.6$, $M_{\text{ATiPP score}} = 3.6$, SD = 0.54, min = 2, max = 4.8). We found no significant association between the attitude towards online therapy (ATiPP score) and occupation, age, professional experience or personal experience with online therapy. However, we did find a small, significant, positive correlation of the ATiPP score with self-evaluated IT knowledge and skills ($r = 0.15$, $p < 0.05$). Results on the item level showed that most participants agreed or strongly agreed that 'generally, online therapy is a good addition to medical services' (77%). However, only 30% agreed that 'an effective treatment of patients with mental illness is possible via online therapy'. And only 36% 'would recommend that their patients receiving psychiatric or psychotherapeutic treatment need an online therapy if such were to be offered'. For full ATiPP results on the item level, please see Supplementary Appendix B.

About 21% of the participants had rather little intention to use online therapy in their daily routine and almost

Table 3 How much do you like the idea of using online therapy in inpatient routine care?

	n	%	Cumulative %
[1] A little	11	6	6
2	25	14	21
3	55	32	52
4	57	33	85
[5] A lot	26	15	100
Total	174	100	

Table 5 What attitude do you assume your colleagues have towards the use of online therapies in inpatient routine care?

	n	%	Cumulative %
[1] Very negative	3	2	2
2	47	27	29
3	86	49	78
4	35	20	98
[5] Very positive	3	2	100
Total	174	100	

a third was indifferent. However, about half (48%) were interested in implementing online therapy in their daily routines in inpatient care (Table 3).

In comparison with their own attitude, participants considered the attitude of others (family, friends and acquaintances) towards online therapy to be more positive. Three-quarters of those surveyed believed that their family, friends and acquaintances have a positive (37%) or very positive (39%) attitude towards online therapies to treat mental illness (Table 4).

In contrast, many participants suspected that their colleagues have a rather negative or indifferent attitude towards online therapy and only 22% thought that their colleagues have a positive (20%) or very positive (2%) attitude towards implementing online therapies in their daily work (Table 5). Thus, these results suggested that work peer influence has a rather negative effect on the behavioural intention to use online therapies. In contrast, the social influence of family, friends and acquaintances was likely to be more positive. The individual ATTiP score was positively correlated with the assumed attitude of family, friends and acquaintances ($r = 0.31$, $p < 0.001$) and colleagues ($r = 0.20$, $p < 0.05$) towards online therapy.

Table 4 What attitude do you assume your family and friends/acquaintances have towards the use of online therapies for treatment of mental illness?

	n	%	Cumulative %
[1] Very negative	6	3	3
2	28	16	19
3	1	1	20
4	65	37	57
[5] Very positive	67	39	100
Total	174	100	

Potential benefits, barriers and facilitators of the implementation of online therapy in inpatient care

Benefits of e-mental health in inpatient care

Mental health professionals identified 18 potential benefits of online therapy in psychiatric inpatient care. Optimised treatment structure through online therapy was listed as an important potential benefit by 32% ($n = 57$) of participants. Furthermore, 31% ($n = 55$) classified online therapy programmes as a helpful add-on to inpatient face-to-face therapy, in terms of an extension of the treatment spectrum. In particular the empowerment of the patient (26%; $n = 45$) (e.g. through the possibility to work independently from the therapist) and the meaningful use of treatment-free times during hospitalisation (22%; $n = 39$) were mentioned as potential benefits. Psychoeducation through online programmes, which present the information well in writing, by videos, etc., and make it accessible at any time, was also considered useful (26%; $n = 45$). In addition, many of the professionals anticipated a higher level of treatment satisfaction and better adherence of patients as a result of the additional treatment option (26%; $n = 45$). Furthermore, better documentation, symptom tracking, monitoring and evaluation of therapy progress and its transparency to the patient could be positive results of implementing online therapy in inpatient care (23%; $n = 41$). Also, relapse prevention and bridging the transition from inpatient to outpatient care were stated as potential benefits (19%; $n = 34$); 14 participants (8%) mentioned that only outpatient care would benefit from online therapy. For full results on potential benefits, please see the coded responses and their frequencies listed in Table 6.

Barriers to the integration of e-mental health in inpatient care

Mental health professionals identified 20 barriers to implementation of online therapy in psychiatric inpatient care. The barrier most frequently anticipated by health care

Table 6 Potential benefits of implementing online therapy in psychiatric inpatient care—the view of health care professionals

Codes	Participants *N*	%
Optimised treatment structure	57	32
Add-on to face-to-face therapy	55	31
Empowerment of patients	45	26
Helpful for psychoeducation	45	26
Better adherence and satisfaction/more interesting for patients	45	26
Better documentation/monitoring/therapy evaluation	41	23
Using treatment-free times in hospital meaningfully	39	22
Intensifying therapy success	34	19
Relapse prevention/bridging from in- to outpatient care	34	19
Time saving/reduced workload	28	16
Standardised interventions	14	8
(Benefits for outpatient care only)	14	8
Bridging waiting time	14	8
High scalability/individualization	11	6
Facilitating access to psychotherapy	10	6
Economization/fewer staff necessary	8	5
Larger number of patients can be treated	8	5
Multilingual treatment opportunities	6	3
Crisis planning	1	1
Participants WITH statements on benefits	152	86
Participants WITHOUT statements on benefits	24	14
Total number of participants	176	100

professionals in psychiatric hospitals was that patients may lack the necessary capabilities, mainly because their symptoms are too severe and they would be cognitively incapable (23%; $n=41$). Another common argument against online therapy was that the important face-to-face contact would be neglected (22%; $n=39$). Further barriers mentioned were a shortage of technical equipment (21%; $n=37$) and lack of internet access (13%; $n=23$). Additionally, mental health care professionals assumed that patients might not be willing to do online therapy during inpatient care (19%; $n=33$). Also mentioned was that a lack of acceptance by staff might be a significant barrier, i.e. colleagues may not be convinced and fear being replaced by the technology (14%; $n=25$). All coded responses that addressed barriers are listed in Table 7.

Facilitators to the integration of e-mental health in inpatient care

In total, mental health professionals identified 34 different potential facilitators for implementing online therapy in psychiatric inpatient care. Regarding technical preconditions for successful implementation into inpatient care, very good usability of the online therapy programme (32%; $n=57$), free internet access (20%; $n=35$) and devices (22%; $n=39$) for patients and health care professionals were of particular importance. Furthermore, professionals considered it very important that the online therapy is highly adaptive to different needs and patients (20%; $n=35$), that data security is ensured (19%; $n=34$) and that the system interoperates with the local hospital IT system to avoid increased amounts of documentation (10%; $n=18$).

Regarding patients, participants saw sufficient cognitive ability and functional level as indispensable preconditions for applying online therapy in inpatient care (38%; $n=68$). Patients in severe crisis who are being treated on acute care units may not be able to concentrate on online therapy. Additionally, patients should participate voluntarily and be intrinsically motivated to work online (14%; $n=25$).

The most important facilitator on the organisational side was the further education of staff. Many participants identified training as the necessary next step towards implementation of online therapy (33%; $n=58$). Clearly structured workflows for the application and integration of online therapy in everyday clinical practice were also rated as particularly important (14%; $n=25$). By this, the professionals meant, for example, that online therapy should be a useful addition to existing therapies and not have a different content. Acceptance by mental health care professionals (14%; $n=25$) and transparent communication to patients about the treatment option were also key (14%; $n=25$). Some professionals mentioned that face-to-face therapy should not be replaced by online therapy but rather remain an additional option (11%; $n=20$). The coded responses and the number of participants that gave these responses are listed in Table 8.

Table 7 Potential barriers to implementing online therapy in psychiatric inpatient care—the view of health care professionals

Codes	Participants *N*	%
Patients not capable	41	23
Neglect of face-to-face contacts	39	22
No workspaces, technical equipment	37	21
Patients not willing	33	19
No resources (financial, personal)	30	17
Staff not convinced, fear being replaced	25	14
No (free wireless) internet access in hospital	23	13
Impersonal treatment, depersonalization of therapy	17	10
High workload for professionals	16	9
Not efficient (yet)	16	9
Data not secure	13	7
Lack of knowledge among staff	11	6
Encourages withdrawal of patients into the digital world	10	6
No benefits for inpatient care	7	4
Programmes not sufficiently user-friendly	5	3
No time	1	1
Lack of control by the practitioner	1	1
Suitable patients difficult to identify	1	1
Job cuts for psychologists	1	1
Psychodynamic therapy approaches unclear	1	1
Number of participants WITH statements on barriers	139	79
Number of participants WITHOUT statements on barriers	37	21
Number of participants	176	100

Discussion

We found that many mental health care professionals were not sure of how to evaluate online therapy in a psychiatric inpatient care setting. This may be related to the reported lack of practical experience. Nevertheless, 48% of the participants were interested in using online therapy in their daily routine. Thus, health care professionals in psychiatry seem to have a slightly more positive attitude towards e-health than their colleagues in inpatient rehabilitation centres with different diagnostic orientations, only 12% of whom showed a high level of intention to use e-health [28].

In line with an earlier study in which therapists who performed blended cognitive behavioural therapy were interviewed [19], the current study found that the most frequently mentioned potential benefit of the implementation of e-mental health in German inpatient care was providing better structured psychotherapeutic treatment. Further benefits were being an attractive add-on to face-to-face treatment and empowering patients. Nevertheless, our results on benefits suggest that for professionals a blended format that replaces parts of the current face-to-face interactions by digital tools would be more difficult to accept than e-mental health as add-on. To our knowledge, to date, no other study has assessed the potential benefits of online interventions in German psychiatric inpatient routine care from the view of the mental health professionals.

Regarding perceived barriers to implementation of online therapy in routine psychiatric inpatient care in Germany, this study reveals the serious concern that patients admitted to hospital because of the severity of their illness may not be willing or cognitively and mentally able to partake in online therapy. Additionally, mental health professionals worry that important face-to-face contacts would be neglected. Furthermore, they point to a lack of financial and personnel resources. In accordance with the present results, previous studies demonstrated that a severe course of disease [11, 17] and insufficient (technical) infrastructure [16] are perceived obstacles that prevent mental health professionals from using digital interventions in Germany and other Western societies [18]. The lack of infrastructure is particularly relevant in deprived and homeless patients with a high mental health burden because they will not be able to continue digital interventions after discharge [29].

Concerning facilitators, this study identified several factors that would be necessary for the implementation of e-mental health in the view of mental health care professionals working in psychiatric inpatient care in Germany. Amongst others, these facilitators include technical preconditions (internet access, workspaces, devices), usability of internet-delivered interventions, sufficient functional level of

Table 8 Facilitators to implement online therapy in psychiatric inpatient care—the view of health care professionals

Category	Codes	Participants *N*	%
Technical facilitators	Easy handling/high accessibility/usability	57	32
	Workspaces with computer/tablets/smartphones	39	22
	Free wireless internet access for patients	35	20
	High adaptability/individualization of programme	35	20
	Data security	34	19
	Overall technical preconditions	34	19
	Interoperability of programme	18	10
	Stability of programme	12	7
	Technical support available	4	2
	Offline mode available	2	1
Facilitating patient characteristics	Sufficient functional level of the patient	68	39
	Compliant/motivated patients	25	14
	Young patients	18	10
	Acceptance by patients	15	9
	Patients with affinity for technology	14	8
	First admission to hospital	3	2
	Experienced in psychotherapy	2	1
	No problems of loneliness	1	1
Organisational facilitators	Further education/training of staff	58	33
	Clear workflow structure	25	14
	Informing patients	25	14
	Acceptance by staff	25	14
	No substitution of face-to-face contact	20	11
	Financing/availability of logins	19	11
	Relating therapist must stay present	18	10
	More experience	7	4
	More research	7	4
	(Time) efficiency	6	3
	Personnel resources	6	3
	More evidence	5	3
	Trust	4	2
	Openness of the hospital management	4	2
	Defined inclusion and exclusion	2	1
	Legal basis for the prevention of risks	1	1
No barriers to overcome—no actions are required		10	6
Number of participants WITH statements on facilitators		156	89
Number of participants WITHOUT statements on facilitators		20	11
Number of participants		176	100

patients, and further training of staff. In particular the technical aspects (availability, reliability and interoperability) and the appropriateness of the internet-delivered interventions for addressing a patient's mental health problem are also reflected in an earlier systematic review of implementation research [22]. The need for targeted training and support of professionals with clear transparent protocols was also emphasised by a recent review by Davies et al. on health care professionals' perceptions of web-based psychological treatments in routine care [18]. Probably because most of the patients in psychiatric inpatient care are severely impaired, the professionals in the present study placed greater emphasis on the fact that a certain level of functioning in patients is a prerequisite for the use of e-mental health. The other reviews mentioned above included all possible treatment settings but more frequently examined scenarios in the outpatient setting.

Taken together, these findings about barriers and facilitators suggest that a successful implementation of online therapy in psychiatric inpatient routine care would work only

if technical preconditions were met and if the internet-delivered interventions were tailored to the needs of psychiatric hospitals, i.e. high usability for patients and professionals. It is especially important to involve mental health professionals in the selection of online therapy programmes because individual needs vary considerably. However, studies on telepsychiatry, i.e. treatment via videoconferencing, suggest that our findings may not be specific to internet-delivered interventions [30–32]. The concerns of mental health care professionals regarding therapeutic alliance, privacy, safety and technology issues and their demands regarding financing, credentialing and education are very similar and universally valid [18]. Thus, the extensive adaptation of the clinical workflow is essential to the mental health care professional's acceptance of e-health options, irrespective of the technology.

Limitations

The participants in this study lacked practical experience with e-mental health so the reported benefits, barriers and facilitators of online therapy in psychiatric inpatient care remain rather hypothetical. Despite the 2-week test period with the moodbuster platform to prepare for the workshops, 77% of participants indicated having no experience at all with online interventions. Other studies revealed that professionals' attitude towards online therapy improves with more frequent use [19]. Implementation studies should be undertaken to investigate benefits, barriers and facilitators and also to compare online therapy as an add-on with blended therapy in psychiatric inpatient care in practice.

A methodological shortcoming of the study is that responses to the open-format questions were coded by only one coder. However, the questions regarding potential benefits, barriers and facilitators of e-mental health in psychiatric inpatient care were very precise and the short written answers left little room for interpretation. Therefore, we assume that this shortcoming did not cause any bias in the results.

Moreover, it is important to bear in mind that the present data were collected before the 2020 global corona pandemic, which represented a high mental health burden and required digital interventions to avoid infections [33, 34]. Today, many areas of life have been switched to digital solutions without personal contact. This includes psychiatric care, which partially introduced telepsychiatry, i.e. treatment via telephone or video [35]. In Germany, many doctors currently expect that even after the pandemic, video consultation will be used more often than it was before [36]. We assume that mental health care professionals' attitude towards online treatment as an add-on or in a blended format will also further improve as a result of the recent experiences. To gain further information on this topic, we recommend that future studies evaluate professionals' view of online therapy and implementations during and after the global corona pandemic.

Conclusion

This study sheds light on the specific benefits, barriers and facilitators concerning the implementation of e-mental health in psychiatric inpatient care. It shows that mental health care professionals in Germany see potential added value of internet-delivered interventions for inpatient routine care, for instance regarding better structured psychotherapy and patient empowerment. These benefits seem to make it worthwhile to tackle the barriers to implementation. Besides technical preconditions on the organisational level and further education of staff, the features of the internet-delivered interventions appear to be crucial facilitators.

To be accepted, internet-delivered interventions should be highly interoperable with a hospitals' existing digital documentation system and capable of being integrated into the inpatient workflow. In addition, online therapy should be easy to use for patients and professionals. Especially for inpatient care, the cognitive demands that the online therapy places on the patient should be highly adjustable by professionals. In line with the proposed actions by the European transnational policy for e-mental health [37], we recommend strengthening implementation research on the organisational level.

Supplementary Information The online version contains supplementary material available at https://doi.org/10.1007/s00406-021-01251-1.

Acknowledgements We would like to thank the participants and the management of the participating hospitals for supporting this survey.

Funding The eMEN project received funding from the European Union's Interreg Northwest Europe programme.

Availability of data and material The raw data with assigned codes in MaxQDA Software are available from the first author, Julia Sander: j.sander@dgppn.de.

Code availability Not applicable.

Declarations

Conflict of interest The authors declare that they have no conflicts of interest.

References

1. Andersson G, Carlbring P, Titov N, Lindefors N (2019) Internet interventions for adults with anxiety and mood disorders: a narrative umbrella review of recent meta-analyses. Can J Psychiatry 64(7):465–470. https://doi.org/10.1177/0706743719839381

2. Johansson R, Andersson G (2012) Internet-based psychological treatments for depression. Expert Rev Neurother 12(7):861–870. https://doi.org/10.1586/ern.12.63
3. Baumeister H, Reichler L, Munzinger M et al (2014) The impact of guidance on internet-based mental health interventions—a systematic review. Internet Interv 1:205–215. https://doi.org/10.1016/j.invent.2014.08.003
4. Carlbring P, Andersson G, Cuijpers P, Riper H, Hedman-Lagerlöf E (2018) Internet-based vs. face-to-face cognitive behavior therapy for psychiatric and somatic disorders: an updated systematic review and meta-analysis. Cogn Behav Ther 47(1):1–18. https://doi.org/10.1080/16506073.2017.1401115
5. van der Vaart R, Witting M, Riper H et al (2014) Blending online therapy into regular face-to-face therapy for depression: content, ratio and preconditions according to patients and therapists using a Delphi study. BMC Psychiatry 14:355. https://doi.org/10.1186/s12888-014-0355-z
6. Erbe D, Eichert HC, Riper H, Ebert DD (2017) Blending face-to-face and internet-based interventions for the treatment of mental disorders in adults: systematic review. J Med Internet Res 19(9):e306. https://doi.org/10.2196/jmir.6588
7. Zwerenz R, Becker J, Knickenberg RJ, Siepmann M, Hagen K, Beutel ME (2017) Online self-help as an add-on to inpatient psychotherapy: efficacy of a new blended treatment approach. Psychother Psychosom 86(6):341–350. https://doi.org/10.1159/000481177
8. Kenter RMF, van de Ven PM, Cuijpers P et al (2015) Costs and effects of internet cognitive behavioral treatment blended with face-to-face treatment: results from a naturalistic study. Internet Interv 2(1):77–83. https://doi.org/10.1016/j.invent.2015.01.001
9. Kooistra LC, Wiersma JE, Ruwaard J et al (2019) Cost and effectiveness of blended versus standard cognitive behavioral therapy for outpatients with depression in routine specialized mental health care: pilot randomized controlled trial. J Med Internet Res 21(10):e14261. https://www.jmir.org/2019/10/e14261/. Accessed 11 Mar 2021
10. Leigh S, Ashall-Payne L (2019) The role of health-care providers in mHealth adoption. Lancet Digital Health 1(2):e58–e59. https://doi.org/10.1016/S2589-7500(19)30025-1
11. Titzler I, Saruhanjan K, Berking M, Riper H, Ebert DD (2018) Barriers and facilitators for the implementation of blended psychotherapy for depression: a qualitative pilot study of therapists´ perspective. Internet Interv 12:150–164. https://doi.org/10.1016/j.invent.2018.01.002
12. Venkatesh V, Morris M, Davis G, Davis F (2003) User acceptance of information technology: toward a unified view. MIS Q 27(3):425–478. http://www.jstor.org/stable/30036540. Accessed 11 Mar 2021
13. Kerst A, Zielasek J, Gaebel W (2019) Smartphone applications for depression: a systematic literature review and a survey of health care professionals' attitudes towards their use in clinical practice. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 270:139–152. https://doi.org/10.1007/s00406-018-0974-3
14. Topooco N, Riper H, Araya R et al (2017) Attitudes towards digital treatment for depression: a European stakeholder survey. Internet Interv 8:1–9. https://doi.org/10.1016/j.invent.2017.01.001
15. Dockweiler C, Kupitz A, Palmdorf S et al (2020) Onlinetherapie bei depressiven Störungen [Online therapy for depressive disorders]. Nervenarzt 91:243–251. https://doi.org/10.1007/s00115-019-0730-6
16. Hennemann S, Beutel M, Zwerenz R (2017) Ready for eHealth? Health professionals' acceptance and adoption of ehealth interventions in inpatient routine care. J Health Commun 22(3):274–284. https://doi.org/10.1080/10810730.2017.1284286
17. Dorow M, Stein J, Förster F et al (2018) Implementation of the internet-based self-management program "moodgym" in patients with depressive disorders in inpatient clinical settings—patient and expert perspectives. Psychiatr Prax 45(5):256–262. https://doi.org/10.1055/s-0043-117049
18. Davies F, Shepherd HL, Beatty L, Clark B, Butow P, Shaw J (2020) Implementing web-based therapy in routine mental health care: systematic review of health professionals' perspectives. J Med Internet Res 22(7):e17362. https://doi.org/10.2196/17362
19. Mol M, van Genugten C, Dozeman E et al (2019) Why uptake of blended internet-based interventions for depression is challenging: a qualitative study on therapists' perspectives. J Clin Med 9(1):91. https://doi.org/10.3390/jcm9010091
20. Breedvelt JJ, Zamperoni V, Kessler D et al (2019) GPs' attitudes towards digital technologies for depression: an online survey in primary care. Br J Gen Pract 69(680):e164–e170. https://doi.org/10.3399/bjgp18X7007
21. Titov N, Dear B, Nielssen O et al (2018) ICBT in routine care: a descriptive analysis of successful clinics in five countries. Internet Interv 13:108–115. https://doi.org/10.1016/j.invent.2018.07.006
22. Vis C, Mol M, Kleiboer A et al (2018) Improving implementation of emental health for mood disorders in routine practice: systematic review of barriers and facilitating factors. JMIR Ment Health 5(1):e20. https://doi.org/10.2196/mental.9769
23. e-Mental Health Innovation and Transnational Implementation Platform North West Europe (eMEN) (2020) Project summary. https://www.nweurope.eu/projects/project-search/e-mental-health-innovation-and-transnational-implementation-platform-north-west-europe-emen/undefined Accessed 17 020
24. Gaebel W, Lukies R, Kerst A et al (2020) Upscaling e-mental health in Europe: a six-country qualitative analysis and policy recommendations from the eMEN project. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. https://doi.org/10.1007/s00406-020-01133-y
25. Creswell J (2003) Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches, 4th edn. Sage, Thousand Oaks
26. Ebner-Priemer UW, Trull TJ (2009) Ecological momentary assessment of mood disorders and mood dysregulation. Psychol Assess 21(4):463–475. https://doi.org/10.1037/a0017075
27. Tonn P, Reuter SC, Kuchler I et al (2017) Development of a questionnaire to measure the attitudes of laypeople, physicians, and psychotherapists toward telemedicine in mental health. JMIR Ment Health 4(4):e39. https://doi.org/10.2196/mental.6802
28. Mayring P (2010) Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken [Qualitative content analysis: basics and techniques], 11th edn. Beltz, Weinheim
29. Schreiter S, Bermpohl F, Krausz M et al (2017) The prevalence of mental illness in homeless people in Germany. Dtsch Arztebl Int 6114(40):665–672. https://doi.org/10.3238/arztebl.2017.0665
30. Cowan KE, McKean AJ, Gentry MT, Hilty DM (2019) Barriers to use of telepsychiatry: clinicians as gatekeepers. Mayo Clin Proc 94(12):2510–2523. https://doi.org/10.1016/j.mayocp.2019.04.018
31. Hubley S, Lynch SB, Schneck C, Thomas M, Shore J (2016) Review of key telepsychiatry outcomes. World J Psychiatry 6(2):269–282. https://doi.org/10.5498/wjp.v6.i2.269
32. Mitchell SA, MacLaren AT, Morton M, Carachi R (2009) Professional opinions of the use of telemedicine in child and adolescent psychiatry. Scott Med J 54:13–16. https://doi.org/10.1258/rsmsmj.54.3.13
33. Pierce M, Hope H, Ford T et al (2020) Mental health before and during the COVID-19 pandemic: a longitudinal probability sample survey of the UK population. Lancet Psychiatry 7(10):883–892. https://doi.org/10.1016/S2215-0366(20)30308-4
34. Liu S, Heinz A (2020) Cross-cultural validity of psychological distress measurement during the coronavirus pandemic. Pharmacopsychiatry 53(5):237–238. https://doi.org/10.1055/a-1190-5029
35. Shore JH, Schneck CD, Mishkind MC (2020) Telepsychiatry and the coronavirus disease 2019 pandemic—current and future

outcomes of the rapid virtualization of psychiatric care. JAMA Psychiatry. https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2020.1643

36. Obermann K et al (2020) Ärztliche Arbeit und Nutzung von Videosprechstunden während der COVID-19-Pandemie. Eine gemeinsame repräsentative deutschlandweite Befragung ambulant tätiger Ärztinnen und Ärzte durch die Stiftung Gesundheit in Zusammenarbeit mit dem health innovation hub [Medical work and use of video consultations during the Covid 19 pandemic—a joint representative survey of physicians working in outpatient care throughout Germany by the Stiftung Gesundheit in cooperation with the health innovation hub] Ärzte im Zukunftsmarkt Gesundheit 2020. https://www.stiftung-gesundheit.de/pdf/studien/aerzte-im-zukunftsmarkt-gesundheit_2020.pdf Accessed 17 Sept 2020
37. Gaebel W, Trost N, Diekmann S, Lukies R, Zielasek J (2019) Transnational policy for e-mental health: a guidance document for European policymakers and stakeholders. Co-funded by the EU Interreg North- West-Europe programme. LVR-Institute for Healthcare Research, Düsseldorf/Köln. https://www.nweurope.eu/media/10450/emen__transnational-policy-for-e-mental-health_guidance-document_3-2020.pdf Accessed 22 Sept 2020

Online publiziert: 20.01.2021

Antipsychotische Polypharmazie in der Behandlung von Patientinnen und Patienten mit Schizophrenie am Beispiel von neun psychiatrischen Fachkliniken des Landschaftsverbandes Rheinland

Antipsychotic Polypharmacy in the Treatment of Patients with Schizophrenia in Nine Psychiatric Hospitals of the Landschaftsverband Rheinland, Germany

Autoren

Christian Schmidt-Kraepelin[1], Eva Meisenzahl-Lechner[1,3], Milenko Kujovic[1], Joachim Cordes[1,2], Christina Engelke[1], Mathias Riesbeck[1], Jürgen Zielasek[3], Sandra Engemann[3], Jürgem Vrinssen[3], Isabell Lehmann[3], Anita Tönnesen-Schlack[5], Markus Banger[6], Martine Grümmer[7], Norbert Scherbaum[8], Jutta Muysers[9], Stephan Rinckens[10], Ralph Marggraf[11], Euphrosyne Gouzoulis-Mayfrank[3,4]

Institute

1 LVR-Klinikum Düsseldorf, Kliniken der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
2 Kaiserswerther Diakonie, Florence-Nightingale-Krankenhaus, Düsseldorf
3 LVR-Institut für Versorgungsforschung, Köln
4 LVR-Klinik Köln
5 LVR-Klinik Bedburg-Hau
6 LVR-Klinik Bonn
7 LVR-Klinik Düren
8 LVR-Klinikum Essen, Kliniken und Institut der Universität Duisburg-Essen
9 LVR-Klinik Langenfeld
10 LVR-Klinik Mönchengladbach
11 LVR-Klinik Viersen

Schlüsselwörter

antipsychotische Kombinationstherapie, Polypharmazie, Schizophrenie, Versorgungsforschung, Qualitätsindikator

Keywords

antipsychotic combination therapy, polypharmacy, schizophrenia, healthcare research, quality indicator

Bibliografie

Psychiat Prax
DOI 10.1055/a-1321-7866
ISSN 0303-4259
© 2021. Thieme. All rights reserved.
Georg Thieme Verlag KG, Rüdigerstraße 14, 70469 Stuttgart, Germany

Zusätzliches Material finden Sie unter: https://doi.org/10.1055/a-1321-7866

Korrespondenzadresse

Dr. Christian Schmidt-Kraepelin, LVR-Klinikum Düsseldorf, Kliniken der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Bergische Landstraße 2, 40629 Düsseldorf, Deutschland
Christian.Schmidt-Kraepelin@lvr.de

ZUSAMMENFASSUNG

Hintergrund Für die Behandlung von Menschen mit Schizophrenien wird vorrangig antipsychotische Monotherapie empfohlen. Antipsychotische Polypharmazie (APP) wird dennoch oft eingesetzt und dient als Qualitätsindikator.
Ziel der Arbeit Das Auftreten von APP an 9 psychiatrischen Kliniken des LVR zu untersuchen und die Nutzbarkeit als Qualitätsindikator zu diskutieren.
Material und Methoden Es wurden Behandlungsdaten von stationären und teilstationären Fällen mit der Hauptdiagnose ICD-10 F20.x im Zeitraum 6/2016 bis 6/2017 hinsichtlich der APP-Rate analysiert.
Ergebnisse Bei 6788 Behandlungsfällen wurde eine APP-Rate von 55,5 % ermittelt. Männliches Geschlecht, längere Verweildauer, keine Zwangsunterbringung und der Standort der Klinik waren mit APP assoziiert.
Diskussion Die APP-Rate ist im Vergleich bisherigen Ergebnissen hoch und weist erhebliche Unterschiede zwischen den Kliniken auf. Die Verwendung des Qualitätsindikators APP wird diskutiert.

ABSTRACT

Background Antipsychotics are the cornerstone in the treatment of schizophrenia and are primarily recommended as monotherapy by evidence-based guidelines. Nevertheless, antipsychotic polypharmacy (APP) is prevalent in routine practice and APP is also used as a quality indicator since 2016 in quality management programs.
Objective Based on routine data of nine psychiatric hospitals of the Landschaftsverband Rheinland (LVR)/Germany

Heruntergeladen von: Landschaftsverband Rheinland - Bibliothek. Urheberrechtlich geschützt.

the prevalence of APP was determined and correlated with factors of routine healthcare in order to monitor the adoption of APP and to discuss its feasibility as a quality indicator.
Materials and Methods All cases with schizophrenia (ICD-10 F20.x; ≥18 years) discharged between June 1st, 2016, and June 1st, 2017, (in-patient and day clinic) were extracted from an established research database shared by all nine hospitals and analyzed regarding APP prevalence at the time of discharge.
Results Based on 6,788 cases, the prevalence of APP was 55.5% with an average of 2.4 antipsychotics (SD = 0.6) administered simultaneously. In multivariate analyses, significant predictors for APP were: gender (male > female), the number of days in hospital (long > short), involuntary treatment (no > yes) and the location of the hospital.
Conclusions We found a high proportion of polypharmacy in inpatient schizophrenia patients and significant differences between hospitals. The use of the results as a quality indicator (criteria ≥ 2 antipsychotics) remains dependent on the background of the individual treatment courses, which cannot be adequately represented by the existing routine data. The LVR has been using the quality indicator of ≥ 3 antipsychotics since 2018, which is discussed as a more appropriate approach for future evaluations.

Antipsychotische Polypharmazie (APP) ist ein häufiges Phänomen in der klinischen Praxis. Zur Prüfung der Nutzbarkeit der APP-Rate auf Basis von Routinedaten im Rahmen des Qualitätsmonitorings mittels Qualitätsindikatoren wurde die Prävalenz der APP in den 9 psychiatrischen LVR-Kliniken des Landschaftsverbands Rheinland erhoben und zu weiteren Routinedaten in Beziehung gesetzt. Optimierungsmaßnahmen in Bezug auf die Verwendung der APP als Qualitätsindikator werden diskutiert.

Einleitung

In der Behandlung von Erkrankungen aus dem Formenkreis der Schizophrenien wird die antipsychotische Monotherapie (Gabe eines Antipsychotikums) von evidenzbasierten Leitlinien international (World Federation of Societies of Biological Psychiatry 2012 [1]) und in Deutschland [2] als primäre Behandlungsstrategie empfohlen. Grundlage dafür ist u. a., dass die wissenschaftliche Evidenz zu Wirkungen und Nebenwirkungen von Antipsychotika v. a. auf Studien mit Monotherapie beruht. Ein möglicherweise ungünstigeres Nebenwirkungsprofil bei antipsychotischer Polypharmazie (APP; die gleichzeitige Gabe von 2 oder mehr Antipsychotika) steht dabei einer bisher nicht hinreichend nachgewiesenen besseren Wirksamkeit gegenüber [3]. Als weitere Gründe für die Präferenz der monotherapeutischen Behandlungsstrategie gelten die mit der APP verbundene höhere Äquivalenzdosis an verabreichten Antipsychotika, mögliche Interaktionseffekte, höhere Behandlungskosten sowie eine reduzierte Patientencompliance (vgl. [4]).

Es gibt jedoch auch Gründe, die in bestimmten Fällen für den Einsatz einer APP sprechen können. Dazu gehört eine empfohlene zeitlich begrenzte Parallelbehandlung während eines Medikamentenwechsels. Weitere Argumente können eine ausgeprägte Symptomatik in unterschiedlichen psychopathologischen Domänen (Positiv-, Negativsymptomatik, Agitiertheit, depressive Symptomatik) [5] sein. Auch die Nutzung unterschiedlicher Applikationsformen (z. B. orale und intramuskuläre Depotgabe), eine verbesserte Wirksamkeit aufgrund unterschiedlicher Rezeptorbindungsprofile [6] der Präparate sowie die Verminderung von Nebenwirkungen [7] stellt ein Motiv für antipsychotische Kombinationstherapie dar.

In Abwägung der genannten Vor- und Nachteile wird die Indikation für eine APP deshalb v. a. beim Vorliegen einer Behandlungsresistenz gesehen. Diese ist gegeben, wenn nach erfolgter Monotherapie mit mindestens 3 Antipsychotika (einschließlich Clozapin, jeweils in hinreichender Dauer und Dosis, möglichst bei Adhärenzkontrolle) ein ungenügendes therapeutisches Ansprechen mit moderatem Schweregrad und weniger als 20% iger Symptomverbesserung in den Skalen PANSS, BPRS, SANS oder SAPS während 6-wöchiger Behandlungsphasen vorliegt [2, 8]. Nach einer Metaanalyse [9] ist eine ungenügende psychopharmakologische Response in 49–77% der Fälle jedoch recht häufig und das Vorliegen einer Behandlungsresistenz wird je nach Kriterium der Behandlungsresistenz auf 30% bis über 50% beziffert [2]. Nach erfolgter Entscheidung für eine antipsychotische Kombinationsbehandlung sollte diese unter engmaschiger Kontrolle der Nebenwirkungen und möglicher Medikamenteninteraktionen erfolgen [2]. Sinnvolle Kombinationen aus pharmakodynamischen Überlegungen der differenziellen sich möglicherweise ergänzenden Rezeptorprofile der Antipsychotika heraus sind die Kombination von Clozapin oder Olanzapin jeweils mit Amisulprid, Risperidon oder Aripiprazol [6].

Generell entspricht die APP-Rate in der klinischen Praxis je nach Behandlungssetting ca. 30–50% [2, 5]. In einer Erhebung an 14 psychiatrischen Kliniken in Deutschland (v. a. in NRW und Bayern) bei Patientinnen und Patienten mit Schizophrenie und erhöhter Inanspruchnahme stationärer Behandlung fand sich eine APP-Quote von ca. 44% [10]. Assion et al. [11] fanden bei Patientinnen und Patienten mit verschiedenen psychotischen Erkrankungen (Schizophrenie/F20, schizoaffektive Erkrankungen/F25, bipolare Erkrankung/F31) in 10 Kliniken des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL) eine antipsychotische Kombinationsbehandlung bei Entlassung bei 35,4% der Patientinnen und Patienten. Im Projekt Arzneimittelsicherheit in der Psychiatrie (AMSP) zeigten sich Prävalenzen bei Patientinnen und Patienten mit Schizophrenie in stationärer Behandlung von ca. 50% [12]. Eine Differenzierung hinsichtlich des Vorliegens einer Therapieresistenz war in diesen Studien nicht möglich.

In einer Studie zur Validierung des Konstrukts des Qualitätsindikators „Antipsychotische Polypharmazie“ wurde ein Zusammenhang zwischen einer Mehrfachkombination von Antipsychotika und einem schlechteren Behandlungsergebnis festgestellt [13]. Die Autorin und die Autoren diskutieren die Limi-

Heruntergeladen von: Landschaftsverband Rheinland - Bibliothek. Urheberrechtlich geschützt.

tationen ihrer Studie jedoch im Bezug darauf, dass auch biologische Aspekte der Erkrankung selbst für das schlechtere Behandlungsergebnis verantwortlich sein könnten. Der breite Einsatz von APP könnte daher den Versuch darstellen, auf eine fortdauernde und gesicherte (primäre) Behandlungsresistenz durch einen rationalen Behandlungsversuch zu reagieren. Andererseits könnte eine hohe Rate von APP bei Vorliegen anderer Gründe für eine (sogenannte sekundäre) Behandlungsresistenz auch ein Hinweis auf eine fehlende leitliniengerechte Behandlung sein, die sich erst nach Beurteilung des gesamten bisherigen Behandlungsverlaufs sicher erschließt.

Das LVR-Institut für Versorgungsforschung erhebt kontinuierlich Kennzahlen zur Qualitätsmessung im LVR-Klinikverbund [14, 15]. Dabei ist APP (bis 2017 definiert als 2 oder mehr Antipsychotika) zum Entlassungszeitpunkt einer von 17 Qualitätsindikatoren des LVR-Klinikverbunds. Ziel der vorliegenden Studie ist es, die Häufigkeit der APP zum Entlassungszeitpunkt von voll- und teilstationär behandelten Patientinnen und Patienten mit Schizophrenie an den 9 psychiatrisch-psychotherapeutischen Fachkliniken des LVR zu erheben und die Zusammenhänge mit anderen klinischen Variablen zu analysieren.

Methoden

Die 9 LVR-Kliniken verfügen mit 4326 psychiatrisch-psychotherapeutischen stationären Betten und Tagesklinikplätzen über 26,2 % der Gesamtplätze in NRW (N = 16 495). Im Jahr 2017 wurden im LVR-Klinikverbund 28,4 % der psychiatrischen KHG-Fälle in NRW behandelt (66 964 von 236 000 Fällen) [16]. Aus dem von den Kliniken geteilten Krankenhausinformationssystem (KIS) werden täglich klinische Routinedaten mittels automatisierter Schnittstellen ausgelesen und in die LVR-Forschungsdatenbank importiert. Beim Import erfolgt eine Pseudonymisierung der Daten. Aus dieser Forschungsdatenbank wurden für diese Untersuchung retrospektiv Behandlungsdaten von Patientinnen und Patienten mit Schizophrenie (Hauptentlassungsdiagnose F20.x, fallbezogen, stationär und teilstationär, ab 18 Jahre) der Abteilungen für Allgemeine Psychiatrie einschließlich der Abteilungen für Abhängigkeitserkrankungen und Gerontopsychiatrie der psychiatrischen Fachkrankenhäuser (darunter 2 Universitätsklinika) im Zeitraum 1.6.2016 bis 1.6.2017 extrahiert. Für die Studie liegt ein positives Ethikvotum der Medizinischen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf vom 14.09.2017 (Studiennummer 6031R, Registrierungs-ID 2017084407) vor.

Dabei wurden folgende Variablen erhoben: Anzahl Antipsychotika (einschließlich mittel- und niederpotente der 1. Generation sowie Depotmedikation; ohne Bedarfsmedikation) für alle verabreichten Dosierungen als Medikationsanordnungen zum Entlassungszeitpunkt, Geschlecht, Alter, Klinik (anonymisiert codiert als A–I), Verweildauer (in Tagen), Zwangsunterbringung bei Aufnahme oder im Verlauf (ja/nein) und psychische Komorbidität (ja/nein). Zusammenhänge zwischen diesen Faktoren und Polypharmazie wurden bivariat mittels Chi^2-Test (bei kategorialen Variablen) und Mann-Whitney-U-Test (bei metrischen Variablen) berechnet mit einem Signifikanzniveau von 5 % (2-seitig). Die Wahl der nonparametrischen Testung erfolgte aufgrund der oftmals fehlenden Normalverteilung, die durch einen Kolmogorov-Smirnoff-Test getestet wurde ($p < 0{,}001$ für Anzahl Psychopharmaka). Zusätzlich wurde eine multivariate logistische Regressionsanalyse mit Berücksichtigung aller obigen Variablen als Prädiktoren berechnet, um ihren jeweiligen Zusammenhang mit der antipsychotischen Polypharmazie (Polypharmazie ja vs. nein) adjustiert nach dem Einfluss weiterer Variablen zu bestimmen. Zudem wurden die verabreichten Einzelpräparate deskriptiv ausgewertet, einschließlich der Antipsychotikakombinationen, wobei lediglich die jeweiligen Zweifachkombinationen betrachtet wurden, auch wenn 3 oder mehr Präparate verabreicht wurden.

Ergebnisse

Die Stichprobencharakteristika finden sich in ▶ **Tab. 1**. Im Untersuchungszeitraum waren 6788 entlassene Fälle von 4208 Patientinnen und Patienten mit der Diagnose einer Schizophrenie (F20.x nach ICD-10) in den 9 beteiligten Kliniken des LVR-Klinikverbunds dokumentiert. Die Patientinnen und Patienten (vgl. auch ▶ **Tab. 1**) waren im Mittel 41,8 Jahre alt [Standardabweichung (SD) = 13,9; Range 18–90 Jahre], 64,9 % waren Männer. Die Behandlungen fanden zu 94,7 % im vollstationären Setting statt und zu 5,3 % in Tageskliniken. Die mittlere Behandlungsdauer über alle 9 Kliniken betrug 31,5 Tage (SD = 39,3). Eine Unterbringung nach dem PsychKG bei Aufnahme oder im Verlauf des stationären Aufenthalts erfolgte bei 23 %. Weitere psychische Störungen (neben F20.x) waren bei 46,8 % zu finden. Dies waren im Einzelnen F0x 1,4 %; F1x 36,7 %; F2x 0,9 %; F3x 2,3 %; F4x 3,3 %; F5x 2,0 %; F6x 4,5 %; F7x 3,2 % und F9x 1,1 %.

Bei 55,5 % der Fälle wurde mehr als ein Antipsychotikum zum Entlasszeitpunkt eingesetzt. Bei diesen Fällen betrug der Durchschnitt 2,4 Präparate (SD = 0,6; Median = 2, Interquartilrange = 2;3). In 37,2 % der Fälle wurden 2 Präparate verabreicht, in 14,9 % 3 Präparate und in 2,9 % 4–6 unterschiedliche Antipsychotika (▶ **Abb. 1**). Eine antipsychotische Monotherapie erfolgte in 41,3 % und in 3,3 % der Fälle wurde bei Entlassung kein Antipsychotikum verabreicht.

Betrachtet man die jeweils verabreichten Einzelpräparate (vgl. ▶ **Online-Tab. 3**), überwiegen deutlich die Antipsychotika der 2. Generation, wobei Olanzapin und Risperidon sowohl in der APP-Gruppe (28,0 bzw. 27,9 %) als auch in der Monotherapiegruppe (19,8 bzw. 22,5 %) am häufigsten eingesetzt wurden. Weitere häufig verabreichte Präparate waren Amisulprid (APP 13,2 %; Monotherapie 5,8 %), Aripiprazol 18,7 bzw. 8,4 %), Quetiapin (26,8 bzw. 8,7 %) und Clozapin (16,6 bzw. 5,8 %), wobei insbesondere Quetiapin in der APP-Gruppe deutlich häufiger eingesetzt wurde als in der Nicht-APP-Gruppe. Bei den Antipsychotika der 1. Generation überwiegt Haloperidol (15,3 bzw. 9,5 %). Depotpräparate (eingesetzt wurden ausschließlich solche der 1. Generation) sind deutlich nachgeordnet. Die mittel- und niederpotenten Antipsychotika (der 1. Generation) kamen in der APP-Gruppe ebenfalls häufig (3 Präparate jeweils bei ca. 10 % der APP-Fälle) zum Einsatz, in der Nicht-APP-Gruppe dagegen sehr selten (alle unter 0,3 %).

Entsprechend überwiegen auch bei der Betrachtung von Kombinationsbehandlungen (vgl. ▶ **Online-Tab. 4**) solche die

Heruntergeladen von: Landschaftsverband Rheinland - Bibliothek. Urheberrechtlich geschützt.

▶ **Tab. 1** Stichprobenbeschreibung (alle Statistiken bezogen auf N = 6788 Behandlungsfälle).

	APP			
	nein	**ja**	**gesamt**	**p[1]**
Gesamtzahl Fälle (N)	3020	3768	6788	
Anteil von gesamt (%)	44,5	55,5	100	
Anzahl (bei Entlassung gleichzeitig) verabreichter APs [MW (SD)]	0,9 (0,3); Median = 1; IQR = 1;1	2,4 (0,6); Median = 2; IQR = 2;3	1,7 (0,9); Median = 2; IQR = 1;3	**<0,001**
Alter [MW (SD)]	41,1 (14,2)	42,3 (13,7)	41,8 (13,9)	**<0,001**
Geschlecht [N (%[2])]				0,87
männlich	1957 (64,8)	2449 (65,0)	4406 (64,9)	
weiblich	1063 (35,2)	1319 (35,0)	2382 (35,1)	
Setting [N (%[2])]				0,87
vollstationär	2860 (94,7)	3565 (94,6)	6425 (94,7)	
teilstationär	160 (5,3)	203 (5,4)	363 (5,3)	
Verweildauer [Tage; MW (SD)]	26,8 (37)	35,2 (40,7)	31,5 (39,3)	**<0,001**
psychische Komorbidität [N (%[2])]	1444 (47,8)	1735 (46,0)	3179 (46,8)	0,14
Unterbringung nach PsychKG [N (%[2])]	813 (26,9)	750 (19,9)	1563 (23,0)	**<0,001**
%-Anteile je Klinik				**0,001**
A	39,0	61,0		
B	45,0	55,0		
C	39,2	60,8		
D	54,0	46,0		
E	43,3	56,7		
F	21,7	78,3		
G	44,6	55,4		
H	48,3	51,7		
I	45,4	54,6		


[1] Signifikanzniveau für Gruppenvergleich antipsychotische Polypharmazie ja vs. nein; Chi-Quadrat-Test bei Häufigkeiten; Mann-Whitney-U-Test bei stetigen Variablen
[2] Spalten-Prozent, jeweils relativiert auf die Gesamtfallzahl pro Spalte

ausschließlich Antipsychotika der 2. Generation umfassen mit einem Anteil (an allen APP-Fällen) von knapp 50 % (wobei zusätzlich auch ein mittel-/niederpotentes Antipsychotikum dazugegeben werden konnte; hochpotente oder Depotpräparate jedoch nicht). Die häufigsten Präparatkombinationen sind ▶ **Online-Tab. S4** zu entnehmen.

Von besonderem Interesse ist hier, wie häufig eine APP allein auf die (zusätzliche) Gabe eines mittel-/niederpotenten Antipsychotikum zurückzuführen ist, in Kombination mit (jeweils ausschließlich) einem Antipsychotika der 2. Generation (13,7 % aller APP-Fälle), einem hochpotenten (3,3 %) oder einem Depotpräparat (0,4 %) bzw. einem anderen mittel-/niederpotentem Antipsychotikum (lediglich 1 Fall; vgl. ▶ **Online-Tab. S4**). Dies ist somit insgesamt in 17,4 % der Fälle aller APPs gegeben, bezogen auf die Gesamtzahl aller Fälle in 9,7 %. Würden also Kombinationen, die ausschließlich durch mittel-/niederpotente Antipsychotika bedingt sind, nicht berücksichtigt, ergäbe sich eine (Gesamt-)APP-Rate von 45,8 %.

Die Behandlungsfälle mit vs. ohne Polypharmazie unterschieden sich signifikant hinsichtlich folgender Variablen: Patienten und Patientinnen mit Kombinationsbehandlung waren im Mittelwert signifikant älter als Patientinnen und Patienten mit höchstens einem Antipsychotikum (42,3 vs. 41,1 Jahre, $p < 0{,}001$), was v. a. auf eine höhere Polypharmazierate der 40–60-Jährigen (mit ca. 58 %) zurückzuführen war. Weitere Unterschiede zeigten sich in der längeren Verweildauer bei antipsychotischer Polypharmazie (35,2 vs. 26,8 Tage; $p < 0{,}001$) sowie einer geringeren Unterbringungsrate nach dem PsychKG bei antipsychotischer Polypharmazie (19,9 vs. 26,9 %; $p < 0{,}001$). Dagegen fanden sich keine signifikanten Unterschiede hin-

Heruntergeladen von: Landschaftsverband Rheinland - Bibliothek. Urheberrechtlich geschützt.



▶ **Abb. 1** Anzahl der antipsychotischen Wirkstoffe. Prozentanteile der jeweiligen Anzahl (antipsychotischer) Wirkstoffe ohne Bedarfsmedikation nach Kliniken.

▶ **Tab. 2** Ergebnisse der multivariaten logistischen Regressionsanalyse mit Berücksichtigung aller potenziellen Variablen. Polypharmazie wurde als abhängige dichotome Variable (ja vs. nein) definiert.

Variable	Odds Ratio	p
Alter	1,004	*0,06*
Geschlecht (männlich)	**1,124**	**0,034**
Verweildauer	**1,007**	**<0,001**
psychiatrische Komorbidität (nein)	1,045	0,41
Unterbringung nach PsychKG (nein)	**1,691**	**<0,001**
Setting (vollstationär)	1,101	0,39
Klinik (% APP):		
A (61,0 %)	**1,35**	**0,002**
B (55,0 %)	1,08	0,53
C (60,8 %)	**1,41**	**0,019**
D (46,0 %)	**0,79**	**0,008**
E (56,7 %)	*1,19*	*0,06*
F (78,3 %)	**3,11**	**<0,001**
G (55,4 %)	1,08	0,39
H (51,7 %)	0,91	0,45
I (54,6 %)	(Referenz)	–

sichtlich Geschlecht, Behandlungssetting (vollstationär/teilstationär) und psychischer Komorbidität (ja/nein). In einer explorativen Zusatzanalyse ergaben sich aber signifikante Zusammenhänge zwischen APP und der Komorbidität mit einer ICD-10-F1x-Diagnose (Substanzmissbrauch/-abhängigkeit), und zwar derart, dass Patienten ohne eine solche Komorbidität ein leicht erhöhtes Risiko für eine APP-Behandlung haben (ca. 57 % mit APP) im Vergleich zu solchen ohne F1-Komorbidität (ca. 53 % mit APP; OR = 1,2; p = 0,001). Bei den Komorbiditäten mit F3x (affektive Erkrankungen) oder F6x (Persönlichkeitsstörungen) ergaben sich keine signifikanten Unterschiede.

Zwischen den 9 LVR-Kliniken zeigten sich deutliche Unterschiede in der Polypharmazierate (p = 0,001; s. a. die jeweiligen APP-Raten in ▶ **Tab. 2**) mit einer Variationsbreite von 46,0 % bei Klinik D (mit im Mittel 1,7 verabreichten Präparaten) bis zu 78,3 % bei Klinik F (im Mittel 2,4 verabreichte Präparate). ▶ **Abb. 1** stellt die Unterschiede zwischen den Kliniken in der Anzahl der jeweils bei der Entlassung (gleichzeitig) verabreichten Präparate grafisch dar.

Die 9 Kliniken unterschieden sich erheblich hinsichtlich der Anzahl an Fällen mit Schizophrenie (zwischen 250 bis 1206 Fällen) sowie verschiedener weiterer Fallcharakteristika. Dies betraf sowohl das Alter (das Mittel pro Klinik variiert zwischen 38,8 und 45,8 Jahren; p < 0,001), die Geschlechteranteile (Männeranteil zwischen 55,2 und 71,0 %; p < 0,001), die mittlere Verweildauer (zwischen 22 und 45 Tagen; p < 0,001) sowie die jeweiligen psychischen Komorbiditäts- (zwischen 30,7 und 74,8 %; p < 0,001) und PsychKG-Anteile (zwischen 19,5 und 29,4 %; p < 0,001). Um die Unterschiede in der Polypharmazierate zwischen den Kliniken unter Berücksichtigung dieser Klinikunterschiede statistisch zu überprüfen, wurde eine multi-

Heruntergeladen von: Landschaftsverband Rheinland - Bibliothek. Urheberrechtlich geschützt.

variate logistische Regressionsanalyse zum Einfluss der genannten Variablen auf die Polypharmazierate berechnet. Die Ergebnisse sind in ▶ **Tab. 2** dargestellt.

Auch im multivariaten logistischen Regressionsmodell unter Berücksichtigung aller potenziellen Variablen zeigten sich signifikante Klinikunterschiede. In den Kliniken A, C und v. a. F ergaben sich signifikant erhöhte Polypharmazieraten, während diese in Klinik D signifikant niedriger waren (im Vergleich zu Klinik I mit 54,6 %, die als Referenzkategorie verwendet wurde). Zudem bestätigten sich die signifikanten Unterschiede hinsichtlich der Verweildauer (mit zunehmender Dauer erhöhtes Risiko) sowie der Unterbringung nach PsychKG (erhöhtes Risiko bei nicht nach PsychKG untergebrachten Patientinnen und Patienten). Anders als bei den bivariaten Analysen ergab sich für das Alter lediglich eine grenzwertige Signifikanz ($p = 0{,}06$ multivariat vs. $p < 0{,}001$ bivariat), jedoch ein signifikanter Unterschied hinsichtlich des Geschlechts (signifikant erhöhte APP-Rate bei Männern, in den bivariaten Analysen nicht signifikant).

Diskussion

In der vorliegenden Untersuchung lag die Prävalenz von APP mit 55,5 % über der in der aktuell gültigen S3-Leitlinie Schizophrenie geschätzten Rate von ca. 30 % [2] sowie höher als in einigen bisher vorgelegten empirischen Untersuchungen der letzten Jahre in Deutschland [10, 11]. Die Vergleichbarkeit mit weiteren Untersuchungen zu diesem Thema ist durch eine Abweichung der jeweiligen Definition von APP jedoch erschwert (vgl. [12]). Aber selbst wenn Kombinationsbehandlungen bedingt durch die zusätzliche Gabe von mittel- oder niederpotenten Antipsychotika der 1. Generation unberücksichtigt blieben, läge die APP-Quote mit 45,8 % weiterhin recht hoch.

Der hier gefundene hohe Anteil von APP könnte auch durch einen höheren Anteil therapieresistenter Patientinnen und Patienten in unserem Studienkollektiv bedingt sein. Er könnte damit das Ergebnis wiederholter erfolgloser medikamentöser Therapieversuche ohne therapeutische Alternative in den Behandlungsverläufen der von uns analysierten Kliniken sein. Der relativ hohe Anteil an APP könnte auch durch die fallbezogene Auswertung begünstigt sein, die mit einer erhöhten Repräsentation von Patientinnen und Patienten einhergeht, die mehrfach in dem betreffenden Zeitraum stationär behandelt wurden und damit solcher Patientinnen und Patienten, die durch ihre erhöhte Inanspruchnahme stationärer Aufenthalte einen schwereren Verlauf und damit ein höheres Potenzial für APP bieten. Auch zeigten Querschnittsstudien wie im vorliegenden Fall in der Vergangenheit wiederholt höhere APP-Raten als Längsschnittstudien [4], da durch die Erhebung zu einem bestimmten Zeitpunkt (in unserem Fall der Entlassungszeitpunkt) eine APP im Rahmen eines geplanten medikamentösen Umstellungsprozesses nicht sicher ausgeschlossen werden kann. Unterschiede des APP-Anteils aufgrund abweichender Einschlusskriterien zwischen den Studien (z. B. durch Hinzunahme nieder- und mittelpotenter AP) und Versorgungssettings (ambulant vs. stationär) kommen bei möglichen Unterschieden zu Vorbefunden hinzu. Bei der Interpretation ist weiterhin zu berücksichtigen, dass es sich um APP handelt, die möglicherweise auch subtherapeutische Dosierungen mit einbezogen hat, die nicht zwangsläufig zu einer erhöhten antipsychotischen Gesamtäquivalenzdosierung führen müssen. Unsere Studie zeigte im Gegensatz zu Vorarbeiten einen Zusammenhang mit höherem Alter, der zu dem in Vorstudien beschriebenen Zusammenhang mit der Erkrankungsdauer passen könnte [17]. Erstaunlich ist eine geringere APP-Rate bei Patientinnen und Patienten mit gesetzlichem Unterbringungsbeschluss nach PsychKG in den vorliegenden Ergebnissen. Möglicherweise führt die Ablehnung der Behandlung durch die Patientinnen und Patienten dazu, dass die Notwendigkeit einer Mehrfachverordnung von Antipsychotika schwerer vermittelbar ist.

Neben dem Hauptergebnis einer APP-Rate von 55,5 % im LVR ist bei der Einordnung der weiteren Ergebnisse aufgrund der o. g. Einschränkungen besonderes Augenmerk auf den Vergleich zwischen den Kliniken zu richten, der deutliche Unterschiede in der APP-Rate von 46–78 % zeigte. Zwar sind auch hier Klinikunterschiede im Patientenklientel mit signifikantem Zusammenhang zur APP empirisch feststellbar – dennoch lassen die sehr unterschiedlichen APP-Raten auch klinikassoziierte Einflüsse vermuten. Dafür spricht das Ergebnis der multiplen logistischen Regressionsanalyse, die signifikante Klinikunterschiede in der APP-Rate ergab.

Ein Ziel der Implementierung von Qualitätsindikatoren in der psychiatrischen Versorgung ist es, die Vergleichbarkeit der Behandlungsqualität zwischen den Kliniken zu ermöglichen. Durch die Anwendung einer multivariaten Analyse können zumindest einige Einflüsse durch abweichende Patientencharakteristika zwischen den Kliniken berücksichtigt werden. Die Verwendung des Qualitätsindikators APP, der Antipsychotika in Zweifachkombinationen miteinschließt, erscheint jedoch nicht sinnvoll, da der Einsatz von solchen Kombinationsbehandlungen in klinischen Situationen häufig indiziert sein kann. Neben den bestehenden Nachteilen, die in einer APP gesehen werden können, gibt es nachweislich und in Abhängigkeit der individuellen Behandlungsphase der Patienten und Patientinnen beschriebene positive Effekte in Bezug auf bestimmte Zweifachkombinationen. Correll et al. fanden in einer Metaanalyse geringere Non-Response-Raten bei Zweifachkombinationen gegenüber Monotherapie [18]. In einer Analyse hinsichtlich Unterschieden zwischen APP und Monotherapie auf der Basis von über 60 000 Patientinnen und Patienten in Finnland zeigte sich ein geringer, aber signifikanter Vorteil für APP gegenüber Monotherapie hinsichtlich der psychiatrischen Rehospitalisierungsrate [19]. Dabei war die Kombination aus Clozapin und Aripiprazol mit dem geringsten Risiko einer psychiatrischen Rehospitalisierung assoziiert und der Monotherapie mit Clozapin überlegen. Eine weitere Metaanalyse [20] analysierte Studien zu Unterschieden zwischen fortgesetzter APP vs. Umstellung auf Monotherapie. Die Abbruchrate nach Umstellung auf Monotherapie zeigte sich signifikant höher verglichen mit fortgesetzter APP, wobei keine Unterschiede in der Effektivität (Symptomatik und Rückfall) oder Nebenwirkungen (Gewichtszunahme) zu verzeichnen waren. So könnte es ein zu hinterfragendes Ziel darstellen, eine Reduktion von bereits etablierten APP und Umstellung auf Monotherapie anzustreben, ohne die Gesamtumstände des individuellen Behandlungsverlaufs in die Beurtei-

Heruntergeladen von: Landschaftsverband Rheinland - Bibliothek. Urheberrechtlich geschützt.

lung einzubeziehen. Auch unsere Ergebnisse zeigen, dass der fortbestehende Mangel an kontrollierten und qualitativ hochwertigen prospektiven Studien für Zweifachkombinationen kritisch bleibt. Der Einsatz von antipsychotischen Mehrfachkombinationen sollte daher weiterhin kritisch geprüft werden und es sollte ein rationaler Behandlungsansatz verfolgt werden [21].

Um den genannten Einschränkungen bei der Beurteilung des Qualitätsindikators insgesamt Rechnung zu tragen, erscheint es klinisch sinnvoll, wie in den Qualitätsindikatoren des LVR-Klinikverbunds mittlerweile umgesetzt, APP-Anteile von mehr als 2 gleichzeitig verordneten Antipsychotika vorrangig zu betrachten. Dies lässt sich mit dem LVR-Qualitätsindikator kontinuierlich erfassen, transparent darstellen und stellt eine relevante Zielgröße zur Reduktion von verzichtbarer APP dar. Eine Optimierung hinsichtlich der differenzierteren Erfassung der verabreichten Antipsychotika (z. B. nach antipsychotischer Potenz, Verabreichungsdauer, Dosis und Indikationen) wäre wünschenswert – erhöht jedoch die Komplexität der Auswertung und reduziert die Nutzbarkeit als Qualitätsindikator im routinemäßigen Einsatz. Es wäre von Vorteil, weitere behandlungsrelevante Parameter wie z. B. Anzahl und Dauer vorhergehender Monotherapien, Therapieresistenz oder Phasen der Erkrankungsverläufe mit chronifizierten Verlaufsformen zu erfassen, um den indikationsgemäßen Einsatz von APP bewerten zu können. Weitere Faktoren für eine antipsychotische Polypharmazie wie arztbedingte Faktoren oder genauere Erkenntnisse über die in unserer Studie evidenten klinikspezifischen Faktoren könnten in erster Linie über qualitative Untersuchungsverfahren erschlossen werden. Der Nutzen elektronisch gestützter Verfahren zum Monitoring von APP erhöht sich in Zukunft vor dem Hintergrund einer zunehmend differenzierteren Evidenz zum Einsatz von antipsychotischen Kombinationstherapien.

KONSEQUENZEN FÜR KLINIK UND PRAXIS

- Antipsychotische Polypharmazie (APP) ist in der stationären psychiatrischen Behandlung von Patientinnen und Patienten mit Schizophrenie ein häufiges Phänomen.
- Die Beurteilung eines Qualitätsindikators „Antipsychotische Polypharmazie“ sollte in Bezug auf Mehrfachverordnungen von 3 oder mehr Präparaten erfolgen.
- Die zunehmende Digitalisierung eröffnet die Möglichkeit, die Verordnungsgewohnheiten kontinuierlich zu erfassen und zum Zweck des Qualitätsmanagements nutzbar zu machen.
- Künftige Betrachtungen des Phänomens APP könnten der differenzierten Evidenz von Kombinationsbehandlungen mit 2 Antipsychotika durch Beurteilung des individuellen Behandlungsverlaufs Rechnung tragen, indem digitalisierte Behandlungspfade mit einbezogen werden.

Interessenkonflikt

Bei MB, JC, CE, SE, EGM, MG, CSK, MK, IL, EML, JM, RM, MR, SR, ATS und JV besteht kein Interessenkonflikt. NS hat für Tätigkeiten in Advisory Boards, Vortragstätigkeit, Erstellung von Manuskripten sowie Erstellung von Weiterbildungsmaterial Honorare von den Firmen AbbVie, Camurus, Hexal, Janssen-Cilag, Lundbeck, MSD, Medice, Mundipharma, Reckitt-Benckiser/Indivior und Sanofi-Aventis erhalten. Er hat in den letzten 3 Jahren an Medikamentenprüfungen teilgenommen, die von der pharmazeutischen Industrie finanziert wurden. JZ erhielt finanzielle Unterstützung der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN) zur Vorbereitung des DGPPN-Kongresses.

Literatur

[1] Hasan A, Falkai P, Wobrock T et al. World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) Guidelines for Biological Treatment of Schizophrenia, part 1: update 2012 on the acute treatment of schizophrenia and the management of treatment resistance. The world journal of biological psychiatry: the official journal of the World Federation of Societies of Biological Psychiatry 2012; 13: 318–378

[2] DGPPN. S3-Leitlinie Schizophrenie. 2019: Langfassung Version 1.0, zuletzt geändert am 15. März 2019, verfügbar unter: https://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/038-009.html

[3] Galling B, Vernon JA, Pagsberg AK et al. Efficacy and safety of antidepressant augmentation of continued antipsychotic treatment in patients with schizophrenia. Acta psychiatrica Scandinavica 2018; 137: 187–205

[4] Gallego JA, Bonetti J, Zhang JP et al. Prevalence and correlates of antipsychotic polypharmacy: A systematic review and meta-regression of global and regional trends from the 1970s to 2009. Schizophrenia Research 2012; 138: 18–28

[5] Galling B, Roldan A, Hagi K et al. Antipsychotic augmentation vs. monotherapy in schizophrenia: systematic review, meta-analysis and meta-regression analysis. World Psychiatry 2017; 16: 77–89

[6] Messer T, Schmauss M. Polypharmazie in der Behandlung psychischer Erkrankungen. Wien, New York: Springer; 2006

[7] Fleischhacker WW, Heikkinen ME, Olie JP et al. Effects of adjunctive treatment with aripiprazole on body weight and clinical efficacy in schizophrenia patients treated with clozapine: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. The international journal of neuropsychopharmacology/official scientific journal of the Collegium Internationale Neuropsychopharmacologicum (CINP) 2010; 13: 1115–1125

[8] Benkert O, Hippius H. Kompendium der psychiatrischen Pharmakotherapie. Berlin, New York, Heidelberg: Springer; 2015

[9] Leucht S, Leucht C, Huhn M et al. Sixty Years of Placebo-Controlled Antipsychotic Drug Trials in Acute Schizophrenia: Systematic Review, Bayesian Meta-Analysis, and Meta-Regression of Efficacy Predictors. AJ Psychiatry 2017; 174: 927–942

[10] Schmidt-Kraepelin C, Puschner B, Loos S et al. Antipsychotische Polypharmazie bei Patienten mit Schizophrenie und hoher Versorgungsinanspruchnahme. Psychiat Prax 2013; 40: 380–384

[11] Assion HJ, Schweppe A, Reinbold H et al. Pharmacological treatment for schizoaffective disorder: A comparison with schizophrenia and bipolar disorder. Der Nervenarzt 2019; 90: 1–8

[12] Toto S, Grohmann R, Bleich S et al. Psychopharmacological Treatment of Schizophrenia Over Time in 30 908 Inpatients: Data From the AMSP Study. Int J Neuropsychoph 2019; 22: 560–573

[13] Janssen B, Weinmann S, Berger M et al. Validation of Polypharmacy Process Measures in Inpatient Schizophrenia Care. Schizophrenia Bull 2004; 30: 1023–1033

Heruntergeladen von: Landschaftsverband Rheinland - Bibliothek. Urheberrechtlich geschützt.

[14] Lehmann I, Engemann S, Zielasek J et al. Regionale Entwicklung und Implementierung von Qualitätsindikatoren für die stationäre psychiatrisch-psychotherapeutische Versorgung. Berlin: Deutscher Kongress für Versorgungsforschung (DKVF); 2018

[15] Großimlinghaus I. Evidenzbasierte sektorübergreifende Qualitätsindikatoren sind praktikabel – Pro. Psychiat Prax 2018; 45: 62–63

[16] Landschaftsverband Rheinland. Steckbrief Klinikverbund. LVR; 2018: https://www.lvr.de/media/wwwlvrde/klinikhph/klinikverbund/dokumente_132/Steckbrief_Klinikverbund.pdf; Abrufdatum 04.10.2019

[17] Correll CU, Gallego JA. Antipsychotic polypharmacy: a comprehensive evaluation of relevant correlates of a long-standing clinical practice. Psychiatr Clin North Am 2012; 35: 661–681

[18] Correll CU, Rummel-Kluge C, Corves C et al. Antipsychotic combinations vs monotherapy in schizophrenia: a meta-analysis of randomized controlled trials. Schizophrenia Bull 2009; 35: 443–457

[19] Tiihonen J, Mittendorfer-Rutz E, Majak M et al. Real-World Effectiveness of Antipsychotic Treatments in a Nationwide Cohort of 29823 Patients With Schizophrenia. JAMA psychiatry 2017; 74: 686–693

[20] Matsui K, Tokumasu T, Takekita Y et al. Switching to antipsychotic monotherapy vs. staying on antipsychotic polypharmacy in schizophrenia: A systematic review and meta-analysis. Schizophr Res 2019; 209: 50–57

[21] Schmidt-Kraepelin C, Feyerabend S, Engelke C et al. A randomized double-blind controlled trial to assess the benefits of amisulpride and olanzapine combination treatment versus each monotherapy in acutely ill schizophrenia patients (COMBINE): methods and design. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2019. doi:10.1007/s00406-019-01063-4

Heruntergeladen von: Landschaftsverband Rheinland - Bibliothek. Urheberrechtlich geschützt.

frontiers in Public Health

ORIGINAL RESEARCH
published: 30 April 2021
doi: 10.3389/fpubh.2021.593307

Utilization of Inpatient Mental Health Care in the Rhineland During the COVID-19 Pandemic

Jürgen Zielasek[1], *Jürgen Vrinssen*[1] *and Euphrosyne Gouzoulis-Mayfrank*[1,2]*

[1] LVR-Institut für Versorgungsforschung, Köln, Germany, [2] LVR-Klinik Köln, Köln, Germany

Background: During the Coronavirus-19 (COVID-19) pandemic, considerable changes occurred in the utilization of mental health care.

Objectives: We conducted an analysis of the changes of inpatient and day patient mental health care utilization in an association of psychiatric hospitals during the COVID-19 pandemic.

Materials and Methods: We used the statistics database of the association of nine psychiatric hospitals of the Rhineland Regional Council (Landschaftsverband Rheinland, LVR). We compared the case numbers of spring 2019 and spring 2020 and analyzed alterations in the diagnostic spectrum. Finally, we analyzed the age, gender, and diagnoses of patients tested positive for COVID-19.

Results: A total of 25,612 inpatient psychiatric hospital admissions were assessed. Case rates decreased by 25% during the COVID-19 pandemic. Changes varied between diagnostic groups, and there were even increases in case numbers for certain diagnoses. Women and patients of higher ages were overrepresented among psychiatric inpatients with COVID-19.

Conclusions: The COVID-19 pandemic resulted in considerable reductions in the total number of mental health-care admissions and in changes in the diagnostic spectrum. The results may be explainable by deferrals of elective hospital admissions during the acute phase of the pandemic and by destabilizing effects of the pandemic and social distancing on people with mental disorders.

Keywords: in-patient and day patient mental healthcare, utilization, COVID-19, time series, pandemic

OPEN ACCESS

Edited by:
Wulf Rössler, Charité – Universitätsmedizin Berlin, Germany

Reviewed by:
Jerzy Samochowiec, Pomeranian Medical University, Poland
Holger Gothe, IGES Institute, Germany

***Correspondence:**
Euphrosyne Gouzoulis-Mayfrank
euphrosyne.gouzoulis-mayfrank@lvr.de

Specialty section:
This article was submitted to Public Mental Health, a section of the journal Frontiers in Public Health

Received: *11 September 2020*
Accepted: *22 February 2021*
Published: *30 April 2021*

Citation:
Zielasek J, Vrinssen J and Gouzoulis-Mayfrank E (2021) Utilization of Inpatient Mental Health Care in the Rhineland During the COVID-19 Pandemic. Front. Public Health 9:593307. doi: 10.3389/fpubh.2021.593307

INTRODUCTION

The Corona virus-19 disorder (COVID-19) pandemic developed rapidly worldwide in early 2020 (1), and health-care systems had to be reorganized in order to be able to cope with large numbers of critically ill COVID-19 patients. During the same period, reductions in hospital admissions for other somatic conditions and reductions in emergency admissions were noted (2, 3). Until now, there have been few reports about the utilization of inpatient mental health care during the COVID-19 pandemic.

During the first wave of the pandemic, Tromans and coworkers reported an approximate reduction in referrals to mental health services of about 38% in the National Health Service of Leicestershire United Kingdom (4). Another study from Leicestershire showed that the number of inpatient admissions was ∼20% lower during a 4-week period starting in mid-March 2020 compared to the same periods in 2018 and 2019 (5). Inpatient numbers were shown to be decreased due to reduced admissions and have a spike in discharges with the lockdown in the Cambridgeshire & Peterborough National Health Services Trust (6). Finally, emergency mental health service use decreased by 27% in the Central Institute for Mental Health in Mannheim, Germany (7).

Some non-peer-reviewed analyses reported further indicators of reduced utilization of psychiatric services. In the South London and Maudsley area National Health Service, Stewart and coworkers showed relatively stable caseloads and daily contacts in community mental health treatment, but some reductions in home treatment services and a shift to video consultations (8). In addition, they reported a 26% reduction in days as inpatients during the 31-day period after mid-March compared to the 31-day period before mid-March 2020. When comparing the same periods in 2019, they found a much lower reduction of only 3–8% (9). Finally, inpatient numbers decreased by 13.6% in the time period March 16–March 30, 2020, compared to the time period February 1–March 15, 2020 (10). Primary-care psychological therapies were even more affected: the number of patients accessing psychological therapies for anxiety and depression in southern England dropped by an average of 55% in the 9 weeks after lockdown (11).

Health-care services prepared themselves for the expected increased number of COVID-19 patients, and this included psychiatric hospitals (12). Mental health-care processes in inpatient services were restructured and reorganized, for example, by reorganizing regular psychiatric wards into COVID-19 isolation wards. Hygiene measures led to reductions of inpatient group therapies, protective face masks limited personal contact, and restrictions on visitors in hospitals due to inpatient lockdown regulations further reduced social contacts for inpatients [see (13) for examples from a German psychiatric hospital and Richter and Zürcher (14) for a more general discussion].

These changes also occurred in the nine psychiatric hospitals of the hospital association of the Rhineland Regional Council [Landschaftsverband Rheinland (LVR)]. These hospitals with ∼2,835 beds and 750 day patients places provide mental health-care services to approximately half of the population of the Rhineland (4.4 million inhabitants). Analyzing the inpatient utilization rates during the acute phase of the COVID-19 pandemic of such a large population may provide an important empiric foundation for preparing psychiatric hospitals for future virus pandemics. Notably, the actual average Day Mix Index (DMI) (reflects the ratio of case severity and duration of inpatient treatment) of the nine LVR hospitals is 0.9687, which is comparable to the DMI of 0.9613 of 74 psychiatric hospitals and departments in Northrhine Westphalia (NRW), Bavaria, and Saxony Anhalt (source: Krankenhauszweckverband, LVR Clinics Association). We analyzed the daily inpatient and day-patient admission rates and the clinical characteristics of the psychiatric inpatient COVID-19 cases of the nine participating psychiatric hospitals in the spring of 2020, during the first wave of the COVID-19 pandemic in Germany.

METHOD

The study was performed in accordance with the principles of the Helsinki Declaration. We analyzed the routine data of all inpatient and day-patient admission cases in all departments of the nine psychiatric hospitals of the LVR (general psychiatry, child and adolescent psychiatry, psychosomatic medicine, geriatric psychiatry, and addiction psychiatry) during the reporting periods from March 18 until May 31 for the years 2019 and 2020. The data included both planned and emergency admissions. Out-patient cases were not analyzed. Missing values of important data such as age or gender were very rare, and therefore no imputation of missing values was necessary.

To assess if the numbers of daily inpatient admissions were different before and during the COVID pandemic, we compared the daily admission numbers in the reporting periods of the years 2019 and 2020 using the Wilcoxon matched-pairs signed-rank test (double sided). To study if the COVID pandemic changed the diagnostic spectrum of inpatient cases, we assessed the frequencies of the main psychiatric diagnostic groups upon inpatient discharge and compared them before and during the COVID pandemic using the Chi-Square test. We did not use the admission diagnoses because these frequently change during the hospital stay due to incoming diagnostic information. In addition, we compared the mean age of patients who tested positive for COVID with the mean age of the non-COVID patients using the Student's *t*-test. Finally, we compared the gender distribution between COVID- and non-COVID patients using the Chi-Square test. We used a cutoff of $p < 0.01$ to indicate statistical significance. We used standard statistical software (GraphPad Prism version 9.0.0).

Routine data of the nine psychiatric hospitals of the Rhineland Regional Council are transferred on a daily basis to an anonymized statistics database, which serves quality assurance purposes and for the further development of quality of care. For the purpose of this study, we analyzed the aggregated data of all psychiatric departments of the nine hospitals (time series analysis of the sum of daily inpatient and day-patient admission rates, frequency of diagnoses of mental disorders, gender, and mean age of patients). Excel tables and arithmetic functions provided by Excel were used.

RESULTS

During the course of the COVID-19 pandemic, daily admission rates decreased in the time period March 18–May 31, 2020 ($n = 10{,}545$), by 25% compared to the same time period of the previous year ($n = 14.067$) (**Figure 1**). The daily admission rates were significantly different between both years (Wilcoxon matched-pairs signed-rank test, $p < 0.0003$). The admission




FIGURE 1 | Daily inpatient/day-patient admission rates in the time period January 15–May 31, 2019 (gray line), and the corresponding time period of the year 2020 (black line). The 2020 time series was adjusted to corresponding weekdays of 2019. In addition, an intercalary day (February 29, 2020) was considered. Weekly reductions in admission rates are due to weekend days.

rates of patients from different diagnostic groups according to the mental disorders section of the World Health Organization International Classification of Disorders (10th revision, ICD-10) decreased to varying degrees, and the overall frequencies of the 10 diagnostic groups (F0–F9) were significantly different in the 2 years of observation (Chi-Square test, df = 9, $p < 0.0001$). We found the most pronounced decreases in the diagnostic groups F7 (mental retardation: from 139 cases in 2019 to 68 cases in 2020, a reduction of 51%), F4 (neurotic, stress-related, and somatoform disorders: −35% from 594 to 385 cases), F3 (affective disorders: −34% from 5,002 to 3,288 cases), and F6 (disorders of adult personality and behavior: −31% from 525 to 363 cases). Compared to this, reductions of case numbers of the diagnostic groups F0/G3 (organic, including symptomatic, mental disorders and Alzheimer's disease) and F2 (schizophrenia, schizotypal, and delusional disorders) were less robust (−10% from 1,058 to 948 cases, and −9% from 2,844 to 2,586 cases, resp.) (**Figure 2**).

We analyzed the ten most frequent disorders of the year 2019 (same time period: March 18–May 31) and found the most pronounced reductions for cases with a moderate depressive episode (ICD-10 F32.1, −49% compared to 2019), mental and behavioral disorders due to use of opioids, dependency syndrome (F11.2, −43%), and severe depressive episode without psychotic symptoms (F32.2, −41%) (**Table 1A**).

When analyzing the 50 mental disorders, which occurred in at least 20 cases during the time period of March 18–May 31, 2019, we found a decrease of cases in 38 disorders, near constancy in 3 disorders, and increases in 9 disorders. We found the greatest increase of case numbers in patients with an acute polymorphic psychotic disorder with symptoms of schizophrenia (F23.1, +51%: from 82 cases in 2019 to 124 cases in 2020), mental and behavioral disorders due to multiple drug use and use of other psychoactive substances, dependence syndrome (F19.2, +50%: from 42 cases in 2019 to 63 cases in 2020), and mental and behavioral disorders due to use of alcohol, acute intoxication




FIGURE 2 | Numbers of inpatients/day patients of the nine psychiatric hospitals of the hospital association of the Rhineland Regional Council in the time period March 18–May 31 in the years 2019 (blue bars) and 2020 (orange bars). Given are the codes of the tenth revision of the International Classification of Disorders of the World Health Organization (ICD-10). F0/G3: Organic, including symptomatic, mental disorders, and Alzheimer's disease. F1: Mental and behavioral disorders due to psychoactive substance use. F2: Schizophrenia, schizotypal, and delusional disorders. F3: Affective disorders. F4: Neurotic, stress-related, and somatoform disorders. F6: Disorders of adult personality and behavior. F7: Mental retardation. ICD-10 groups F5 (behavioral syndromes associated with physiological disturbances and physical factors). F8: Disorders of psychological development and F9: Behavioral and emotional disorders with onset usually occurring in childhood and adolescence presented with <10 cases and are not shown.

(F10.0, +44%: from 48 cases in 2019 to 69 cases in 2020). **Figure 3** and **Table 1B** show the ranks of changes during the reporting period from 2019 to 2020 of the 20 most frequent mental disorders of 2019. F19.2 und F10.0 do not appear here

TABLE 1A | Diagnosis-specific case numbers in the observation period March 18–May 31 of the years 2019 and 2020 in the nine psychiatric hospitals.

Diagnosis ICD-10 code	Text	Numbers of cases 2019	Numbers of cases 2020	Relative change (%)
F10.2	Mental and behavioral disorders due to use of alcohol, dependence syndrome	2,085	1,577	−24
F33.2	Recurrent depressive disorder, current episode severe without psychotic symptoms	1,921	1,324	−31
F20.0	Paranoid Schizophrenia	1,860	1,645	−12
F32.2	Severe depressive episode with psychotic symptoms	1,556	922	−41
F11.2	Mental and behavioral disorders due to use of opioids, dependence syndrome	712	403	−43
F05.1	Delirium superimposed on dementia	427	414	−3
F33.1	Recurrent depressive disorder, current episode moderate	403	248	−38
F60.31	Emotionally unstable personality disorder, borderline	395	291	−26
F32.1	Moderate depressive episode	313	161	−49
F43.2	Adjustment disorder	277	191	−31

Shown are the 10 most-frequent diagnoses during the observation period in 2019 and the change from 2019 to 2020. ICD-10: 10th revision of the International Classification of Disorders issued by the World Health Organization.




FIGURE 3 | Changes of the case numbers of the 20 most frequent diagnoses in the observation period March 18–May 31, 2019. Diagnoses are ranked by the degree of relative change from 2019 to 2020 (% of case numbers of 2019). Codes as of the 10th revision of the International Classification of Disorders issued by the World Health Organization.

since they were not among the 20 most frequent disorders of the year 2019.

During the reporting period, 28 patients with COVID-19 were documented among inpatients of the nine psychiatric hospitals. The mental disorders diagnosed in these patients were organic mental disorders including Alzheimer's dementia ($n = 11$), affective disorders ($n = 10$), schizophrenia ($n = 4$), substance use disorders ($n = 2$), and adjustment disorders ($n = 1$). Most cases occurred in women (75%), while women constituted only 51% of all 8,696 inpatients and day patients during the reporting period (Chi Square test, df = 1, $p < 0.0015$). Patients with COVID-19 were significantly older than the patients without COVID-19 [mean age (±standard deviation) 67.5 (±19.9) years vs. 48.3 (±18.3) years; Student's t-test $p < 0.001$]. This finding corresponded with an overrepresentation of organic mental disorders among the patients who tested positive for COVID-19: 39% of all psychiatric patients with COVID-19 were diagnosed with an organic mental disorder including Alzheimer's dementia, while this was the case in only 9% of the psychiatric non-COVID-19 cases. For affective disorders, this relationship was more balanced: 36% of the COVID-19 patients and 33% of the non-COVID-19 cases were diagnosed with an affective disorder (F3). In other diagnostic groups, the numbers of patients with COVID-19 were four or fewer; therefore, we cannot judge whether the

TABLE 1B | Diagnosis-specific case numbers in the observation period March 18–May 31 of the years 2019 and 2010 in the nine psychiatric hospitals.

Rank	Diagnosis ICD-10 code	Text	Number of cases 2019	Number of cases 2020	Relative change (%)
1	F23.1	Acute polymorphic psychotic disorder with symptoms of schizophrenia	82	124	+51
2	F03	Unspecified dementia	73	104	+42
3	F25.2	Schizoaffective disorder, mixed type	172	174	+1
4	F25.0	Schizoaffective disorder, manic type	201	202	0
5	F05.1	Delirium superimposed on dementia	427	414	−3
6	F12.5	Mental and behavioral disorders due to use of cannabinoids, psychotic disorder	136	122	−10
7	F20.0	Paranoid schizophrenia	1,860	1,645	−12
8	F33.3	Recurrent depressive disorder, current episode severe with psychotic symptoms	228	197	−14
9	F10.2	Mental and behavioral disorders due to use of alcohol, dependence syndrome	2,085	1,577	−24
10	F60.31	Emotionally unstable personality disorder, borderline	395	291	−26
11	F25.1	Schizoaffective disorder, depressive type	265	195	−26
12	F32.3	Severe depressive episode with psychotic symptoms	179	129	−28
13	F33.2	Recurrent depressive disorder, current episode severe without psychotic symptoms	1,921	1,324	−31
14	F43.2	Adjustment disorders	277	191	−31
15	F33.1	Recurrent depressive disorder, current episode moderate	403	248	−38
16	F10.3	Mental and behavioral disorders due to use of alcohol, withdrawal state	268	164	−39
17	F32.2	Severe depressive episode without psychotic symptoms	1,556	922	−41
18	F31.4	Bipolar affective disorder, current episode severe depression without psychotic symptoms	153	89	−42
19	F11.2	Mental and behavioral disorders due to use of opioids, dependence syndrome	712	403	−43
20	F32.1	Moderate depressive episode	313	161	−49

Shown are the 20 most-frequent diagnoses of the observation time period of the year 2019 sorted by their ranks of relative change from 2019 to 2020. ICD-10: 10th revision of the International Classification of Disorders issued by the World Health Organization.

distribution among COVID-19 and non-COVID-19 cases was balanced or not.

DISCUSSION

Our analyses show that the first wave of the COVID-19 pandemic was associated with considerable changes in the utilization of inpatient/day-patient services of a large psychiatric hospital association in the German Rhineland region. The region has both rural and urban parts, including the major metropolitan regions of Cologne, Düsseldorf, and the western part of the Ruhr Valley. Our analysis is limited by the regional constraint. However, with more than four million inhabitants served by the LVR Clinics Association, we provide the first analysis of the full data of one of the largest providers of psychiatric inpatient and outpatient hospital care in Germany. Until the end of the observation period, which included the end of the first wave of COVID-19 in Germany, admission rates remained lower than in the corresponding time period of the previous year. This finding implies considerable effects on the provision of mental health care for people with mental disorders. While the results of our study cannot be generalized to other regions and countries, another study in Germany showed a ca. 27% decline in emergency mental-health service use in one psychiatric hospital, which is comparable with our results, and evidence from studies from the UK and Germany points to the same direction of an overall reduction of inpatient mental healthcare utilization (7–11). Our study adds new information about a diagnostic shift toward more acutely ill patients. Of course, the data do not allow an assessment of whether the change in utilization behavior was associated with diagnostic delay or a shift of inpatient cases to later disease stages or with poorer treatment outcomes due to delayed interventions.

The long-term effects of the COVID pandemic on inpatient mental health-care utilization remain to be seen, especially as experts predicted long-term increases of mental-health problems due to COVID-19-associated psychological burden and social contact restrictions (15) with patients with preexisting mental disorders being at increased risk (16). Therefore, our findings from the first wave of the COVID pandemic may not be predictive for mental health-care utilization in the near future (17, 18). This corresponds to findings from earlier Coronavirus-associated pandemics demonstrating a long-lasting increase of mental disorders (19) and an associated increase of mental health-care utilization (20). In addition, at the time of writing of this report in October 2020, a second wave of COVID-19 cases in Germany became apparent.

In our study, admission rates declined more clearly in groups of patients with disorders which frequently led to elective (non-emergency) mental hospital admission (depressive disorders and admission for detoxication from opioid dependency). This profound decline may be the result of delaying planned inpatient admissions due to the provisioning of capacities for COVID-19 cases and other hygiene-related measures. On the other hand, admission rates increased for patient groups with disorders which frequently led to emergency admissions, such as acute psychotic

disorders and alcohol intoxication. This finding may reflect the destabilizing effects of the pandemic and the social lockdown regulations on pre-existing mental disorders. This assumption is corroborated by early case reports about the exacerbation of psychotic disorders during the COVID-19 pandemic (16, 21). Initial reports also indicate that the use of substances of addiction was changing in Germany during the COVID-19 pandemic (22). It remains to be seen how the altered patterns of mental health-care utilization will change in the near future. The incipient second COVID-19 wave may become superimposed on urgent admissions due to previous delays of admissions (18), and this may result in a total increase in case numbers. Mental health-care services will definitely change and empirical data as in our study may help to inform these processes (23). Further analyses are warranted to examine the potential effects of sociodemographic and clinical variables on inpatient psychiatric services utilization during times of virus pandemic.

The findings of a preponderance of women, people of higher ages, and patients with organic mental disorders among the psychiatric cases of COVID-19 must be interpreted with caution due to the low numbers of cases. Interestingly, a recent analysis of electronic health records in the US showed an increased risk of COVID-19 in people with mental disorders, and, similarly to the results of our study, the risk was especially increased for women and for people of higher ages (24). Further long-term studies and studies in other regions and care settings are needed to address this issue. The findings may reflect a real increase of COVID-19 cases among these patient groups, or they may be due to a positive testing bias in high-risk groups of severe courses of COVID-19 and in women.

The total number of patients with COVID-19 among patients of the nine psychiatric hospitals was rather low during this initial wave of the pandemic. Long-term studies are now warranted since increases in case numbers of COVID-19 are incipient, and the abovementioned mechanisms may lead to overall increased utilization of inpatient psychiatric hospital services in the future (18).

DATA AVAILABILITY STATEMENT

The data analyzed in this study is subject to the following licenses/restrictions: anonymised and aggregated raw data are made available upon due request to reproduce the statistical analyses. Requests to access these datasets should be directed to juergen.zielasek@lvr.de.

ETHICS STATEMENT

Ethical review and approval was not required for the study on human participants in accordance with the local legislation and institutional requirements. Written informed consent for participation was not required for this study in accordance with the national legislation and the institutional requirements.

AUTHOR CONTRIBUTIONS

JZ, JV, and EG-M: conception and design, data collection, analysis and interpretation of the data, drafting the article, revising the article critically for important intellectual content, and final approval of the version to be published. All authors contributed to the article and approved the submitted version.

REFERENCES

1. Saglietto A, D'Ascenzo F, Zoccai GB, De Ferrari GM. COVID-19 in Europe: the Italian lesson. *Lancet*. (2020) 395:1110–1. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30690-5
2. De Filippo O, D'Ascenzo F, Angelini F, Bocchino BP, Conrotto F, Saglietto A, et al. Reduced rate of hospital admissions for ACS during Covid-19 outbreak in Northern Italy. *N Engl J Med*. (2020) 383:88–9. doi: 10.1056/NEJMc2009166
3. Slagman A, Behringer W, Greiner F, Klein M, Weismann D, Erdmann B, et al. Medizinische Notfälle während der COVID-19-Pandemie – Analyse von Notaufnahmedaten in Deutschland. [Medical emergencies during the COVID-19 pandemic – an analysis of emergency department data in Germany] *Dtsch Arztebl Int*. (2020) 117:545–52. doi: 10.3238/aerztebl.2020.0545
4. Tromans S, Chester V, Harrison H, Pankhania P, Booth H, Chakraborty N. Patterns of use of secondary mental health services before and during COVID-19 lockdown: observational study. *BJPsych Open*. (2020) 6:e117. doi: 10.1192/bjo.2020.104
5. Abbas MJ, Kronenberg G, McBride M, Chari D, Alam F, Mukaetova-Ladinska E, et al. The early impact of the COVID-19 pandemic on acute care mental health services. *Psychiatr Serv*. (2020) 72:242–6. doi: 10.1176/appi.ps.202000467
6. Chen S, Jones PB, Underwood BR, Moore A, Bullmore ET, Banerjee S, et al. The early impact of COVID-19 on mental health and community physical health services and their patients' mortality in Cambridgeshire and Peterborough, UK. *J Psychiatr Res*. (2020) 131:244–54. doi: 10.1016/j.jpsychires.2020.09.020
7. Hoyer C, Ebert A, Szabo K, Platten M, Meyer-Lindenberg A. Decreased utilization of mental health emergency service during the COVID-19 pandemic. *Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci*. (2021) 271:377–9. doi: 10.1007/s00406-020-01151-w
8. Stewart R, Martin E, Broadbent M. Mental health service activity during COVID-19 lockdown: South London and Maudsley data on working age community and home treatment team services and mortality from February to mid-May 2020. *medRxiv [Preprint]*. (2020). doi: 10.1101/2020.06.13.20130419
9. Stewart R, Broadbent M. Using past and current data to estimate potential crisis service use in mental healthcare after the COVID-19 lockdown: South London and Maudsley data. *medRxiv [Preprint]*. (2020). doi: 10.1101/2020.06.29.20142448
10. Stewart R, Martin E, Bakolis I, Broadbent M, Byrne N, Landau S. Comparison of mental health service activity before and shortly after UK social distancing responses to the COVID-19 pandemic: February-March 2020. *medRxiv [Preprint]*. (2020). doi: 10.1101/2020.09.26.20202150
11. Bauer-Staeb C, Davis A, Smith T, Wilsher W, Betts D, Eldridge C, et al. Impact of COVID-19 on primary care mental health services: a descriptive, cross-sectional timeseries of electronic healthcare records. *medRxiv [Preprint]*. (2020). doi: 10.1101/2020.08.15.20175562
12. Li L. Challenges and priorities in responding to COVID-19 in inpatient psychiatry. *Psychiatr Serv*. (2020) 71:appi.ps.2020001. doi: 10.1176/appi.ps.202000166
13. Kreuzer PM, Baghai TC, Rupprecht R, Wittmann M, Steffling D, Ziereis M, et al. SARS-CoV-2 risk management in clinical psychiatry: a few considerations on how to deal with an unrivaled threat. *Front Psychiatry*. (2020) 11:550. doi: 10.3389/fpsyt.2020.00550

14. Richter D, Zürcher S. Mental health care services during the Covid-19 pandemic. *Psychiatr Praxis*. (2020) 47:173–5 [Article in German]. doi: 10.1055/a-1157-8508
15. Hossain MM, Sultana A, Purohit N. Mental health outcomes of quarantine and isolation for infection prevention: a systematic umbrella review of the global evidence. *Epidemiol Health*. (2020) 42:e2020038. doi: 10.4178/epih.e2020038
16. Fischer M, Coogan AN, Faltraco F, Thome J. COVID-19 paranoia in a patient suffering from schizophrenic psychosis – a case report. *Psychiatr Res*. (2020) 288:113001. doi: 10.1016/j.psychres.2020.113001
17. Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatische Medizin und Nervenheilkunde. *Orientierungshilfen für die Versorgung*. (2020). Avaialble online at: https://www.dgppn.de/schwerpunkte/COVID-19/versorgung.html (accessed July 17, 2020) [In German].
18. Zielasek J, Gouzoulis-Mayfrank E. COVID-19 Pandemie. Psychische Störungen werden zunehmen. *Dt Ärzteblatt*. (2020) 117:A1114–7 [Article in German].
19. Lam MHB, Wing YK, Yu MWM, Leung CM, Ma RCW, Kong APS, et al. Mental morbidities and chronic fatigue in severe acute respiratory syndrome survivors. *Arch Intern Med*. (2009) 169:2142–7. doi: 10.1001/archinternmed.2009.384
20. Tansey CM, Louie M, Loeb M, Gold WL, Muller MP, de Jager JA, et al. One-year outcomes and health care utilization in survivors of severe acute respiratory syndrome. *Arch Intern Med*. (2007) 167:1312–20. doi: 10.1001/archinte.167.12.1312
21. Weise J, Schomerus G, Speerforck S. Die SARS-CoV-2-Pandemie und ein Suizidversuch bei wahnhafter Störung. *Psychiatr Praxis*. (2020) 47:218–20 [Article in German]. doi: 10.1055/a-1158-1745
22. Georgiadou E, Hillemacher T, Müller A, Koopmann A, Leménager T, Kiefer F. Die COVID-19-Pandemie als idealer Nährboden für Süchte. *Dt Ärzteblatt*. (2020) 117:A1251–4 [In German].
23. Moreno C, Wykes T, Galderisi S, Nordentoft M, Crossley N, Jones N, et al. How mental health care should change as a consequence of the COVID-19 pandemic. *Lancet Psychiatr*. (2020) 7:813–24. doi: 10.1016/S2215-0366(20)30307-2
24. Wang QQ, Xu R, Volkow ND. Increased risk of COVID-19 infection and mortality in people with mental disorders: analysis from electronic health records in the United States. *World Psychiatry*. (2020) 20:124–30. doi: 10.1002/wps.20806

Conflict of Interest: The authors declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2021 Zielasek, Vrinssen and Gouzoulis-Mayfrank. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.

Thieme

Digitale Verfahren zur Behandlung psychischer Störungen in der COVID-19-Pandemie

Digital Options for Treating Mental Disorders during the COVID-19 Pandemic

Autoren
Johannes Stricker[1], Rabea Lukies[2]

Institute
1 Universität Trier
2 LVR-Institut für Versorgungsforschung

Schlüsselwörter
COVID-19, E-Mental-Health, Behandlung

Key words
COVID-19, e-mental health, treatment

eingereicht 26.12.2020
akzeptiert 14.04.2021

Bibliografie
Fortschr Neurol Psychiatr
DOI 10.1055/a-1486-7019
ISSN 0720-4299
© 2021. Thieme. All rights reserved.
Georg Thieme Verlag KG, Rüdigerstraße 14,
70469 Stuttgart, Germany

Korrespondenzadresse
Dr. Johannes Stricker
Universität Trier
Universitätsring 15
54296 Trier
Germany
Tel.: +06512012926
Fax: +06512013848
E-Mail: stricker@uni-trier.de

ZUSAMMENFASSUNG

Die COVID-19-Pandemie und ihre Folgen (z. B. Kontaktbeschränkungen) stellen die psychiatrisch-psychotherapeutische Versorgung national und international vor neue Herausforderungen. Dieser Beitrag gibt einen Überblick über digitale Verfahren zur Behandlung psychischer Störungen unter Pandemiebedingungen und zur Reduktion pandemiebedingter psychischer Belastung (z. B. aufgrund sozialer Isolation). Diskutiert werden außerdem aktuelle Herausforderungen und Grenzen beim Einsatz digitaler Behandlungsformen sowie Perspektiven für deren langfristigen Einsatz in der psychiatrisch-psychotherapeutischen Versorgung.

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic and its consequences, such as contact restrictions, pose new challenges to psychiatric-psychotherapeutic care in many parts of the world. This article provides an overview of digital methods for treating mental disorders under pandemic conditions and for reducing pandemic-related psychological distress (e.g., due to social isolation). Current challenges and limitations in the use of digital treatment options and their long-term perspectives in psychiatric-psychotherapeutic care are discussed.

Einleitung

Seit März 2020 verursacht die COVID-19-Pandemie weltweit erhebliche Veränderungen der gewohnten Lebens- und Arbeitsweisen. Um eine schnelle Ausbreitung des COVID-19-Virus in Deutschland zu verhindern, einigten sich Bund und Länder am 22. März 2020 auf notwendige und umgreifende Kontaktbeschränkungen. Nach zwischenzeitlichen Lockerungen wurden diese Beschränkungen im November 2020 erneut verschärft. Weltweit kam es durch die COVID-19-Pandemie sowohl zu einem Anstieg psychischer Störungen ([1], s. zudem Meyer-Lindenberg et al. in diesem Heft) als auch zu Schwierigkeiten bei der Durchführung von Face-to-Face-Behandlung in der psychiatrisch-psychotherapeutischen Versorgung (z. B. aufgrund von Infektionsängsten). So berichteten 48 % der Befragten mit einer depressiven Erkrankung in einer Umfrage der Stiftung Deutsche Depressionshilfe, dass es während des „Lockdowns“ im Frühjahr 2020 zu Ausfällen bei ambulanten fachärztlichen oder psychotherapeutischen Behandlungsterminen gekommen sei [2]. Zudem berichteten 9 % der befragten Personen mit einer depressiven Störung, dass aufgrund der COVID-19-Pandemie

eine geplante stationäre Behandlung nicht habe stattfinden können [2].

Eine aktuelle Übersichtsarbeit zeigt, dass Depressions-, Angst- und PTBS-Symptome in der Allgemeinbevölkerung während der COVID-19-Pandemie erhöht sind, wobei die Intensität und Dauer dieser Symptome häufig die Kriterien einer psychischen Störung erfüllen [1]. Risikofaktoren für eine erhöhte psychische Belastung in der COVID-19-Pandemie sind u.a. ein geringeres Lebensalter (≤ 40 Jahre), Arbeitslosigkeit, weibliches Geschlecht und chronische Erkrankungen [1]. Auch bei zahlreichen Personen mit vorbestehenden psychischen Störungen scheinen in der COVID-19-Pandemie soziale Isolation, Ängste und wirtschaftliche Unsicherheit zu einer Exazerbation der psychischen Symptomatik beigetragen zu haben [3]. Der erhöhte Bedarf und die Schwierigkeiten bei der Durchführung von Face-to-Face-Behandlungen haben in der COVID-19-Pandemie weltweit zu einer deutlich verstärkten Nutzung digitaler Verfahren in der Behandlung psychischer Störungen geführt (z. B. [4]). In Deutschland wird der Einsatz therapeutischer digitaler Verfahren sowohl durch die Kostenträger mit Änderungen der regulatorischen Rahmenbedingungen [5] als auch durch die relevanten Fachverbände mit Behandlungsempfehlungen [6] unterstützt.

Der vorliegende Artikel beinhaltet eine Übersicht über den Einsatz digitaler Verfahren zur Behandlung psychischer Störungen und pandemiebedingter psychischer Belastung. Diskutiert werden außerdem Fragen der differentiellen Indikation bezüglich digitaler Behandlungsformen sowie Herausforderungen bei deren Einsatz. Abschließend erfolgt ein Ausblick auf die langfristige Perspektive digitaler Verfahren in der psychiatrisch-psychotherapeutischen Versorgung. Das Literaturscreening für diesen Artikel war explorativ und erfolgte im November und Dezember 2020 in den Datenbanken PubMed (MEDLINE), PsycInfo und Scopus.

Digitale Behandlungsformen während der COVID-19-Pandemie: Ein Überblick

Die Einsatzmöglichkeiten von digitalen Behandlungsformen in der psychotherapeutisch-psychiatrischen Versorgung sind vielfältig und werden häufig unter dem Begriff E-Mental-Health zusammengefasst. Digitale Verfahren können über den gesamten Behandlungsverlauf von der Prävention über Diagnostik sowie Intervention und Rückfallprophylaxe eingesetzt werden [7]. Technisch sind verschiedene Lösungen möglich, z. B. der Einsatz von E-Mails, Instant Messages, Video, Smartphone Apps, Virtual Reality oder psychoedukativen Computerspielen [7]. Bezüglich der eingesetzten Verfahren kann differenziert werden zwischen solchen, die Face-to-Face-Behandlungen mit virtuellen Mitteln kombinieren (*Blended Therapy*), Verfahren, in denen der Behandler/-innenkontakt ausschließlich über digitale Medien (z. B. Textnachrichten oder Video) stattfindet, und Verfahren, die unabhängig von Behandler/-innen eingesetzt werden (z. B. Apps; *Standalone Approach*) [7].

In Deutschland ist davon auszugehen, dass das in der COVID-19-Pandemie am stärksten verwendete digitale Verfahren zur Behandlung psychischer Störungen Videositzungen mit Hilfe zertifizierter Videodienstanbieter sind. Die von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) und dem GKV-Spitzenverband beschlossenen Sonderregelungen haben die Durchführung von Psychotherapie, psychotherapeutischen Sprechstunden und probatorischen Sitzungen als Videobehandlung ermöglicht. Zudem ist die Beschränkung der Videositzungen auf maximal 20% der Patient/-innen vorübergehend ausgesetzt [5].

In einer Studie der Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK; *N* = 3434 Psychotherapeut/-innen) im Zeitraum von Juni bis August 2020 berichteten 87,9 % der befragten Psychotherapeut/-innen, Videobehandlungen durchgeführt zu haben. Gleichzeitig gaben 91,4 % derjenigen, die eine Videobehandlung genutzt haben, an, diese während der COVD-19-Pandemie erstmals eingesetzt zu haben [8]. Dieses Muster wird von einer weiteren Studie gestützt, in der *N* = 130 deutsche Psychotherapeut/-innen berichteten, von Mitte bis Ende Mai 2020 im Vergleich zum Zeitraum vor der COVID-19-Pandemie wöchentlich durchschnittlich 18 % weniger Patient/-innen in Face-to-Face-Sitzungen, hingegen 6558% mehr Patient/-innen (in absoluten Zahlen: 5,26 Patient/-innen wöchentlich, verglichen mit zuvor 0,08 Patient/-innen wöchentlich) mit diversen psychischen Störungen über das Internet behandelt zu haben [9]. Unterstützt wird der Einsatz von Videotherapie z. B. durch entsprechende fachliche Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Psychologie [10] und der American Psychological Association [11].

In Deutschland gab es neben den geänderten Rahmenbedingungen für videobasierte Behandlungsformen (s.o.) eine weitere wichtige Entwicklung im Hinblick auf den Einsatz digitaler Verfahren in der psychiatrisch-psychotherapeutischen Versorgung. Seit Oktober 2020 können niedergelassene Ärzt/-innen und psychologische Psychotherapeut/-innen digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) verordnen. Bisher sind u.a. Apps in den Bereichen Angststörungen und nichtorganische Insomnie verordnungsfähig [12]. Noch liegen keine Zahlen darüber vor, in welchem Umfang diese Apps eingesetzt werden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass diese digitalen Angebote auf breites Interesse stoßen.

Ein weiteres Einsatzfeld digitaler Verfahren in Deutschland sind kostenlose Online-Angebote für Personen in der Allgemeinbevölkerung, die durch die COVID-19-Pandemie eine psychische Belastung wahrnehmen. Entsprechende Angebote beinhalten Trainings zum Umgang mit psychischen Symptomen und belastenden Situationen, psychoedukative Inhalte und Hinweise auf Behandlungsangebote (für eine Übersicht s. [6]). Hervorzuheben sind auch Angebote zur Stärkung der Informationskompetenz (*Health Information Literacy*), die psychischer Belastung durch Fehlinformationen bezüglich COVID-19 vorbeugen sollen (z. B. [13]).

Auch international haben die Kontaktbeschränkungen im Rahmen der COVID-19-Pandemie zu einer verstärkten Nutzung digitaler Verfahren zur Behandlung von psychischen Störungen und der Anpassung entsprechender Regularien geführt (z. B. [9]). Ein Bericht aus den USA schildert die Implementierung digitaler Verfahren in einem psychiatrischen Lehrkrankenhaus [14]. Der Face-to-Face-Kontakt mit Patient/-innen sowie zwischen Behandler/-innen konnte dort durch den Einsatz digitaler Kommunikation deutlich reduziert und auf Situationen begrenzt werden, die direkten Kontakt zwingend erforderlich machen (z. B. bei körperlichen Untersuchungen). Bemerkenswert sind auch der

systematische Einsatz von Social-Media-Kanälen zur Verbreitung von Hinweisen zum Umgang mit psychischem Stress durch Psychiater/-innen und Psycholog/-innen in China [15] und die Entwicklung einer Selbstmanagement-App zur Unterstützung der psychischen Gesundheit während der Pandemie für die Allgemeinbevölkerung in den USA [16].

Herausforderungen und differentielle Indikation beim Einsatz digitaler Behandlungsformen

Das Spektrum psychischer Störungsbilder, zu deren Behandlung digitale Verfahren eingesetzt werden können, ist groß. Bezüglich der Wirksamkeit videobasierter Therapie liegt für Depressionen und Angststörungen, posttraumatische Belastungsstörungen, Essstörungen und Suchterkrankungen Evidenz vor [17]. Ein entscheidender Vorteil des Einsatzes von Videotherapie in der COVID-19-Pandemie ist, dass durch deren Nutzung insbesondere auch Menschen mit einem geschwächten Immunsystem bzw. Vorerkrankungen eine Möglichkeit erhalten, weiterhin Therapie in Anspruch zu nehmen bzw. durchzuführen können [18]. Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit, während einer Videotherapie – im Gegensatz zu einer alternativen Face-to-Face-Therapie mit Mund-Nase-Bedeckung – weiterhin Mimik zu beobachten und beurteilen zu können [19]. Zudem reduzieren sich logistische Anforderungen für Patient/-innen und Behandler/-innen im Vergleich zu Face-to-Face-Behandlungen unter den notwendigen strengen Hygienebedingungen [18].

Bezüglich möglicher Herausforderungen beim Einsatz von Videotherapie musste festgestellt werden, dass einige spezifische Patient/-innengruppen durch Videotherapie nur beschränkt erreichbar sind. Insbesondere die Erreichbarkeit von Kindern unter 6 Jahren, von Geflüchteten, von älteren Menschen und von Menschen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, scheint erschwert [8]. Auch Therapieformen, die spezielle Instrumente und Materialien einsetzen (z. B. EMDR), werden als schwierig in der digitalen Umsetzung wahrgenommen [20]. Die BPtK-Studie zur psychotherapeutischen Videobehandlung [8] konnte weitere erschwerende Rahmenbedingungen identifizieren. Besonders häufig wurden eine instabile Internetverbindung und daraus resultierende Tonaussetzer und Sitzungsabbrüche benannt, die den psychotherapeutischen Prozess behindern können. Internetprobleme, die zu Latenzen in der Videoübertragung führen, sind besonders deshalb problematisch, weil sie die Wechselseitigkeit und Kontingenz sozialer Interaktion stören, welche wiederum für deren belohnende Wirkung zentral sind [21]. Weitere Einschränkungen bei Videotherapie ergaben sich aus der mangelnden Bereitschaft zur Videotherapie seitens der Patient/-innen, durch eine technische Überforderung der Patient/-innen und das Fehlen eines entsprechenden Endgerätes oder Rückzugraums im Wohnraum der Patient/-innen [8]. Ähnliche Befunde finden sich auch in Studien aus anderen europäischen Ländern (z. B. [20]). Fraglich ist zudem, wie Behandlungssettings, die die Interaktionen mehrerer Beteiligter erfordern (z. B. Gruppenpsychotherapie, systemische Psychotherapie), digital umgesetzt werden können. Während der Aufbau einer therapeutischen Beziehung im Einzelsetting auch via Video gelingen kann [22], ist die Studienlage bezüglich der Wirksamkeit von videobasierten Gruppentherapien noch heterogen [17]. Des Weiteren gibt es Hinweise darauf, dass sich bei videobasierter Psychotherapie eine schnellere Ermüdung als bei Face-to-Face-Kontakt bei Patient/-innen und Behandler/-innen einstellen kann [20].

Bezüglich der differentiellen Indikation für videobasierte Therapie liegt die meiste Evidenz bisher für kognitive Verhaltenstherapie vor [17]. Einige wenige positive Befunde liegen außerdem z. B. für Biofeedback, Hypnose, EMDR und Problemlösetraining mittels Videokonferenz vor [17]. Sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern scheinen Videotherapien wirksam zu sein, jedoch besteht weiterer Forschungsbedarf bezüglich der Wirksamkeit bei älteren Menschen sowie hinsichtlich kultureller Einflüsse [17].

Grundsätzlich ist auch denkbar, dass sich die Durchführung von Videotherapie bei Störungen, die z. B. durch eine stark reduzierte Aufmerksamkeit und Konzentration oder herausfordernde Interaktionsmuster gekennzeichnet sind, schwierig gestaltet. So ist es beispielsweise unklar, inwieweit Menschen mit schweren psychischen Störungen, wie Bipolarer Störung oder Psychosen, von digitalen Behandlungsformen profitieren [23]. Für die Implementierung digitaler Behandlung in dieser Patient/-innengruppe scheinen u. a. eine geringe Komplexität und eine individuelle Anpassung der angebotenen Interventionen zentral [24]. Eine weitere Einschränkung videobasierter Therapie besteht darin, dass einige Symptome (z. B. psychomotorische Unruhe) in videobasierter Psychotherapie schwerer zu eruieren sein könnten als im Face-to-Face-Kontakt. Dementsprechend ist durch die Behandelnden für jeden Einzelfall eine Einschätzung notwendig, ob videobasierte Psychotherapie und Diagnostik möglich sind. Es scheint zudem sinnvoll, dass Patient/-innen mit akuter Selbst- oder Fremdgefährdung eine unmittelbare stationäre Behandlung auch unter Pandemiebedingungen ermöglicht wird.

Bezüglich internetbasierter Interventionen im Rahmen von Blended-Care-Programmen zeigt die Studienlage eine Wirksamkeit der Anwendungen bei Angststörungen, Depressionen, Tinnitus, Körperunzufriedenheit und sexueller Dysfunktion [25]. Für Stand-Alone-Lösungen (Apps) kommt eine aktuelle Meta-Analyse zu dem Schluss, dass auf Grundlage der aktuellen Evidenzlage der Einsatz von Apps ohne begleitende psychiatrisch-psychotherapeutische Behandlung der Patient/-innen für keine psychische Störung empfohlen werden kann [26]. Was bedeutet das für den Einsatz von Apps zur Behandlung psychischer Störungen in der COVID-19-Pandemie? Bereits im Jahr 2018 nutzten 81 % der Deutschen ab 14 Jahren ein Smartphone [27]. Vor dem Hintergrund der eingeschränkten Face-to-Face-Kontakte unter Pandemiebedingungen können deshalb gründlich evaluierte digitale Selbsthilfeprogramme ein hilfreicher Baustein psychotherapeutisch-psychiatrischer Behandlung sein. Es scheint sinnvoll, dass die Indikation für deren Einsatz durch qualifizierte Behandler/-innen gestellt wird. Motivationale Schwierigkeiten bei Apps, die heterogene Studienlage und hohe Dropout-Raten in bisherigen Studien in Bezug auf Apps [28] weisen zudem darauf hin, dass diese Anwendungen Behandler/-innenkontakt im besten Fall ergänzen und in keinem Fall ersetzen können. Auch in der COVID-19-Pandemie erscheint es deshalb wichtig, dass regelmäßige Behandler/-innenkontakte weiterhin stattfinden, begleitend zum Einsatz von Apps. Bezüglich der

zahlreichen Online-Angebote zur Reduzierung psychischer Belastung durch die COVID-19-Pandemie in der Allgemeinbevölkerung werden begleitende Evaluationsstudien zeitnah Hinweise auf effektive Interventionselemente generieren.

Langfristige Perspektiven digitaler Behandlungsformen

Digitale Behandlungsformen werden in der psychiatrisch-psychotherapeutischen Versorgung in den nächsten Jahren, auch über die COVID-19-Pandemie hinaus, einen zunehmenden Bedeutungsgewinn erfahren. Eine Grundvoraussetzung für den erfolgreichen Einsatz digitaler Verfahren ist die geeignete Qualifizierung und Ausstattung der Behandler/-innen. Dementsprechend sollte der Themenkomplex der digitalen Behandlung prominent in der Medizinerausbildung, der Facharztweiterbildung und Fortbildung sowie der kürzlich reformierten Psychotherapeutenausbildung platziert werden. In diesem Kontext könnten auch innovative digitale Verfahren in Ausbildung und Supervision weiterentwickelt werden, die vielerorts pandemiebedingt erstmals zum Einsatz gekommen sind.

Besonders wichtig ist bei der Implementierung digitaler Verfahren auch die Perspektive der Patient/-innen. Insbesondere sozial benachteiligte Gruppen zeichnen sich häufig durch ein reduziertes Nutzungsverhalten im Hinblick auf digitale Angebote aus [4], was auf unterdurchschnittliche digitale Kompetenzen, aber auch fehlende Ausstattung oder fehlende Rückzugsmöglichkeiten (z. B. für Videositzungen) zurückzuführen sein könnte. Programme, in denen qualifiziertes Personal den Umgang mit – und die Einrichtung von – entsprechender Soft- und Hardware unterstützt [29], könnten einen Beitrag zur Reduzierung dieser Disparitäten leisten. Hierzu könnte auch eine mehrsprachige Gestaltung digitaler Angebote beitragen. Da Menschen aller Altersklassen zunehmend soziale Netzwerke nutzen, um sich zu psychischer Gesundheit auszutauschen und Informationen einzuholen [30], könnten zudem entsprechende digitale Angebote ausgebaut werden, um niedrigschwellige digitale Anlaufstellen für Betroffene zu schaffen und Stigmatisierung zu reduzieren (s. auch [31]).

Die Digitalisierung psychiatrisch-psychotherapeutischer Behandlung kann sich nicht nur auf den Transfer analoger Angebote auf den Bildschirm beschränken, sondern wird auch neue Behandlungsformen hervorbringen, die entsprechend abzubilden sind. Denkbar wäre es, kürzere und häufigere Therapiesitzungen zu ermöglichen (aufgrund schnellerer Ermüdung bei Videoeinsatz [19, 20]) oder die Begleitung von Patient/-innen bei der Nutzung digitaler Gesundheitsanwendungen zu fördern. Auch für die Gruppenpsychotherapie sind innovative Formate denkbar, bei denen regelmäßige Gruppensitzungen in Präsenz stattfinden und die Teilnehmer/-innen sich in der Zwischenzeit, moderiert durch die Behandler/-innen, digital zu erreichten Fortschritten austauschen. Auf struktureller Ebene ist die Vergütungsstruktur an die neuen Anforderungen digitaler Behandlungen anzupassen.

Ein wichtiger Schritt im Hinblick auf eine verbesserte Kommunikation zwischen unterschiedlichen Behandler/-innen ist darüber hinaus die Einführung der digitalen Patientenakte, die ab Januar 2021 erfolgt. Mit Einverständnis des/der Patient/-in könnten zukünftig auf diesem Wege auch ausführlichere psychometrische Befunde und Verläufe zwischen Behandler/-innen kommuniziert werden, die insbesondere an der Schnittstelle zwischen ambulanter und stationärer Versorgung häufig verloren gehen und so die Initiierung einer adäquaten Behandlung verzögern können. Entscheidend sind hierbei die Wahrung datenschutzrechtlicher Interessen und der Selbstbestimmung der Patient/-innen über deren Gesundheitsinformationen.

Bezüglich des Einsatzes von Apps als digitale Gesundheitsanwendungen in der psychiatrisch-psychotherapeutischen Versorgung scheint es weiteren Forschungsbedarf zu geben. Grundsätzlich sind in allen Bereichen digitaler Gesundheit mehr Studien unter realen Versorgungsbedingungen notwendig [32]. Im Sinne des Empowerments der Betroffenen und zur Unterstützung von Behandlungsentscheidungen wäre es zudem wünschenswert, die empirische Evidenzlage für angebotene digitale Gesundheitsanwendungen transparent und zielgruppengerecht aufzubereiten. Ein solches Angebot ist für einige deutschsprachige E-Mental-Health-Apps bereits verfügbar [33]. Vor dem Hintergrund eines möglichen Vertrauensverlustes in das psychiatrisch-psychotherapeutische Versorgungssystem bei Hinweisen auf Datenunsicherheit (s. bspw. die kürzlich geschehene Cyber-Erpressung eines finnischen Psychotherapieunternehmens mittels gestohlener Patientendaten [34]) ist zudem die Gewährleistung einer sicheren Infrastruktur für sämtliche digitalen Behandlungsverfahren erforderlich.

Auf Grundlage einer sicheren digitalen Infrastruktur sind perspektivisch zahlreiche weitere Einsatzmöglichkeiten digitaler Verfahren in der psychiatrisch-psychotherapeutischen Versorgung denkbar (z. B. stärkere Verwendung von *Virtual Reality* oder *Wearable Devices, Ecological Momentary Assessments* und *Mobile Monitoring* [35] zur Krisenerkennung und Initiierung vorab besprochener Krisenpläne [36]). Aus Forschungsperspektive können digitale Verfahren zur Erfassung von Verhaltensdaten auch neue Einblicke in die Nosologie psychischer Störungen ermöglichen (*digital phenotyping* [37] oder *interaction-based phenotyping* [38], basierend auf Videodaten).

Fazit

Die COVID-19-Pandemie hat zu einer stärkeren Nutzung digitaler Verfahren zur Behandlung psychischer Störungen geführt. Gleichzeitig hat die Akzeptanz dieser Verfahren durch Behandelnde und Patient/-innen im vergangenen Jahr deutlich zugenommen. Die positiven Erfahrungen in der Verwendung digitaler Verfahren und die Studienlage deuten darauf hin, dass die Face-to-Face-Behandlung von psychischen Störungen auch langfristig sinnvoll digital ergänzt werden kann. Hierfür sind entsprechende Aus- und Weiterbildung sowie passende regulatorische Rahmenbedingungen und kontinuierliche Qualitätssicherung besonders wichtig. Außerdem bedarf es weiterer Forschung bezüglich zielgruppengerechter Anwendungen und weiterer innovativer digitaler Behandlungsformaten.

Danksagung

Wir danken Prof. Dr. med. Jürgen Zielasek, wissenschaftlicher Koordinator am LVR-Institut für Versorgungsforschung, für die kritische Durchsicht des Manuskripts und hilfreiche Anmerkungen.

Interessenkonflikt

Die Autorinnen/Autoren geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

Literatur

[1] Xiong J, Lipsitz O, Nasri F et al. Impact of COVID-19 pandemic on mental health in the general population: a systematic review. J Affect Disord 2020; 277: 55–64. doi:10.1016/j.jad.2020.08.001

[2] Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Deutschland-Barometer Depression: Massive Folgen für die psychische Gesundheit infolge der Corona-Maßnahmen (November 2020). Im Internet: https://www.deutsche-depressionshilfe.de/forschungszentrum/deutschland-barometer/2020 ; Stand: 11.11.2020

[3] Frank A, Hörmann S, Krombach J et al. Psychisch krank in Krisenzeiten: Subjektive Belastungen durch COVID-19. Psychiatr Prax 2020; 47: 267–272. doi:10.1055/a-1179-4230

[4] Torous J, Myrick KJ, Rauseo-Ricupero N et al. Digital mental health and COVID-19: using technology today to accelerate the curve on access and quality tomorrow. JMIR Mental Health 2020; 7: e18848. doi:10.2196/18848

[5] Spitzenverband GKV. Fokus: Sonderregelungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus (2020). Im Internet: https://www.gkv-spitzenverband.de/gkv_spitzenverband/presse/fokus/fokus_corona.jsp ; Stand: 9. 12.2020

[6] Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN). Coronavirus: Empfehlungen zu E-Mental-Health (2020). Im Internet: https://dgppn.de/schwerpunkte/e-mental-health/corona.html?fbclid=IwAR0VYaRzuQElimzYFx4dtLbTPWqCJYzruUPN2ls6hw36NQluClTaklNuZZU ; Stand: 9.12.2020

[7] Ebert DD, Van Daele T, Nordgreen T et al. Internet and mobile-based psychological interventions: applications, efficacy and potential for improving mental health. A report of the EFPA E-Health Taskforce. Eur Psychol 2018; 23: 167–187. doi:10.1027/1016-9040/a000318

[8] Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK). Videobehandlungen – Eine Umfrage zu den Erfahrungen von Psychotherapeut*innen (November 2020). Im Internet: https://www.bptk.de/wp-content/uploads/2020/11/20201105_BPtK-Studie_Videobehandlung.pdf ; Stand: 18.11.2020

[9] Humer E, Pieh C, Kuska M et al. Provision of psychotherapy during the COVID-19 pandemic among Czech, German and Slovak Psychotherapists. Int J Environ Res Public Health 2020; 17: 4811. doi:10.3390/ijerph17134811

[10] Deutsche Gesellschaft für Psychologie (DGPs). Empfehlungen zur Durchführung Videokonferenzbasierter Psychotherapie (2020). Im Internet: https://psychologische-coronahilfe.de/beitrag/empfehlungen-fuer-videobasierte-psychotherapie/#top ; Stand: 9.12.2020

[11] American Psychological Association (APA). Guidelines for the practice of telepsychology (2013). Im Internet: https://www.apa.org/practice/guidelines/telepsychology ; Stand: 9.12.2020

[12] Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM). DiGA-Verzeichnis (2020). Im Internet: https://diga.bfarm.de/de/verzeichnis ; Stand: 9. 12.2020

[13] Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). Psychische Gesundheit in der „Corona-Zeit“ (Juli 2020). Im Internet: https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/psychische-gesundheit.html#c12553 ; Stand: 23.12.2020

[14] Kalin ML, Garlow SJ, Thertus K et al. Rapid implementation of telehealth in hospital psychiatry in response to COVID-19. Am J Psychiatry 2020; 177: 636–637. doi:10.1176/appi.ajp.2020.20040372

[15] Bao Y, Sun Y, Meng S et al. 2019-nCoV epidemic: Address mental health care to empower society. Lancet 2020; 395: e37–e38. doi:10.1016/S0140-6736(20)30309-3

[16] Drissi N, Ouhbi S, Marques G et al. A systematic literature review on e-mental health solutions to assist health care workers during COVID-19. Telemed e-Health 2020. doi:10.1089/tmj.2020.0287.

[17] Backhaus A, Agha Z, Maglione ML et al. Videoconferencing psychotherapy: a systematic review. Psychol Serv 2012; 9: 111–131. doi:10.1037/a0027924

[18] Chen JA, Chung WJ, Young SK et al. COVID-19 and telepsychiatry: early outpatient experiences and implications for the future. Gen Hosp Psychiatry 2020; 66: 89–95. doi:10.1016/j.genhosppsych.2020.07.002

[19] Sasangohar F, Bradshaw MR, Carlson MM et al. Adapting an outpatient psychiatric clinic to telehealth during the COVID-19 pandemic: a practice perspective. J Med Internet Res 2020; 22: e22523. doi:10.2196/22523

[20] McBeath AG, Du Plock S, Bager-Charleson S. The challenges and experiences of psychotherapists working remotely during the coronavirus* pandemic. Counselling Psychotherapy Res 2020; 20: 394–405. doi:10.1002/capr.12326

[21] Schilbach L, Wilms M, Eickhoff SB et al. Minds made for sharing: initiating joint attention recruits reward-related neurocircuitry. J Cogn Neurosci 2010; 22: 2702–2715. doi:10.1162/jocn.2009.21401

[22] Simpson SG, Reid CL. Therapeutic alliance in videoconferencing psychotherapy: a review. Aust J Rural Health 2014; 22: 280–299. doi:10.1111/ajr.12149

[23] Naslund JA, Marsch LA, McHugo GJ et al. Emerging mHealth and eHealth interventions for serious mental illness: a review of the literature. J Mental Health 2015; 24: 321–332. doi:10.3109/09638237.2015.1019054

[24] Aref-Adib G, McCloud T, Ross J et al. Factors affecting implementation of digital health interventions for people with psychosis or bipolar disorder, and their family and friends: a systematic review. Lancet Psychiatry 2019; 6: 257–266. doi:10.1016/S2215-0366(18)30302-X

[25] Carlbring P, Andersson G, Cuijpers P et al. Internet-based vs. face-to-face cognitive behavior therapy for psychiatric and somatic disorders: an updated systematic review and meta-analysis. Cogn Behav Ther 2018; 47: 1–18. doi:10.1080/16506073.2017.1401115

[26] Weisel KK, Fuhrmann LM, Berking M et al. Standalone smartphone apps for mental health — a systematic review and meta-analysis. NPJ Digital Med 2019; 2: 1–10. doi:10.1038/s41746-019-0188-8

[27] Ametsreiter H. Smartphone-Markt: Konjunktur und Trends (Februar 2019). Im Internet: https://www.bitkom.org/sites/default/files/2019-02/Bitkom-Pressekonferenz%20Smartphone-Markt%2020%2002%202019%20Pr%C3%A4sentation_final.pdf ; Stand: 30.11.2020

[28] Torous J, Lipschitz J, Ng M et al. Dropout rates in clinical trials of smartphone apps for depressive symptoms: a systematic review and meta-analysis. J Affect Disord 2020; 263: 413–419. doi:10.1016/j.jad.2019.11.167

[29] Banbury A, Parkinson L, Gordon S et al. Implementing a peer-support programme by group videoconferencing for isolated carers of people with dementia. J Telemed Telecare 2019; 25: 572–577. doi:10.1177/1357633X19873793

[30] Naslund JA, Aschbrenner KA, McHugo GJ et al. Exploring opportunities to support mental health care using social media: a survey of social media users with mental illness. Early Interv Psychiatry 2017; 13: 405–413. doi:10.1111/eip.12496

[31] Kaufman KR, Petkova E, Bhui KS et al. A global needs assessment in times of a global crisis: world psychiatry response to the COVID-19 pandemic. BJPsych Open 2020; 6: e48. doi:10.1192/bjo.2020.25

[32] Van Winkle B, Carpenter N, Moscucci M. Why aren't our digital solutions working for everyone? AMA J Ethics 2017; 19: 1116–1124. doi:10.1001/journalofethics.2017.19.11.stas2-1711

[33] Weiße Liste. Trusted Health Apps – Psyche und Depression (2020). Im Internet: https://www.trustedhealthapps.org/apps/kategorie/22/Psyche%20und%20Depression?sortBy=NAME&sortOrder=ASC ; Stand: 9. 12.2020

[34] Süddeutsche Zeitung. Cyber-Erpresser in Finnland: Willkommen in der Dystopie (Oktober 2020). Im Internet: https://www.sueddeutsche.de/digital/vastaamo-erpresser-cyberkriminalitaet-1.5097181; Stand: 9.12.2020

[35] Torous J, Keshavan M. A new window into psychosis: the rise digital phenotyping, smartphone assessment, and mobile monitoring. Schizophr Res 2018; 197: 67–68. doi:10.1016/j.schres.2018.01.005

[36] Thompson WK, Gershon A, O'Hara R et al. The prediction of study-emergent suicidal ideation in bipolar disorder: a pilot study using ecological momentary assessment data. Bipolar Disord 2014; 16: 669–677. doi:10.1111/bdi.12218

[37] Torous J, Onnela JP, Keshavan M. New dimensions and new tools to realize the potential of RDoC: digital phenotyping via smartphones and connected devices. Transl Psychiatry 2017; 7: e1053–e1053. doi:10.1038/tp.2017.25

[38] Schilbach L. Using interaction-based phenotyping to assess the behavioral and neural mechanisms of transdiagnostic social impairments in psychiatry. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2019; 269: 273–274. doi:10.1007/s00406-019-00998-y

 | © 2021. Thieme. All rights reserved.

Thieme

Ehegattenvertretung bei Selbstbestimmungsunfähigkeit eines Partners – Kontra

Spousal Representation in German Guardianship Law – Contra

Kontra

Im Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts ist eine gegenseitige Vertretung der Ehegatten bzw. Lebenspartner in Angelegenheiten der Gesundheitssorge für den Fall vorgesehen, dass einer der Beiden im Rahmen einer akuten Erkrankung seine Rechte nicht selbst wahrnehmen kann. Dafür soll es weder einer Vorsorgevollmacht noch der Einrichtung einer Betreuung bedürfen. Die Ehegattenvertretung soll für bis zu drei Monate möglich sein und der Vertretende soll auch freiheitseinschränkende Maßnahmen für einen Zeitraum von bis zu sechs Wochen genehmigen dürfen. Diese Form der Ehegattenvertretung ist – zumal für derart lange Zeiträume – weder sinnvoll noch erforderlich.

Allgemeine Aspekte

Eine „automatische", gegenseitige Vertretungsbefugnis der Ehegatten beispielsweise für die Einwilligung zu einer Notoperation nach einem schwerwiegenden Unfallereignis oder einer Aneurysmablutung mag auf den ersten Blick sinnvoll erscheinen, wenn der/die Betroffene nicht in der Lage ist, einen Willen zu äußern oder gar bewusstlos ist. Für diese Notfallsituationen gilt aber ohnehin der mutmaßliche Wille des/der Betroffenen, sodass unaufschiebbare Notfallbehandlungen auch ohne Einwilligung eines Vertreters möglich sind.

Für andere Konstellationen mit aufschiebbaren Behandlungsentscheidungen liegen die etablierten und angemessenen Instrumente der Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht vor. Wenn eine Vorsorgevollmacht vorliegt, kann man davon ausgehen, dass der Vollmachtgeber sich mit der Thematik auseinandergesetzt hat und eine reflektierte Entscheidung getroffen hat, wer ihn im Ernstfall vertreten soll; dies kann der Ehegatte/Lebenspartner sein, oder aber die erwachsenen Kinder oder auch eine andere Vertrauensperson. Dabei vertraut der Vollmachtgeber nicht nur darauf, dass die vertretende Person ihn gut kennt und grundsätzlich zu seinem Besten entscheiden wird, sondern auch, dass die Person dieser Aufgabe mental und emotional gewachsen ist.

Das vorgesehene Ehegattenvertretungsrecht impliziert, dass der Ehegatte/Partner grundsätzlich im Sinne und nach dem mutmaßlichen Willen des Betroffenen handelt. Menschliche Beziehungen sind aber komplex und davon sind Ehen nicht ausgenommen. Es gibt Situationen, wo eine eheliche Beziehung unharmonisch oder gar zerrüttet ist und die Interessen der Ehegatten voneinander abweichen. Darüber hinaus können Ehegatten bei schwerwiegenden Entscheidungen emotional überfordert sein – direkt unmittelbar oder erst nachträglich.

Leider machen bislang zu wenig Menschen von der Möglichkeit einer Vorsorgevollmacht Gebrauch. Beide Vorsorgeinstrumente – Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht – müssen zweifelsohne intensiver beworben werden. Der „Kurzschluss" des Ehegattenrechts schwächt die Vorsorgeinstrumente und stellt einen Rückschritt in Sachen Autonomie des Einzelnen und Selbstbestimmung dar. Da, wo ein solches Instrument nicht vorliegt und es keine gesetzliche Betreuung gibt, kann und soll ggf. auch im Eilverfahren eine Betreuung eingerichtet werden. Zu befürchten ist, dass angesichts der vorgesehenen „einfacheren" Möglichkeit der Ehegattenvertretung die zeitnahe Installation einer Betreuung künftig erschwert sein wird.

Schließlich gibt eine gesetzliche Betreuung auch den Behandlern mehr Sicherheit, die ansonsten überfordert sein können durch die im Gesetzentwurf vorgesehene Erfordernis der Berücksichtigung von Faktoren, die die Vertretungsberechtigung ausschließen würden, die aber unter Umständen schwer fassbar oder nicht eindeutig sein können; dazu gehört z. B., dass die Ehegatten getrennt leben oder dass der vertretene Ehegatte die Vertretung durch den vertretenden Ehegatten ablehnt.

Besondere Aspekte bei psychischen Störungen

Besonders problematisch ist die vorgesehene Regelung der Ehegattenvertretung für Menschen mit chronisch-rezidivierenden oder chronisch-progredienten psychischen Störungen wie z. B. Psychosen, bipolaren Störungen oder Demenzen. Diese bringen häufig besondere Konflikte, Abgrenzungsschwierigkeiten und Rollenverschiebungen in der Ehe mit sich. Tiefe Enttäuschungen, Aggressionen und eine Zerrüttung der Ehe oder aber eine chronische emotionale Überforderung und Erschöpfung des gesunden Ehepartners können die Folge sein.

Vor dem Hintergrund einer chronischen Belastungssituation kann die zusätzliche Belastung, die dem Partner bei kritischen Entscheidungssituationen durch sein Vertretungsrecht aufgebürdet wird, zu viel werden. Dem Vertretenden kann es mitunter schwerfallen, die erforderliche emotionale Distanz und Selbstkontrolle aufrechtzuerhalten, um in der kritischen Situation eindeutig und ausschließlich im Sinne des Partners zu entscheiden. Spätere Selbstvorwürfe und/oder Vorwürfe seitens des vertretenen Partners können die Folge sein. Nicht nur für den Vertretenden, auch für das eheliche Verhältnis bzw. die Partnerschaft kann sich das Vertretungsrecht im Nachhinein als eine zu große Belastung erweisen. Schließlich muss hier berücksichtigt werden, dass das Vertretungsrecht praktisch als Vertretungspflicht empfunden und

Heruntergeladen von: LVR-Klinik Köln. Urheberrechtlich geschützt.

auch de facto vermutlich als solche gehandhabt werden wird, obwohl im Gesetzentwurf keine Verpflichtung vorgesehen ist.

Darüber hinaus gibt es nun mal auch die schwer zerrütteten Ehen, die durch Indifferenz oder Aggressionen geprägt sind. Im klinischen Alltag kommt es leider immer wieder vor, dass Angehörige z. B. in finanziellen oder Unterbringungsangelegenheiten eher Eigeninteressen verfolgen; hier könnte konkret ein Missbrauch des Vertretungsrechts befürchtet werden. Auch geht ggf. das „automatisch" vorgesehene Außerkraftsetzen der ärztlichen Schweigepflicht gegenüber dem vertretenden Ehegatten über Schamgefühle und das Schutzbedürfnis des Betroffenen hinweg, wenn Informationen über sein Verhalten beispielsweise in akuten Krankheitsphasen preisgegeben werden und wenn dem vertretenden Ehegatten Einblick in die Patientenakte gewährt werden muss.

Schließlich ist es ausgesprochen kritisch, wenn nach dem § 1358 des Gesetzentwurfs der vertretende Ehegatte die Befugnis erhalten soll, über Zwangsmaßnahmen wie eine mechanische Fixierung zu entscheiden. Entscheidungen in einem derart sensiblen Feld werden also künftig nicht nur bei Menschen erfolgen können, die nicht in der Lage sind, einen Willen zu bilden und zum Ausdruck zu bringen, sondern auch *gegen* den natürlichen Willen des Betroffenen. Dies ist aus Perspektive der Selbstbestimmung inakzeptabel und es ist nicht nachvollziehbar, warum hier ohne Not ein derart gravierender Rückschritt bei der Orientierung an der Patientenautonomie vollzogen werden soll. De facto wird damit das Selbstbestimmungsrecht, wie es in einer selbstgewählten Vorsorgevollmacht ausgeübt wird, über den „Kurzschluss" der Ehegattenvertretung ausgesetzt. Dies steht im Widerspruch zum fachlichen und gesellschaftlichen Konsens, die Hürden für Beschränkungen der Patientenautonomie zu erhöhen, und konterkariert die Entwicklungslinie mit mehreren höchstrichterlichen Entscheidungen der letzten Jahre seit der Ratifizierung der UN-Behindertenkonvention. Unabhängig davon werden derart schwere Eingriffe in die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen eine hohe Belastung für viele Ehepartner bedeuten; sie werden zu erheblichen Problemen führen und die Ehen nachhaltig belasten.

In der Zusammenschau können die Institutionen der Vorsorgevollmacht und der gesetzlichen Betreuung den Schutz der Betroffenen, aber auch den Schutz und Erhalt der Ehe besser gewährleisten als die Ehegattenvertretung.

Interessenkonflikt

Die Autorin ist Mitglied des Vorstandes der BDK und der DGPPN.

Autorinnen/Autoren



Euphrosyne Gouzoulis-Mayfrank

Korrespondenzadresse

Prof. Dr. med. Euphrosyne Gouzoulis-Mayfrank, MHBA
Ärztliche Direktorin LVR-Klinik Köln, Fachliche Direktorin Versorgungsforschung, LVR-Institut für Forschung und Bildung
Wilhelm-Griesinger-Straße 23
51109 Köln
Deutschland
E-Mail: euphrosyne.gouzoulis-mayfrank@lvr.de

Bibliografie

Psychiat Prax 2021; 48: 175–176
DOI 10.1055/a-1363-7353
ISSN 0303-4259
© 2021. Thieme. All rights reserved.
Georg Thieme Verlag KG, Rüdigerstraße 14, 70469 Stuttgart, Germany

Heruntergeladen von: LVR-Klinik Köln. Urheberrechtlich geschützt.

Online publiziert: 24.06.2021

DNVF-Diskussionspapier – Besonderheiten, Herausforderungen und Ziele der Versorgungsforschung im Feld der seelischen Gesundheit

DNVF-Discussion paper – Specificities, Challenges and Aims of Mental Health Service Research in Germany

Autoren

Julian Schwarz[1,*], Sebastian von Peter[1,*], Harald Baumeister[2], Volker Dahling[1], Uta Gühne[3], Euphrosyne Gouzoulis-Mayfrank[4], Martin Härter[5], Markus W. Haun[6], Christian Jacke[7], Isabell Lehmann[4], Anne Neumann[8], Andrea Pfennig[9], Hans-Joachim Salize[10], Stephanie Timm[1], Silke Wiegand-Grefe[11], Steffi G. Riedel-Heller[3,#], Martin Heinze[1,#]

Institute

1 Hochschulklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Medizinische Hochschule Brandenburg Theodor Fontane, Rüdersdorf bei Berlin, Deutschland
2 Klinische Psychologie und Psychotherapie, Institut für Psychologie und Pädagogik, Universität Ulm, Ulm, Deutschland
3 Institut für Sozialmedizin, Arbeitsmedizin und Public Health (ISAP), Universität Leipzig, Medizinische Fakultät, Leipzig, Deutschland
4 LVR-Institut für Versorgungsforschung, Köln, Deutschland
5 Institut und Poliklinik für Medizinische Psychologie, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Hamburg, Deutschland
6 Klinik für Allgemeine Innere Medizin und Psychosomatik, Universitätsklinikum Heidelberg Zentrum für Psychosoziale Medizin, Heidelberg, Deutschland
7 WIP - Wissenschaftliches Institut der PKV, Köln, Deutschland
8 Zentrum für Evidenzbasierte Gesundheitsversorgung, Universitätsklinikum Carl Gustav Carus an der Technischen Universität Dresden, Dresden, Deutschland
9 Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Universitätsklinikum Carl Gustav Carus, Medizinische Fakultät, Technische Universität Dresden, Dresden, Deutschland
10 Klinik Psychiatrie und Psychotherapie, AG Versorgungsforschung, Zentralinstitut fur Seelische Gesundheit, Mannheim, Deutschland
11 Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, -psychotherapie und -psychosomatik, Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf Zentrum für Psychosoziale Medizin, Hamburg, Deutschland

Keywords
health service research, mental health, mental disorders, health promotion, discussion paper, implementation

Schlüsselwörter
Versorgungsforschung, seelische Gesundheit, psychische Störungen, Gesundheitsförderung, Diskussionspapier, Implementierung

online publiziert 2021

Bibliografie
Gesundheitswesen
DOI 10.1055/a-1478-3580
ISSN 0941-3790
© 2021. Thieme. All rights reserved.
Georg Thieme Verlag KG, Rüdigerstraße 14,
70469 Stuttgart, Germany

Korrespondenzadresse
Prof. Dr. med. Sebastian von Peter, MPhil
Hochschulklinik für Psychiatrie und Psychotherapie
Medizinische Hochschule Brandenburg Theodor Fontane
Rüdersdorf bei Berlin
Deutschland
Sebastian.vonPeter@mhb-fontane.de

ZUSAMMENFASSUNG

Versorgungsforschung im Feld der seelischen Gesundheit ist von zunehmender Bedeutung. Angesichts dieser Entwicklung hat die im Oktober 2017 gegründete DNVF Fachgruppe „Seelische Gesundheit“ ein Diskussionspapier verfasst, welches zentrale Besonderheiten, Herausforderungen und Ziele der Versorgungsforschung im Bereich der seelischen Gesundheit zusammenfasst. Im Einzelnen werden forschungsrelevante Besonderheiten des Versorgungsfeldes, pragmatische Probleme bei der Forschungsorganisation, ethische Herausforderungen und für dieses Feld besondere Themenstellungen vorgestellt und diskutiert.

* Geteilte Erstautorschaft
# Geteilte Letztautorschaft

Heruntergeladen von: Universität Potsdam. Urheberrechtlich geschützt.

ABSTRACT

Research in mental health services in Germany is of increasing relevance. To this end, the recently founded "Mental Health Working Group" as part of the German Network of Health Services Research (DNVF) has written a discussion paper presenting key specifics, challenges, and goals of health service research in the field of mental health. Some research-relevant specifics in the area of mental health care, pragmatic challenges of research organization, ethical problems, and particular research topics in this field are presented and discussed critically.

Einleitung

Dieses Diskussionspapier wurde von Mitgliedern der im Jahr 2017 gegründeten Fachgruppe „Seelische Gesundheit" des Deutschen Netzwerkes Versorgungsforschung e.V. (DNVF) erarbeitet. Das DNVF (www.dnvf.de) ist ein seit 2006 bestehendes interdisziplinäres Netzwerk, das allen Institutionen, Arbeitsgruppen und Wissenschaftlern[1] offensteht, die mit der Verbesserung der Gesundheits- und Krankenversorgung unter wissenschaftlichen, praktischen oder gesundheitspolitischen Gesichtspunkten befasst sind. Ziel des DNVF ist es, die Versorgungsforschung im Gesundheitswesen zu vernetzen, Wissenschaft und Versorgungspraxis zusammenzuführen sowie die Versorgungsforschung insgesamt zu fördern.

Das vorliegende Diskussionspapier ist das Ergebnis intensiver Diskussionen und wurde in einer ersten Fassung von einem Kernautorenteam (JS, SvP, MHe, UG, SRH) verfasst. Als Vorlage diente eine Gliederung, die i.R. eines Expertenworkshops im Mai 2019 von der Fachgruppe (FG) entwickelt und konsentiert wurde. Es erfolgte ein Überarbeitungsprozess, in dem das Manuskript von den als Co-Autoren genannten Mitgliedern der FG kommentiert und entsprechend angepasst wurde. Ein formales Konsentierungsverfahren fand nicht statt. Die Mitglieder der FG „Seelische Gesundheit" gehören unterschiedlichen Bereichen der psychosozialen Versorgung und Versorgungsforschung (VF) an. Das Erfordernis für dieses Diskussionspapier ergibt sich einerseits aus den besonderen Bedürfnissen von Menschen mit psychischen Störungen und/oder psychosozialen Problemen, andererseits aus den Besonderheiten des Forschungsfeldes, das eine Reihe an Herausforderungen und Hürden für die VF mit sich bringt.

Hintergrund

Die WHO definiert seelische Gesundheit als einen Zustand vollkommenen „psychischen und sozialen Wohlbefindens und nicht allein das Fehlen von Krankheit und Gebrechen". Auf einer systembezogenen Ebene gibt es eine Reihe von Institutionen, deren Aufgabe es ist, die Aufrechterhaltung und Wiederherstellung dieses Zustandes zu unterstützen. Neben dem psychiatrischen, psychotherapeutischen und psychosomatischen Versorgungssystem für Erwachsene, Kinder und Jugendliche, sowie den Hausärzten leisten verschiedene Leistungserbringer aus den Bereichen Prävention, Gesundheitsförderung sowie Rehabilitation und Teilhabe ihren Beitrag zur seelischen Gesundheit der Bevölkerung [1]. Darüber hinaus gibt es weitere Versorgungsbereiche und Disziplinen, die Schnittmengen mit der somatischen Medizin aufweisen, so z.B. die Geriatrie und Alterspsychiatrie, die Psychoonkologie, Psychodiabetologie oder die Psychokardiologie.

Die VF versteht sich als ein „fachübergreifendes Forschungsgebiet, das ausgehend von der Patienten- und Populationsperspektive und vor dem Hintergrund komplexer Kontextbedingungen die Versorgungsstrukturen und -prozesse der Gesundheitsversorgung untersucht" [2]. VF erfordert darum die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den Akteuren, den Strukturen und den Effekten der gesundheitlichen Versorgung und gleichzeitig disziplinübergreifende Forschungsansätze unter Beteiligung verschiedenster Fachrichtungen [3]. Sie gewinnt aufgrund der wachsenden Komplexität der Gesundheitsversorgung, begrenzter Ressourcen, epidemiologischer und demografischer Entwicklungen und veränderter Erwartungen aller Beteiligten stetig an Relevanz.

Die Aufgaben der VF im Feld der seelischen Gesundheit liegen neben der Analyse der Versorgungsstrukturen und -prozesse in der (Weiter-)Entwicklung bzw. Implementierung wirksamer Versorgungskonzepte für Menschen mit seelischen Krisen und Beeinträchtigungen aller Altersgruppen und deren Evaluation. Dabei spielen Versorgungsbedarfe und patientenrelevante Zielparameter, wie die Lebensqualität, gleichermaßen eine Rolle. Neben der somatischen, psychotherapeutischen und psychosozialen Versorgung Betroffener und ihren Angehörigen richtet sich der Fokus der VF im Feld der seelischen Gesundheit nicht nur auf Behandlung und Versorgung, sondern auch auf die Prävention psychischer Störungen und die Gesundheitsförderung für alle Altersgruppen.

Die VF im Bereich der seelischen Gesundheit hat in Deutschland eine, im Vergleich mit anderen Bereichen, lange Tradition: Mit der Psychiatrie-Enquête (1975) und analog in den neuen Bundesländern mit den Rodewischer Thesen (1964) eingeleiteten Entwicklungen stimulierten Projekte der VF in der Psychiatrie, Psychotherapie und der Psychosomatischen Medizin vergleichsweise früh [4]. Man könnte in diesem Zusammenhang auch von einer „Vorreiterrolle" der VF im Feld der seelischen Gesundheit sprechen.

Im vorliegenden Diskussionspapier werden unterschiedliche Themen zu den folgenden Fragen vorgestellt und kritisch diskutiert:

1. Welche strukturellen Besonderheiten im Versorgungsbereich der seelischen Gesundheit sind für das Feld der VF relevant?
2. Welche besonderen Herausforderungen gibt es in Bezug auf die Forschungsorganisation und -umsetzung im Feld der seelischen Gesundheit?
3. Welche ethischen, gesellschaftlichen und rechtlichen Besonderheiten treffen auf dieses Forschungsfeld zu?
4. Welche spezifischen Themen sind von besonderer Bedeutung für die VF im Bereich der seelischen Gesundheit?

[1] Die in der vorliegenden Arbeit verwendete männliche und genderneutrale Schreibweise schließt sämtliche Geschlechter mit ein.

Heruntergeladen von: Universität Potsdam. Urheberrechtlich geschützt.

Darauf aufbauend werden in den Schlussfolgerungen zentrale Empfehlungen für die künftige VF im Bereich der seelischen Gesundheit abgeleitet.

Strukturelle Besonderheiten des Versorgungsbereiches

Es gibt eine Reihe von strukturellen Besonderheiten im Versorgungsbereich der seelischen Gesundheit, die sich konkret auf die VF auswirken.

Barrieren durch die Fragmentierung der Versorgung

Wenngleich die Fragmentierung des Gesundheitssystems maßgeblich in der Deutschen Sozialgesetzgebung begründet ist und somit sämtliche medizinische Disziplinen betrifft, fällt sie im Feld der seelischen Gesundheit besonders ins Gewicht. Die unterbrechungsfreie, d.h. kontinuierliche Behandlung wird als einer der wichtigsten Wirkfaktoren für Genesungsprozesse von Menschen angesehen, die wiederkehrend in schwere psychische Krisen geraten [5, 6]. Die personelle und Informationskontinuität sind in der Behandlung jedoch häufig nicht gewährleistet, was Genesungsprozesse, insbesondere von Menschen mit schweren psychischen Störungen, deutlich erschwert. Besonders nachteilig wirkt sich die Fragmentierung auch für Personen mit (mehreren) psychischen und körperlichen Erkrankungen (Multimorbidität) aus, die gehäuft im höheren Alter vorkommen [7].

Darüber hinaus sind die Unterstützungsbedarfe von Menschen mit psychischen Störungen oft komplex und nicht auf Leistungen des SGB V-Bereiches begrenzt: Betroffene beziehen vielfach Rehabilitations- und Teilhabeleistungen (in den Bereichen Wohnen, Arbeit und soziale Integration) oder Leistungen der Renten- und Arbeitslosenversicherung, die getrennt von Krankenkassenleistungen finanziert und erbracht werden. Auch an dieser Stelle wirkt sich die fehlende (rechtskreis-) übergreifende Koordination von Leistungen nachteilig aus und führt zu Reibungsverlusten, deren Leidtragende die Leistungsempfänger sind [8, 9].

Trotz der ausdrücklichen Forderung des Sachverständigenrates für die Begutachtung und Entwicklung im Gesundheitswesen, das Problem der Fragmentierung auf Bundesebene zu lösen [10], konnten bisherige Gesetzesinitiativen keine nachhaltige Wirkung erzielen: Projekte zur integrierten oder sektorenübergreifenden Versorgung (§§ 64b und 140a SGB V) wurden nicht flächendeckend umgesetzt, sind in ihrer Laufzeit limitiert oder begrenzt auf Leistungen der Krankenkassen [11, 12]. Aufgabe der VF ist es diese und andere Versorgungsmodelle empirisch weiterzuentwickeln, damit sie im Falle positiver Evaluation in die Regelversorgung übertragen werden können. Dafür sind mehr sektoren- und sozialgesetzbuchübergreifende Versorgungs- und Forschungsprojekte sowie Projekte, die Versorgung außerhalb der etablierten Versorgungsstrukturen organisieren, notwendig, die jedoch häufig an divergierenden Interessen der Beteiligten oder mangelnden Förderinitiativen scheitern [13, 14].

Ressourcenallokation

Seit geraumer Zeit fordern sowohl Versorgungsakteure als auch Gesundheitspolitik die Umsetzung des Grundsatzes „ambulant vor stationär". Zwar wird inzwischen eine stetig wachsende Zahl an Nutzern ambulant versorgt [15, 16] – der Großteil der zur Verfügung stehenden Ressourcen fließt jedoch in den stationären Sektor, wo er einem deutlich geringeren Anteil an Leistungsempfängern zugutekommt [15, 17]. Darüber hinaus wird im ambulanten Bereich nur ein kleiner Teil der Versorgungskosten für Menschen mit schweren psychischen Störungen (v.a. psychotische Störungen sowie abhängigem Verhalten und Sucht) aufgewendet [18].

Dies ist umso problematischer, als dass umfassende Wirksamkeitsbelege für intensiv ambulante und aufsuchende Behandlungsmodelle für jene Nutzergruppen bestehen, deren Umsetzung u.a. aus Gründen unzureichender Refinanzierung nur begrenzt erfolgt [19]. Aufgabe der VF ist es hier, Versorgungsangebote zu implementieren und zu evaluieren, die eine stärker an individuellen Unterstützungsbedarfen ausgerichtete Ressourcenverteilung ermöglichen („Geld folgt Patient" anstatt „Patient folgt Geld"). Langfristiges Versorgungsziel ist es, Menschen mit psychischen Störungen über das gesamte Schweregradspektrum hinweg eine adaptierte Behandlungsintensität anbieten zu können, die sich zu jeder Zeit an (den wechselnden) individuellen Bedarfen orientiert. Beispiele hierfür sind Stepped-Care-Modelle oder settingflexible multiprofessionelle Teams [20–22].

Zugangs- und Versorgungswege

Bisherige Untersuchungen von Zugangs- und Versorgungswegen zeigen, dass Menschen mit psychischen Störungen häufig ein verzögertes Hilfesuchverhalten aufweisen [23, 24]. Mögliche Gründe hierfür sind Stigmatisierung, mangelnde Bedürfnisorientierung, unzureichendes Wissen über verfügbare Unterstützungsangebote, fehlende Zugangsmöglichkeiten oder Probleme bei der Navigation im vielfältigen Hilfesystem. Die Wahrnehmung von Versorgung kann aber auch störungsbedingt eingeschränkt sein, z.B. durch Einschränkungen der Kognition und Willensbildung bei Vorliegen einer Demenz.

Es ist wissenschaftlich wenig untersucht, welche „Eintrittspforten" ins Versorgungssystem wann genutzt werden, wie sich die Inanspruchnahme im weiteren Verlauf gestaltet, wie kritische Ereignisse (z.B. Arbeitsunfähigkeit oder Erwerbsminderung) die Behandlung beeinflussen oder an welchen Stellen Nutzer aus dem System fallen bzw. von Behandlung nicht profitieren und/oder diese abbrechen. Zwar liegen Ergebnisse aus dem Ausland vor, die jedoch nur bedingt auf das deutsche Versorgungssystem übertragen werden können [25, 26]. Die VF sollte ein größeres Wissen über die Zugangs- und Versorgungswege bereitstellen, damit Versorgungsakteure und Politik geeignete Maßnahmen entwickeln können, um die Sichtbarkeit, Niederschwelligkeit und Kontinuität von Gesundheitsleistungen an relevanten Stellen im Hilfenetz zu verbessern [27].

Individuumszentrierung und mehrgenerationale Perspektive

Ein erhebliches Problem der Versorgung von Menschen mit psychischen Störungen ist in der „Individuumszentrierung" und der fehlenden systemischen Orientierung des Versorgungssystems

Heruntergeladen von: Universität Potsdam. Urheberrechtlich geschützt.

begründet, sowohl bei der Versorgung von Erwachsenen, als auch bei der von Kindern und Jugendlichen [28]. Nach wie vor fokussiert Versorgung im Feld der seelischen Gesundheit auf „Störungen" einzelner Personen, anstatt komplexe Dynamiken zwischen bspw. Familienangehörigen und mehrgenerationale Zusammenhänge systematisch in den Blick zu nehmen. Veränderungen von interpersonellen und intergenerationellen Abhängigkeiten über die Lebensspanne sind an dieser Stelle ebenfalls zu berücksichtigen.

Die Aufgabe der VF ist an dieser Stelle die vielfältigen Wechselwirkungen zwischen Menschen, auch unterschiedlicher Generationen, sowie deren Ressourcen und sozialen Netzwerke stärker in Behandlungsprozesse zu integrieren, bzw. geeignete Versorgungsmodelle zu entwickeln, die diese Zusammenhänge berücksichtigen. Erste Schritte in diese Richtung sind mit der Implementierung von Eltern-Kind-Behandlungsansätzen (z.B. Eltern-Säugling-Kleinkind-Psychotherapie), oder auch systemischen Ansätzen zur Krisenintervention (z.B. Offener Dialog oder Systemische Psychiatrie) getan [29, 30]. Es fehlt jedoch an umfassenden Outcome-Evaluationen sowie Implementierungsstudien zur Förderung dieser und anderer systemischer Versorgungsmodelle.

Grenzen diagnostischer Kategorien

Es gibt substantielle Kritik an den im Feld der seelischen Gesundheit gängigen Klassifikationssystemen ICD, DSM und ICF [31, 32], die ihren Ursprung in unterschiedlichen Disziplinen haben, bspw. in den Sozialwissenschaften, in der Wissensproduktion von selbst Betroffenen [33, 34], in der Psychiatriegeschichte [35], in der transkulturellen Psychiatrie [36, 37], in der Psychiatrie und Psychologie [38–40] und in den Grundlagenwissenschaften [41]. Diese Kritik ist auch für das Feld der VF von Belang, weil sie die epistemische Grundlage vieler Forschungsvorhaben oder Versorgungsprogramme im Feld der seelischen Gesundheit betrifft. Sie bezieht sich erstens auf die begrenzte Validität fast aller Klassifikationen [42]. Von Seiten der Grundlagenwissenschaften wird zweitens beanstandet, dass die gängigen Klassifikationssysteme ungeeignet für sowohl die Systematisierung bestehender als auch Generierung neuer Erkenntnisse seien [41]. Andere Kritik richtet sich auf ihren normativen Charakter: Sie reproduzierten (euro-amerikanische) Werte und hätten darum keine universelle Gültigkeit [36, 43]. Sie veränderten das Selbstverständnis von Betroffenen, hätten pathologisierende und medikalisierende Effekte, und verstärkten das Stigma und die soziale Distanz von und zu Menschen mit seelischen Krisenerfahrungen.

Gleichzeitig bilden die bestehenden Klassifikationen die fundamentale Infrastruktur für die praktische Arbeit, Organisation von Forschung, Umsetzung vieler Vergütungsansätze, Organisation von Lehre und Weiterbildung und für politische Entscheidungen und Planungen [44]. Sie haben also eine hohe Bedeutung, sodass in künftigen Projekten der VF ihre Kritik systematisch berücksichtigt werden sollte (bspw. durch unterschiedliche Messinstrumente, durch partizipative und lebensweltliche Forschungsansätze). Inzwischen wurden alternative, funktionsbezogene und transdimensionale Klassifikationsansätze entwickelt, z.B. RDoC (Research Domain Criteria), HiTOP (Hierarchical Taxonomy Of Psychopathology) und PTMF (Power to Threat Meaning Framework) [39, 45, 46], die darauf zielen anschlussfähiger für Fragen der Grundlagenwissenschaften und kritische Ereignisse im Leben der Betroffenen zu werden. Diese Ansätze sollten künftig auch in Projekten der VF kritisch erprobt werden, ob sie als epistemische Grundlage zu Versorgungsangeboten mit größerer Praxisrelevanz oder Patientenorientierung führen.

Herausforderungen bei der Forschungsorganisation und -umsetzung

Die Durchführung von Projekten der VF im Feld der seelischen Gesundheit wird durch verschiedene pragmatische Hürden und Herausforderungen erschwert, welche sich auch auf Grund der Besonderheiten und Komplexität des Versorgungsbereiches ergeben.

Sektorenübergreifende Sekundärdaten

Nach wie vor werden die Daten verschiedener Behandlungssektoren in unterschiedlichen Formaten erfasst (z.B. ambulanter KV-Bereich: §295, PIAs: §118, Arzneimittelverordnungen: §300, stationäre Versorgung: §21 und §301 SGB V). Darüber hinaus liegen Daten anderer Sozialleistungsträger (z.B. gesetzliche Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung, kommunale Träger von Teilhabeleistungen, private Kranken- und Pflegeversicherungen) vor. Für eine sektorenübergreifende Betrachtung, z.B. zwecks Analyse von Versorgungspfaden oder der sektorenübergreifenden Qualitätssicherung, können die oben genannten Daten des SGB V über die Bereitstellung von Daten gesetzlicher Krankenversicherungen zusammenhängend bereitgestellt werden [47, 48]. Jedoch ist der Einbezug weiterer Daten anderer Sozialleistungsträger aufgrund von Schnittstellenproblemen und aufgrund der Regelungen des Datenschutzes schwierig. Diese sind jedoch für eine vollständige Abbildung von Versorgungspfaden, z.B. Schnittstellen zwischen Reha-Leistung und gesetzlicher Krankenversicherung, wichtig. Auch die Bemühungen zur Implementierung sektorenübergreifender Versorgungsmodelle konnten bisher keinen nennenswerten Beitrag zur Lösung dieser Problemstellung beitragen [49].

Quartalsbezug ambulanter Daten

Eine Hürde, welche die übergreifende Analyse ambulanter und stationärer Behandlungsdaten erschwert, ist der Quartalsbezug ambulanter Leistungsdaten. Dies macht sich im Besonderen in der Beforschung innovativer und settingübergreifender Versorgungsformen bemerkbar: In den psychiatrischen Modellvorhaben (nach §64b SGB V) wird bspw. eine akute ambulante Behandlung als Alternative zur stationären Behandlung angeboten [50]. Dadurch ergibt sich die Notwendigkeit, Behandlungsepisoden abzubilden, welche auch einzelne Quartale „überlappen". Anhand der quartalsbezogenen Daten lässt sich jedoch nicht feststellen, wann eine ambulante Behandlungsepisode beginnt und wann sie endet [51]. Derzeit gibt es von Seiten verschiedener Kostenträger und Versorger Bestrebungen, den Quartalsbezug aufzuheben, z.B. im Zuge der Revision des digitalen Versorgungsgesetzes, um so Datenerfassung und -auswertung zu erleichtern [52]. Letzteres würde die Möglichkeiten der VF im Bereich ambulanten und sektorenübergreifenden Versorgung erheblich erweitern.

Heruntergeladen von: Universität Potsdam. Urheberrechtlich geschützt.

Daten zu Zwang und Gewaltereignissen

Die Anzahl öffentlich-rechtlicher als auch Unterbringungen im Maßregelvollzug (§§ 63-64 StGB) sind in den letzten zwei Jahrzehnten kontinuierlich gestiegen, wie aktuelle Daten des Bundesamts für Justiz zeigen [53]. Es ist daher ein dringendes Anliegen der VF, die Ursachen dieses Zuwachses zu untersuchen und Handlungsempfehlungen für dessen Reduzierung abzuleiten. Die verfügbaren Daten beinhalten jedoch nur die kumulierte Zahl der Unterbringungen nach PsychKG („Psychisch-Kranken-Gesetz") bzw. Betreuungsrecht. Weitere Informationen über die Dauer der Unterbringung und über ggf. stattgefundene Zwangsmaßnahmen oder Gewaltereignisse müssen zwar von den Kliniken erfasst werden, liegen jedoch bisher nicht in einem bundeseinheitlichen Format vor. Voraussetzung für die Reduzierung von Zwangsmaßnahmen wären zum einen valide Daten, zum anderen die Entwicklung geeigneter Messinstrumente. Eine Arbeitsgruppe der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde befasst sich mit diesem Thema und hat ein erstes Instrument zur fallbezogenen Erfassung von Zwangsmaßnahmen entwickelt und validiert [54].

Ergänzende Daten im Rahmen der Routinedokumentation

Die in den 1990er Jahren ursprünglich zu Zwecken der Qualitätssicherung und Benchmarking eingeführte „Basisdokumentation Psychiatrie" (BADO) enthält wichtige ergänzende soziodemographische, krankheitsbezogene Variablen sowie Variablen über Behandlungsprozesse und Outcomes [55]. Die BADO hat sich als Datenquelle in der VF praktisch nicht durchgesetzt, weil der Dokumentationsaufwand erheblich und die Anwendung freiwillig war, mit dem Ergebnis einer limitierten Datenqualität [56]. Zielführend erscheint die Entwicklung eines Sets ergänzender Daten, welche ohnehin in der Versorgung anfallen und die in den bisherigen Datenformaten (z.B. nach §21 KHEntgG) nicht enthalten sind. Letzteres könnte die BADO entweder ergänzen oder ablösen, in jedem Fall sollte es – zur Sicherung der Datenqualität – von den Kliniken verpflichtend erhoben werden. Dies betrifft bspw. eine differenziertere Erfassung von Patientenmerkmalen, die auf eine besonders hohe Betreuungsintensität hinweisen (sog. Intensivmerkmale). Zu berücksichtigen wären hier auch Parameter, welche für andere Disziplinen bzw. Arbeitsfelder im Bereich der seelischen Gesundheit relevant sind (z.B. psychosomatische Medizin und psychosomatische Rehabilitation; ambulante Psychotherapie).

Qualitätssicherung und -indikatoren

Die Relevanz der Qualitätssicherung mittels Qualitätsindikatoren (QI) gewinnt auch in der psychiatrisch-psychotherapeutischen Versorgung zunehmend an Bedeutung, wobei die QI praktikabel messbare, valide zu erfassende und durch die Versorger beeinflussbare Qualitätsaspekte abbilden sollen [57]. An die methodische Qualität von QI sind Anforderungen zu stellen, die zu kosten- und zeitintensiven Entwicklungs- und Dokumentationsprozessen führen können: Neben einem partizipativ zu gestaltenden evidenz- und konsensbasierten Entwicklungsprozess, sind auch die Identifizierung und Nutzbarmachung geeigneter Datenquellen bedeutsam (z.B. Abrechnungsdaten, zusätzliche standardisierte medizinische Dokumentationen).

Psychiatrische QI wurden bereits von transnationalen Organisationen und in einzelnen Staaten, wie in der Schweiz, entwickelt und teilweise implementiert [58–60]. In Deutschland wurden psychiatrische QI erstmals vom AOK-Bundesverband und der DGPPN vorgeschlagen [61, 62]. Einzelne psychiatrische Klinikverbünde (Vitos-Kliniken und LVR-Klinikverbund) haben eigene diagnoseübergreifende QI-Sets definiert und implementiert [63–65]. Zusätzliche Dokumentationen scheinen insbesondere für Ergebnisindikatoren erforderlich zu sein, da diese sich nur schlecht aus Routinedaten ableiten lassen [66]. Zuletzt entwickelte das Institut für Qualität und Transparenz im Gesundheitswesen (IQTiG) im Rahmen der externen Qualitätssicherung nach § 136 SGB V Qualitätsindikatoren für die Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen. Auch hier bestätigte sich, dass gerade bei Ergebnisindikatoren und sektorenübergreifenden QI ein hoher, zusätzlicher Erhebungsaufwand besteht [67]. Aktuell steht eine Machbarkeitsprüfung an, bevor diese QI voraussichtlich ab dem Jahr 2023 deutschlandweit verpflichtend eingeführt werden [68]. Analoge Entwicklungen für QI erscheinen für weitere Bereiche der Versorgung psychischer Störungen in der Psychosomatik und psychosomatischen Rehabilitation wie auch der ambulanten Psychotherapie ebenfalls zielführend.

Gesundheitsökonomische Aspekte

Angesichts der enormen epidemiologischen und damit gesundheitsbudgetären Bedeutung psychischer Störungen besitzen gesundheitsökonomische Untersuchungen eine hohe Relevanz. Die Kosten für die Versorgung psychisch kranker Menschen wachsen seit Jahren exponentiell und betrugen im Jahr 2015 44,4 Mrd. €, was einen Anteil von ca. 13 % an den Gesamtausgaben für die Gesundheitsversorgung in Deutschland darstellt. Angesichts des ständigen Kampfes um knappe Gesundheitsbudgets machen diese Größenverhältnisse die Gesundheitsökonomie zu einem unverzichtbaren Bestandteil der VF im Feld der seelischen Gesundheit. Sie hat sich jedoch in Deutschland erst spät etabliert und ist nur an wenigen universitären Standorten verankert. Das führt dazu, dass die Kosteneffektivität fast aller derzeitigen Interventionen und Maßnahmen der Routineversorgung bei psychischen Störungen unbekannt ist, mit dem damit einhergehenden hohen Risiko der Fehlallokation knapper Mittel. Gleichermaßen nicht beziffert ist der volkswirtschaftliche Schaden, den die hohe unbehandelte Prävalenz psychischer Störungen verursacht, etwa in Form von Produktivitätsverlusten, Unter-, Über- und Fehlversorgung, Sekundärkosten in der Sozialhilfe oder Spätfolgen für das Rentensystem.

Die Chance der Identifikation ineffektiver Versorgungsstrategien und eines effizienteren Mitteleinsatzes wächst mit der Ausweitung gesundheitsökonomischer Analysen. Ihre Befunde sollten obligatorische Grundlage gesundheitspolitischer Entscheidungen sein. Der Fokus sollte dabei u.a. auf die fragmentierten, zwischen den Sozialgesetzbüchern aufgeteilten Finanzierungszuständigkeiten gerichtet werden, denen hohe Synergie- und Budgetverluste zugeschrieben werden können. Die gesundheitsökonomische Betrachtung hat zudem das ethische Potenzial, den vermutlich hohen subjektiven Nutzen für die Betroffenen sichtbar zu machen. Das gesundheitsökonomische Standardverfahren der Berechnung der Kosten der sog. Qualitätskorrigierten Lebensjahre (QALYs) liefert ein standardisiertes Maß, das den subjektiven Nutzwert (Lebensqualität) von Versorgungsmaßnahmen vor dem Hintergrund des

Heruntergeladen von: Universität Potsdam. Urheberrechtlich geschützt.

dafür notwendigen Mitteleinsatzes beziffert. Es besteht die begründete Annahme, dass die Kosten per QALY in der Versorgung psychischer Störungen günstiger verlaufen als in vielen anderen medizinischen Fachgebieten.

Ethische, gesellschaftliche und rechtliche Besonderheiten

Die VF im Feld der seelischen Gesundheit erfordert die Berücksichtigung verschiedener ethischer, gesellschaftlicher und rechtlicher Besonderheiten, die sich aus ihrem Gegenstandsbereich selbst, aber auch aus den Besonderheiten der mit ihr verbundenen Praxisfelder ergeben. In dieser Arbeit wurde der Begriff „ethisch" genutzt, weil im Folgenden Fragen angesprochen werden, die sich im weitesten Sinn mit gesellschaftlichen, (sozial-)politischen, wertebezogenen und rechtlichen Besonderheiten und Herausforderungen im Versorgungsfeld der seelischen Gesundheit befassen [69].

Zusammenhang mit gesellschaftlichen Entwicklungen

Beeinträchtigungen im Bereich der seelischen Gesundheit hängen eng mit sozialen Fragen zusammen [70]. Fragen der Armut, der Gewalt und eine Bandbreite anderer Variablen sind Einflussfaktoren für viele der in diesem Feld diagnostizierten Störungen [71]. Wie oben bereits beschrieben, sind außerdem viele der im Bereich der seelischen Gesundheit verwendeten Klassifikationen eng mit gesellschaftlichen Normen und Vorstellungen verwoben. Hier finden einige gesellschaftliche Spannungsfelder Ausdruck und werden, umgekehrt, durch Klassifikationen rückwirkend beeinflusst.

Die Prävalenz und Inzidenz seelischer Beeinträchtigungen ist mit gesellschaftlichen Bedingungen verbunden. Sie hängt sowohl von „sozialen Megatrends" auf der Makroebene (bspw. Globalisierung, Digitalisierung der Arbeitswelt, neue Suchtformen, wie z.B. die Internetsucht [72–74]) als auch von Veränderungen des Zusammenlebens auf der Meso- und Mikro-Ebene (bspw. veränderte Sozialpolitik oder veränderte Sozialstruktur [75, 76]) ab. Psychische Störungen spiegeln diese Veränderungen einerseits wider, haben andererseits aber auch einen unmittelbaren Einfluss auf die soziale Wirklichkeit, indem sie sich auf das Zusammenleben in unterschiedlichen Lebensbereichen (Partnerschaft/Familie, Beruf, Freizeit) auswirken.

Um diese vielfältigen und teils rekursiven Wechselverbindungen auch methodologisch stärker zu berücksichtigen, braucht es im Feld der VF noch mehr transdisziplinäre Forschungsvorhaben (zusammen mit den Fachbereichen Ethnologie, Soziologie, Disability Studies usw.), die unter Einbezug verschiedener Forschungsansätze entsprechende Zusammenhänge explorieren und ihr Potenzial in Hinblick auf innovative Modelle der Versorgung und VF ausloten. Nur so lassen sich Krisen und Beeinträchtigungen einzelner Personen in einen größeren Kontext stellen, der sowohl für Ansätze der Prävention und Versorgung als auch für das theoretische Selbstverständnis von VF im Bereich seelische Gesundheit von zentraler Bedeutung ist.

Stigma und Diskriminierung

Seelische Beeinträchtigungen haben starke Auswirkungen auf das Selbst- und Fremderleben Betroffener und auf die jenigen, die mit ihnen im Kontakt stehen [77]. Stigma als eine „zweite Erkrankung" muss entsprechend in der Ausgestaltung und Umsetzung von VF-Projekten berücksichtigt werden. Stigmatisierung wirkt sich nicht nur auf Fragen der Interaktion und Kommunikation aus, sondern auch auf die Rollen und auf das Selbst- und Fremdverständnis der an der Versorgung beteiligten Akteure und die Versorgungsstrukturen als Ganzes [78].

Stigma kann eine Rolle spielen bei Fragen von Zugangsbarrieren zu psychosozialen Angeboten [79]. Es kann eine Angebotsstruktur unterlaufen oder auch die von ihr intendierten Behandlungsergebnisse. In den von seelischen Beeinträchtigungen betroffenen Familien oder anderen Systemen spielen Fragen der Schuld, Scham und Verantwortung meistens eine zentrale Rolle, sodass diese Aspekte bei der Planung und Evaluation von Versorgung immer mit bedacht werden müssen [80]. Neben dieser individuellen Diskriminierung ist auch die strukturelle Ebene zu berücksichtigen. Demnach ist zu untersuchen, inwiefern Strukturen oder Regeln existieren, die Betroffene psychischer Störungen systematisch benachteiligen (strukturelle Diskriminierung) [81].

Unter- und Fehlversorgung von Komorbiditäten

Menschen mit psychischen Störungen und insbesondere jene, die zusätzlich unter körperlichen Erkrankungen leiden, haben ein prägnant erhöhtes Mortalitätsrisiko [82–84]. Dafür sind deutlich mehr kardiovaskuläre und onkologische Erkrankungen verantwortlich als Unfälle oder Suizide. Menschen mit psychischen Störungen haben ein erhöhtes Risiko für chronische körperliche Erkrankungen. Ferner ist diese Bevölkerungsgruppe unverhältnismäßig von Armut betroffen, was ein zusätzliches Gesundheitsrisiko darstellt [85, 86].

Angesichts dieser Ausgangssituation kann die VF Beiträge zur Verbesserung der Versorgung von Komorbidität leisten, etwa durch Forschung zu effektiver Sensibilisierung und Aufklärung, zum Nutzen von Trainings in der Gesundheitsversorgung, zur Reduktion von Stigmatisierung sowie zu integrierten Versorgungsmodellen, wie sie in anderen Ländern bereits implementiert sind. Beispielhaft sei auf die PCARE Studie hingewiesen, welche die Wirksamkeit einer gemeindenahen sog. Medical Management Intervention zur Verbesserung der allgemeinmedizinischen Versorgung, der Lebensqualität und des kardiovaskulären Risikos von Menschen mit psychischen Störungen gezeigt hat [87]. Um ein weiteres Beispiel zu nennen, verdeutlicht die PROD-BP Studie die präventive Wirksamkeit einer digitalen Gesundheitsanwendung gegen die Entwicklung depressiver Störungen für Menschen mit chronischem Rückenschmerz im Übergang von medizinischer Rehabilitation in die postrehabilitative Versorgung [88].

Digitalisierung und e-Mental-Health

Die zunehmende Digitalisierung und die damit verbundenen Chancen und Herausforderungen betreffen auch die Versorgungssituation von Menschen mit psychischen Störungen. eHealth beschreibt ein sehr weites Themenfeld der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) und umfasst heterogene Bereiche, wie die Telematikinfrastruktur, die elektronische Patientenakte und die

Heruntergeladen von: Universität Potsdam. Urheberrechtlich geschützt.

mittlerweile an vielen Stellen bereits als Regelversorgung umgesetzte Videokonferenz-basierte Behandlung. Die in den vergangenen Jahren erfolgten regulatorischen Änderungen z.B. im Kontext des E-Health-Gesetzes, des Digitale Versorgung Gesetzes (DVG) und der darauf aufbauenden DiGA (Digitale Gesundheitsanwendungen)-Verordnung sowie der Anpassungen der psychotherapeutischen und ärztlichen Musterberufsordnungen bieten weitreichende Möglichkeiten für eine verstärkte digitalisierte Versorgung mit vielfältigen Ansätzen der digitalisierten psychometrischen Diagnostik sowie Prävention und Behandlung [89–91].

Im Kontext der VF stehen derzeit translationale Fragestellungen im Zentrum der Aufmerksamkeit, mit dem Ziel der Quantifizierung der Wirksamkeit digitaler Gesundheitsinterventionen unter Versorgungsbedingungen (efficacy vs. effectiveness) [92], der Wirksamkeit in der Routineversorgung [93], der differentiellen Wirksamkeit i.S. der personalisierten Psychotherapie [94, 95], der Dissemination und Implementationsmöglichkeiten in den Routinealltag unter Beachtung unterschiedlicher Faktoren wie Diversität und Technologiefolgeabschätzungen [96–98]. Außerdem werden derzeit neue Ansätze evaluiert, wie z.B. Chatbots [99], Just-in-time-Interventionen [100] oder Digital Phenotyping und Mobile Sensing gestützte Diagnostiksysteme [101], in Bezug auf ihre Akzeptanz, Realisierbarkeit und Risiken im Versorgungsalltag. Bedeutsam erscheinen dabei vor allem auch Varianzen von Studienergebnissen, damit spezifische Applikationen in den verschiedenen Versorgungssettings und in Bezug auf ihre differentielle Effektivität, Kosten-Effektivität und Nebenwirkungen untersucht werden können.

Perspektivendifferenz und Partizipative Forschungsansätze

Eng mit Fragen der Stigmatisierung und Diskriminierung verbunden ist das Thema der Perspektivendifferenz und Machtverteilung zwischen Mitarbeitern und Nutzern inner- und außerhalb psychosozialer Versorgungsinstitutionen der seelischen Gesundheit. Zu diesem Thema gibt es in unterschiedlichen Disziplinen eine reichhaltige Auseinandersetzung. Besonders in den Geistes- und Sozialwissenschaften sind die ungleichen Machtverhältnisse in psychiatrischen Institutionen zu paradigmatischen Beispielen geworden [102, 103]. Demnach sind strukturelle Formen der Benachteiligung und Ungleichheit bis heute zentrale Themen unterschiedlicher wissenschaftlicher Ansätze zu diesem Versorgungsfeld [104]. Daraus erwächst eine fundamentale Differenz an Perspektiven, sodass sich der Blick auf die Versorgung, je nach „Seite der Macht", stark voneinander unterscheiden kann.

Damit verbunden ist eine kontinuierliche Auseinandersetzung mit Machtverhältnissen und Differenzen von Perspektiven, auch in Projekten der VF im Feld der seelischen Gesundheit. Zentrale Instrumente dafür sind partizipative und betroffenenkontrollierte Forschungsansätze [105], so wie sie v. a. im anglo-amerikanischen Wissenschaftsdiskurs schon deutlich länger eingesetzt und dort oft auch angemessen ausgeschrieben und refinanziert werden [106]. Außerdem sollten patientenrelevante Outcomes, wie Autonomie, Empowerment und das Erleben der Mitarbeiter-Patienten-Beziehung in Projekten der VF im Feld der seelischen Gesundheit obligat sein. In welcher Weise in Forschung und Versorgungswirklichkeit welche Kompetenzen und Wissensbestandteile von welchen Akteuren einbezogen werden oder werden sollten, sind im Feld der seelischen Gesundheit Fragen von zentraler Bedeutung.

Rechtliche Besonderheiten

Viele Institutionen mit Versorgungsverpflichtungen von Menschen mit psychischen Störungen haben nicht nur einen therapeutischen, sondern auch einen ordnungspolitischen Auftrag. Dazu gehören sowohl die Möglichkeiten der Unterbringung und Zwangsbehandlung einer Person entsprechend § 1906 des Bürgerlichen Gesetzbuches oder der landesspezifischen Gesetze für psychisch Kranke. Hinzu kommen die strafrechtlich begründeten Verfahren der Maßregel und vorläufigen Unterbringung, die in Anstalten des Maßregelvollzugs umgesetzt werden. Obgleich diese Möglichkeiten v.a. die psychiatrische Versorgung und weniger direkt Aspekte der VF im Feld der seelischen Gesundheit insgesamt betreffen, werden sie dennoch hier aufgeführt, weil sie in ethischer Hinsicht von hoher Relevanz sind.

Aus diesen Eingriffsmöglichkeiten der Psychiatrie resultieren eine Reihe von Implikationen auch für die Umsetzung von VF. Erstens erwachsen hieraus eine starke Differenz an Perspektiven: Der Blick auf die Psychiatrie und Psychotherapie ist sehr unterschiedlich, je nach persönlichen Erlebnissen in diesen Kontexten (z.B. Betroffene vs. Ausführende von Zwangsmaßnahmen) [33]. Zweitens ist genau dieses „Doppelmandat" der Psychiatrie, das daraus erwächst, dass die Psychiatrie neben ihrem Versorgungsangebot auch hoheitliche Aufgaben zu verantworten hat, für viele VF-Projekte von großer Relevanz. Zwei Beispiele hierfür sind die Evaluation der Zufriedenheit von Nutzern mit Versorgungsangeboten [107] oder die Entwicklung von Qualitätsindikatoren [61, 108], die immer auch Unterbringungs- und Zwangsmaßnahmen berücksichtigen müssen.

Wissensproduktion von Menschen mit eigener Erfahrung zu psychischen Störungen

Vermutlich auch aufgrund dieser Gegebenheiten, gibt es seit den 1960er Jahren eine reichhaltige Wissensproduktion von Personen und Personengruppen, die sich oft aus der Selbsthilfe und -vertretung heraus kritisch mit der Versorgung im Feld der seelischen Gesundheit auseinandergesetzt haben [109]. Auch in diesem Belang unterscheidet sich das Feld der seelischen Gesundheit von anderen Forschungsfeldern der VF. In keinem anderen Feld hat sich ein vergleichbar kritischer „Anti-Diskurs" entwickelt [34], in keinem Feld stoßen die Versorgungsformen und der damit verbundene Wissensbestand auf ähnlichen Widerstand.

In den letzten Jahrzehnten haben vor allem Menschen mit eigenen Erfahrungen zu psychischen Störungen und deren Behandlung dazu beigetragen alternative Sichtweisen zu den Themen „psychisch krank" und psychosoziale Versorgung zu generieren und aufzuarbeiten [110]. Dabei haben sie sich vielfach auf die Wissensproduktion diverser Sozialkritiker, revolutionärer Theoretiker und radikaler „Profis" der Antipsychiatrie bezogen oder eigene Theorien und Konzepte entwickelt. Gefordert werden dabei oft ein grundsätzlich verändertes Denken und Handeln in der Auffassung und im Umgang mit psychischen Störungen. Versorgungsforscher im Feld der seelischen Gesundheit sollten diese wertvollen Wissensbestände zumindest rezipieren und in ihre Überlegungen einbeziehen.

Heruntergeladen von: Universität Potsdam. Urheberrechtlich geschützt.

Besondere Themenstellungen

Neben diesen vier Bereichen finden sich weitere Besonderheiten unterschiedlicher Art, die hier nicht im Einzelnen diskutiert werden können, stattdessen wählen wir hier eine tabellarische Darstellung (▶ **Tab. 1**), die prioritären Themen und Aufgaben der VF auf dem Gebiet der seelischen Gesundheit zusammenträgt und auch die in dem vorliegenden Diskussionspapier besprochenen Themen zusammenfasst. Es wurden vorrangig Themenfelder berücksichtigt, die eine besondere versorgungspraktische Relevanz tragen. Die Darstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Empfehlungen

Zusammenfassend sind die folgenden Empfehlungen für die weitere Entwicklung der VF im Feld der seelischen Gesundheit abzugeben:

Angesichts des komplexen und vielseitigen Forschungsgegenstands „seelische Gesundheit" ist auf die Methodenentwicklung der VF in diesem Bereich Aufmerksamkeit zu legen: Eine Perspektiven- und Methodenvielfalt sind notwendig, um die Fülle an anstehenden Versorgungsherausforderungen im Feld der seelischen Gesundheit gegenstandsangemessen zu beantworten. Neben dem bereits etablierten Methodenrepertoire der VF ist, im Bereich der seelischen Gesundheit, die Weiterentwicklung der verschiedenen qualitativen Ansätze von besonderer Bedeutung, aber vor allem auch Methoden zur Integration von quantitativen und qualitativen

▶ **Tab. 1** Darstellung prioritärer Themen und Aufgaben der Versorgungsforschung im Bereich der seelischen Gesundheit.

Themenbereich	Zentrale Aspekte
Prävention und Früherkennung	▪ Untersuchung von Strategien für präventives und gesundheitsförderndes Handeln in Bezug auf Primär-, Sekundär- als auch Tertiärprävention ▪ Hilfesuchverhalten (Zugangs- und Versorgungswege) und Leistungsinanspruchnahme im Langzeitverlauf ▪ Ursachen zur Unter-, Über- und Fehlversorgung psychischer Störungen ▪ Barrieren für die Inanspruchnahme von Versorgungsleistungen (z.B. Herstellung von Niedrigschwelligkeit) ▪ Untersuchung der Wirksamkeit von spezifischen vs. unspezifischem Präventionsprogrammen ▪ Präventionsangebote für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie An- und Zugehörige von Menschen mit psychischen Störungen
Steuerung, Koordination und Integration	▪ Schnittstellen zu anderen Hilfesystemen (insbesondere zum ambulanten und komplementären Bereich) ▪ Sektoren- und rechtskreisübergreifende Kooperation ▪ Entwicklung und Implementierung eines Datenformates zur sektorenübergreifenden Leistungserfassung ▪ Konzepte der gestuften Versorgung („Stepped Care Modelle") ▪ Interprofessionelle Zusammenarbeit („Collaborative Care Modelle", „Integrated Care Modelle") ▪ Integrierte Versorgung von psychischer und somatischer Komorbidität (z.B. in der primärärztlichen Versorgung im Sinne des Primary Care Mental Health) ▪ Transgenerationale Versorgungsansätze (z.B. Eltern-Säugling-Kleinkind-Psychotherapie)
Ethik und Recht	▪ Maßnahmen zum Monitoring und zur Reduktion von Zwangsmaßnahmen und Gewaltereignissen ▪ Messung der Konformität von Versorgungsangeboten mit Rechtsnormen (z.B. UN-Behindertenrechtskonvention) ▪ Stigmatisierung durch Inanspruchnahme von Versorgungsleistungen im Bereich seelischer Gesundheit ▪ Forschung betreffend nicht einwilligungsfähiger Personen (z.B. die Kompetenz des gesetzlichen Vertreters bei gruppennützigen Studien)
Evidenzbasierung und Qualität der Versorgung	▪ (Weiter-) Entwicklung von Outcome-Maßen aus Sicht von Nutzern ▪ Qualitätsindikatoren zur Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität unter Berücksichtigung eines partizipativ-kollaborativen Ansatzes ▪ Leitlinienimplementierung und -konformität (inkl. Evaluation der Implementierung von Patientenleitlinien) ▪ Analyse von Versorgungswirksamkeit ▪ Patientensicherheit und Lebensqualität
Implementierung von innovativen und neuen Versorgungsformen	▪ Voraussetzungen und Strategien zur Implementierung und Diffusion neuartiger Versorgungsformen (z.B. settingübergreifende und integrierte Versorgungsmodelle nach §§ 64b, 140a-d SGB V, sowie stationsäquivalente psychiatrische Behandlung nach § 115d SGB V, Abend- oder Nachtklinik)
E-Mental-Health Intervention	▪ Effektivität, Reichweite und Akzeptanz von digitaler Gesundheitsanwendungen unter Routinebedingungen ▪ Systematische Integration von z.B. wirksamen Selbstmanagementprogrammen in die Behandlung bzw. Kombination von Online- und Face-to-Face Behandlung („Blended Care Modelle") ▪ Partizipationsprozesse von Nutzern bei der Entwicklung von telemedizinischen Versorgungsmodellen und Gesundheits-Apps („Participatory Digital Health")
Pharmakotherapie und -epidemiologie	▪ Optimierung der (stationären) Arzneimitteltherapie bei psychischen Störungen ▪ Evidenzbasierte Entscheidungshilfen zur Auswahl geeigneter Psychopharmakotherapie
Vergütungsstrukturen	▪ Untersuchung der Möglichkeiten zur Weiterentwicklung bestehender Vergütungskonzepte (z.B. Value-based Payment als qualitätsadjustierte Variante von pauschalierten und leistungsbezogenen Vergütungssystemen) ▪ Entwicklung und Evaluation von Anreizsystemen zur Förderung einer verbindlichen Zusammenarbeit von ambulanten (gemeindepsychiatrischen) und stationären Leistungserbringer (z.B. Kooperationsvergütung) ▪ Personalbemessung ▪ Erforschung der Auswirkungen bestehender Finanzierungsmodelle (z.B. Budget- oder tagesbezogene Vergütung) auf Versorgungsprozesse und -strukturen

Heruntergeladen von: Universität Potsdam. Urheberrechtlich geschützt.

Erkenntnissen, die im Rahmen von Mixed-Methods-Studien erlangt werden. Ein Ausbau transdisziplinärer und partizipativer Forschungsansätze ist dringend zu empfehlen und in der Forschungsförderung und Entwicklung institutioneller Forschungsschwerpunkte vorzusehen. Denn neben der Methoden- ist auch eine Perspektivenvielfalt notwendig, um die Fülle an anstehenden Versorgungsherausforderungen im Feld der seelischen Gesundheit gegenstandsangemessen zu beantworten.

Zusätzlich zeigen unsere Ausführungen den Bedarf an konzeptuell-theoretischen Innovationen: VF ist zwar in der Hauptsache anwendungsorientiert, für den Bereich der seelischen Gesundheit sollte jedoch auch eine theoriegeleitete VF etabliert sein, um vor allem zielgerichtete Hypothesen aufstellen zu können. Dies korrespondiert mit dem Reichtum der theoretischen Verstehensansätze in (Sozial-)Psychiatrie, Psychotherapie usw., deren Auswirkungen auf die konkreten Versorgungsansätze die VF berücksichtigen muss [111, 112]. Umgekehrt kann die VF dazu beitragen, die im Vergleich zu anderen medizinischen Fächern geringere Validität und Reliabilität, z.B. existierender diagnostischer Klassifikationssysteme, sichtbarer zu machen und somit Impulse für eine zeitgemäße Theoretisierung und Rahmung zu generieren und auszuloten.

In Anbetracht des komplexen Zusammenspiels unterschiedlicher Variablen sind im Feld der seelischen Gesundheit längere Laufzeiten für Evaluation und Forschung unabdingbar. Kurze Laufzeiten können in diesem Feld häufig nur bedingt Aufschluss über die Effekte einer Intervention geben. Gesellschaftliche Entwicklungen und oben genannte Megatrends haben häufig eigene Auswirkungen und erschweren eine klare Sicht auf die Problematiken zusätzlich. Sektorübergreifende, belastbare und zugängliche Datenformate und neue Möglichkeiten des Datenlinkage sollten hier entwickelt werden. Verpflichtende und bundeseinheitliche Erfassungsformate, nicht nur zu Zwangsmaßnahmen, sondern auch zu Versorgungs- und Präventionsleistungen in unterschiedlichen Sektoren und Disziplinen könnten eine gute Grundlage für systembezogene Erkenntnisse, und vielleicht auch mehrgenerationale Fragestellungen bieten. Wie in anderen Bereichen der VF sind neue Datenquellen zu erschließen und auch große Datenmengen handhabbar zu machen bis hin zur Nutzung von Methoden der künstlichen Intelligenz und Big-Data-Analysen. Im Feld der seelischen Gesundheit mit ihrer besonderen Patientenzentrierung spielen insbesondere auch Daten, die in den sozialen Medien entstehen, eine große Rolle.

Im Feld der seelischen Gesundheit gibt es mehr als in anderen Bereichen eine Vielzahl unterschiedlicher Modelle, um eine bessere bereichs- und sektorenübergreifende Versorgung zu gewährleisten (Integrierte Versorgung nach § 140a SGB V, Modellversorgung nach § 64b SGB V usw.). Gerade im Bereich seelischer Gesundheit haben sich einige der Innovationen (bspw. Selektivverträge) eher negativ auf Aspekte der Versorgungsgerechtigkeit ausgewirkt. Auch der Transfer in die Regelversorgung ist selbst bei positiven Evaluationsergebnissen noch defizitär. Zu fordern ist, dass erfolgreich evaluierte Modelle tatsächlich in die Regelversorgung überführt würden bzw. Untersuchungen anzustellen, welche Implementierungshürden hier bestehen. Es sind auch Analysen vorzunehmen z.B. zu den Auswirkungen der innovationsfondsgeförderten Projekte auf die Versorgungsqualität, wie sie aktuell auch vom DNVF betrieben werden. Ziel sollte sein, dass langfristige Planungssicherheit und eine kontinuierliche Verbesserung der Versorgung geschaffen wird sowie der Zugang zu innovativer Versorgung für möglichst alle Nutzer gegeben ist. Dadurch entstünde auch ein Mehr an Versorgungsgerechtigkeit.

Schließlich müssen vorhandene Steuerungs- und Anreizsysteme hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Versorgung differenziert bewertet und breit diskutiert werden. Vor allem in Hinblick auf eine bessere Ressourcen- und Bedarfsplanung kann die VF dazu beitragen Verteilungsmechanismen sektorübergreifend und durch Einbezug aller beteiligten Akteure kritisch zu überprüfen. Voraussetzung ist ein transparentes Monitoring und ein offener Umgang mit unterschiedlichen, vielleicht auch kompetitiven Interessen. Für diese Aufgaben braucht die VF im Bereich der seelischen Gesundheit eine entsprechend ausreichende Finanzierung und die notwendige wissenschaftspolitische Beachtung. Sie selbst muss sich bemühen, durch die Präsenz in Fachgremien und wissenschaftlichen Organisationen und durch die Förderung des geeigneten wissenschaftlichen Nachwuchses den selbst gesetzten Aufgaben gerecht zu werden.

Interessenkonflikt

Die Autorinnen/Autoren geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

Literatur

[1] Gühne U, Weinmann S, Riedel-Heller S et al. Matrix des Versorgungssystems. In: S3-Leitlinie Psychosoziale Therapien bei schweren psychischen Erkrankungen: S3-Praxisleitlinien in Psychiatrie und Psychotherapie. Berlin: Springer; 2019: 43–46

[2] Pfaff H, Neugebauer E, Matthias S. Lehrbuch Versorgungsforschung: Systematik – Methodik – Anwendung. Schattauer Verlag: 2017

[3] Bramesfeld A, Riedel-Heller S. Prioritäre Themen in der Versorgungsforschung zur psychischen Gesundheit. Psychiat Prax 2008; 35: 315–317. doi:10.1055/s-0028-1090027

[4] Wo stehen wir heute? Resümee und Ausblick? In: Armbruster J, Dieterich A, Hahn D, Ratzke K, Hrsg. 40 Jahre Psychiatrie-Enquete: Blick zurück nach vorn. Köln: Psychiatrie Verlag; 2015: 16–39

[5] Biringer E, Hartveit M, Sundfør B et al. Continuity of care as experienced by mental health service users – a qualitative study. BMC Health Services Research 2017; 17: 763. doi:10.1186/s12913-017-2719-9

[6] Green CA, Polen MR, Janoff SL et al. Understanding How Clinician-Patient Relationships and Relational Continuity of Care Affect Recovery from Serious Mental Illness: STARS Study Results. Psychiatr Rehabil J 2008; 32: 9–22. doi:10.2975/32.1.2008.9.22

[7] Sinnott C, Hugh SM, Browne J et al. GPs' perspectives on the management of patients with multimorbidity: systematic review and synthesis of qualitative research. BMJ Open 2013; 3: e003610. doi:10.1136/bmjopen-2013-003610

[8] Schwarz J, Stöckigt B, Berghöfer A et al. Rechtskreisübergreifende Kooperation in einem Gemeindepsychiatrischen Zentrum – eine qualitative Studie. Psychiat Prax 2019; 46: 200–205. doi:10.1055/a-0800-3783

[9] Ungewitter C, Böttger D, El-Jurdi J et al. Struktur und Kooperation in der Versorgung psychisch Kranker. Nervenarzt 2013; 84: 307–314. doi:10.1007/s00115-011-3433-1

Heruntergeladen von: Universität Potsdam. Urheberrechtlich geschützt.

[10] SVG. Sachverständigenrat für die Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen – Kurzfassung des Gutachtens 2018: Bedarfsgerechte Steuerung der Gesundheitsversorgung. 2019

[11] BMJV. § 64b SGB V – Modellvorhaben zur Versorgung psychisch kranker Menschen. 2012; Im Internet: https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__64b.html; Stand: 09.09.2018

[12] BMJV. § 140a SGB 5 - Besondere (integrierte) Versorgung. Im Internet: https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__140a.html; Stand: 04.06.2020

[13] Peters U. Erfolgreich scheitern – Die Folgen eines Projekts zur Einführung stationsersetzender Behandlung und ihrer Steuerung. Gesundheitswesen 2018; 80: 65–69. doi:10.1055/s-0043-121541

[14] Mikkelsen EN, Petersen A, Kaae AML et al. Cross-sector problems of collaboration in psychiatry. Dan Med J 2013; 60: A4707

[15] Melchinger H, Rössler W, Machleidt W. Ausgaben in der psychiatrischen Versorgung. Nervenarzt 2006; 77: 73–80. doi:10.1007/s00115-005-1886-9

[16] Robert Koch Institut. Gesundheitsberichterstattung des Bundes, gemeinsam getragen von RKI und DESTATIS. Gesundheit in Deutschland 2019; Im Internet: http://www.gbe-bund.de/pdf/GESBER2015.pdf

[17] Rössler W, Melchinger H, Schreckling S. Die ambulante Soziotherapie nach § 37a SGB V ist gescheitert. Psychiatr Prax 2012; 39: 106–108. doi:10.1055/s-0032-1304856

[18] Wienberg G. 40 Jahre Psychiatriereform in Deutschland - Auf dem Weg in die Drei-Klassen-Psychiatrie?!. Sozialpsychiatrische Informationen 2014; 44: 4–9

[19] Schwarz J, Bechdolf A, Hirschmeyer C et al. „Ich sehe es tatsächlich als Zwischenschritt“ – eine qualitative Analyse der Implementierungsbedingungen und -hürden von Stationsäquivalenter Behandlung in Berlin und Brandenburg. Psychiatrische Praxis 2021; 48:193–200. doi:10.1055/a-1274-3662

[20] Lambert M, Karow A, Gallinat J et al. Study protocol for a randomised controlled trial evaluating an evidence-based, stepped and coordinated care service model for mental disorders (RECOVER). BMJ Open 2020; 10: e036021. doi:10.1136/bmjopen-2019-036021

[21] Wienberg G, Steinhart I. Das Funktionale Basismodell der Versorgung von Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen – ein Update. Psychiat Prax 2020; 47: 9–15. doi:10.1055/a-1033-2900

[22] Mueller-Stierlin AS, Meixner F, Kohlmann A et al. Effectiveness and cost-effectiveness of a community-based mental health care programme (GBV) for people with severe mental illness in Germany: study protocol for a randomised controlled trial. Trials 2020; 21: 598. doi:10.1186/s13063-020-04492-y

[23] Clement S, Schauman O, Graham T et al. What is the impact of mental health-related stigma on help-seeking? A systematic review of quantitative and qualitative studies. Psychological Medicine 2015; 45: 11–27. doi:10.1017/S0033291714000129

[24] ten Have M, de Graaf R, Ormel J et al. Are attitudes towards mental health help-seeking associated with service use? Results from the European Study of Epidemiology of Mental Disorders. Soc Psychiat Epidemiol 2010; 45: 153–163. doi:10.1007/s00127-009-0050-4

[25] Strandh M, Winefield A, Nilsson K et al. Unemployment and mental health scarring during the life course. Eur J Public Health 2014; 24: 440–445. doi:10.1093/eurpub/cku005

[26] Schnyder N, Panczak R, Groth N et al. Association between mental health-related stigma and active help-seeking: Systematic review and meta-analysis. The British Journal of Psychiatry 2017; 210: 261–268. doi:10.1192/bjp.bp.116.189464

[27] DGPPN. S3-Leitlinie Psychosoziale Therapien bei schweren psychischen Erkrankungen (überarbeitete Fassung von 29.02.2019) Berlin, Heidelberg: Springer; 2019

[28] Schulte-Markwort M, Resch F, Plass A et al. Kinder psychisch kranker Eltern: Entwicklungsrisiken erkennen und behandeln. Originalausgabe Edition. Weinheim Basel: Beltz; 2012

[29] Fritz L-M, Domin S, Thies A et al. Profitieren psychisch erkrankte Eltern und psychisch belastete Kinder von einer gemeinsamen Eltern-Kind-Behandlung? Kindheit und Entwicklung 2018; 27: 253–267. doi:10.1026/0942-5403/a000264

[30] Seikkula J, Alakare B, Wilms Ü. des englischen OB. Bedürfnisorientierter Ansatz und Offener Dialog. PiD - Psychotherapie im Dialog 2015; 16: 28–33. doi:10.1055/s-0041-102233

[31] Association AP. Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen DSM-5®: Deutsche Ausgabe herausgegeben von P. Falkai und H.-U. Wittchen, ... W. Maier, W. Rief, H. Saß und M. Zaudig. 2., korrigierte Auflage. 2018Göttingen: Hogrefe Verlag; 2018

[32] Schuntermann M. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) - Kurzdarstellung Physikalische Medizin, Rehabilitationsmedizin, Kurortmedizin 2001; 11: 229–230. doi:10.1055/s-2001-19074

[33] Russo J, Sweeney A. Searching for a Rose Garden: challenging psychiatry, fostering mad studies. PCCS Books; 2016

[34] Lefrançois BA, Menzies R, Reaume G. Mad Matters: A Critical Reader in Canadian Mad Studies. Critical Edition. Toronto: Canadian Scholars; 2013

[35] Bentall RP, Beck AT. Madness Explained: Psychosis and Human Nature. New Edition. London: Penguin; 2004

[36] Young A. The Harmony of Illusions: Inventing Post-Traumatic Stress Disorder.Princeton University Press; 1995. Im Internet: https://www.jstor.org/stable/j.ctt7swhj; Stand: 15.12.2020

[37] von Peter S. The Experience of „Mental Trauma“ and its Transcultural Application. Transcultural psychiatry 2009; 45: 639–651. doi:10.1177/1363461508100786

[38] Bracken P, Thomas P. Postpsychiatry: a new direction for mental health. BMJ 2001; 322: 724–727

[39] British Psychological Society. Introducing the Power Threat Meaning Framework 2018; Im Internet: https://www.bps.org.uk/news-and-policy/introducing-power-threat-meaning-framework; Stand: 18.09.2019

[40] Sloan T. Critical Psychology: Voices for Change. 2000. Edition. Houndmills England: New York: Palgrave; 2000

[41] Cuthbert BN. The RDoC framework: facilitating transition from ICD/DSM to dimensional approaches that integrate neuroscience and psychopathology. World Psychiatry 2014; 13: 28–35. doi:10.1002/wps.20087

[42] Bracken P. Towards a hermeneutic shift in psychiatry. World Psychiatry 2014; 13: 241–243. doi:10.1002/wps.20148

[43] Hacking I. The Social Construction of What? Revised Edition. Cambridge, Mass: Harvard University Press; 2000

[44] Lefere S, De Rouck R, De Vreese L. What to expect from reliability and validity claims? A pragmatic conception of psychiatric nosology. J Eval Clin Pract 2017; 23: 981–987. doi:10.1111/jep.12686

[45] Insel T, Cuthbert B, Garvey M et al. Research Domain Criteria (RDoC): Toward a New Classification Framework for Research on Mental Disorders. AJP 2010; 167: 748–751. doi:10.1176/appi.ajp.2010.09091379

[46] Kotov R, Krueger RF, Watson D et al. The Hierarchical Taxonomy of Psychopathology (HiTOP): A dimensional alternative to traditional nosologies. Journal of Abnormal Psychology 2017; 126: 454–477. doi:10.1037/abn0000258

[47] Neumann A, Swart E, Häckl D et al. The influence of cross-sectoral treatment models on patients with mental disorders in Germany: study protocol of a nationwide long-term evaluation study (EVA64). BMC Psychiatry 2018; 18: 139. doi:10.1186/s12888-018-1721-z

Heruntergeladen von: Universität Potsdam. Urheberrechtlich geschützt.

[48] March S, Zimmermann L, Kubat D et al. Methodische Herausforderungen bei der Nutzung von Daten von mehr als 70 gesetzlichen Krankenkassen – Ein Werkstattbericht aus der EVA64-Studie. Gesundheitswesen 2020; 82: S4–S12. doi:10.1055/a-1036-6364

[49] Auschra C. Barriers to the Integration of Care in Inter-Organisational Settings: A Literature Review. International Journal of Integrated Care 2018; 18. doi:10.5334/ijic.3068

[50] Schwarz J, Galbusera L, Bechdolf A et al. Changes in German Mental Health Care by Implementing a Global Treatment Budget – A Mixed-Method Process Evaluation Study. Front Psychiatry 2020; 11. doi:10.3389/fpsyt.2020.00426

[51] Schwarz J, Schmid C, Neumann A et al. Implementierung eines globalen Behandlungsbudgets in der Psychiatrie – Welche Anreize, Voraussetzungen und Herausforderungen gibt es? Psychiatrische Praxis 2021; 48: 1–9. doi:10.1055/a-1421-3283

[52] Techniker Krankenkasse. Änderungsvorschläge zum Digitalen Versorgungsgesetz. 2019; Im Internet: https://www.tk.de/resource/blob/2066642/a2969e461df2f8ae17cd41cc2c1d5442/tk-positionierung-dvg-juni-2019-data.pdf; Stand: 15.07.2019

[53] Seifert D, Leygraf N. Entwicklung und Stand des psychiatrischen Maßregelvollzugs (§ 63 StGB). Forens Psychiatr Psychol Kriminol 2016; 10: 233–242. doi:10.1007/s11757-016-0386-z

[54] Adorjan K, Steinert T, Flammer E et al. Zwangsmaßnahmen in deutschen Kliniken für Psychiatrie und Psychotherapie. Nervenarzt 2017; 88: 802–810. doi:10.1007/s00115-016-0261-3

[55] Gaebel W, Spießl H, Becker T. Routinedaten in der Psychiatrie: Sektorenübergreifende Versorgungsforschung und Qualitätssicherung. 2009. Aufl. Heidelberg: Steinkopff; 2009

[56] Jaeger S, Flammer E, Steinert T. Basisdokumentation in der klinischen Praxis: Wie zuverlässig sind BADO-Daten? Psychiat Prax 2011; 38: 244–249. doi:10.1055/s-0030-1266084

[57] Reiter A, Fischer B, Kötting J et al. QUALIFY: Ein Instrument zur Bewertung von Qualitätsindikatoren. Zeitschrift für ärztliche Fortbildung und Qualität im Gesundheitswesen – German Journal for Quality in Health Care 2008; 101: 683–688. doi:10.1016/j.zgesun.2007.11.003

[58] ANQ. Nationaler Verein für Qualitätsentwicklung in Spitälern und Kliniken 2020; Im Internet: https://www.anq.ch/de/fachbereiche/psychiatrie/

[59] Fisher CE, Spaeth-Rublee B, Alan Pincus H. Developing mental health-care quality indicators: toward a common framework. Int J Qual Health Care 2013; 25: 75–80. doi:10.1093/intqhc/mzs074

[60] Hermann R, Mattke S. Selecting Indicators for the Quality of Mental Health Care at the Health Systems Level in OECD Countries. OECD Health. 2004; Im Internet: https://www.oecd.org/els/health-systems/33865630.pdf

[61] Weinmann S, Becker T. Qualitätsindikatoren für die Integrierte Versorgung von Menschen mit Schizophrenie. 1. Aufl. Psychiatrie-Verlag; 2010

[62] Großimlinghaus I, Falkai P, Gaebel W et al. Entwicklungsprozess der DGPPN-Qualitätsindikatoren. Nervenarzt 2013; 84: 350–365. doi:10.1007/s00115-012-3705-4

[63] Belling R, Bender M. Qualitätsindikatoren in der Psychiatrie. Punkt für Punkt erfassen. f&w 2016; 48–52

[64] Großimlinghaus I. Evidenzbasierte sektorübergreifende Qualitätsindikatoren sind praktikabel – Pro. Psychiatr Prax 2018; 45: 62–63. doi:10.1055/s-0043-124980

[65] Lehmann I, Engemann S, Zielasek J et al. Regionale Entwicklung und Implementierung von Qualitätsindikatoren für die stationäre psychiatrisch-psychotherapeutische Versorgung. Posterpräsentation am 12. Oktober 2018; Berlin; 2018

[66] Großimlinghaus I, Falkai P, Gaebel W et al. Assessment of quality indicators with routine data: Presentation of a feasibility test in ten specialist clinics for psychiatry and psychotherapy. Nervenarzt 2015; 86: 1393–1399. doi:10.1007/s00115-015-4357-y

[67] Beschluss G-BA. des Gemeinsamen Bundesausschusses über die Veröffentlichung des Abschlussberichtes über die Aktualisie-rung und Erweiterung des QS-Verfahrens Versorgung von volljährigen Patienten und Patientinnen mit Schizophrenie, schizotypen und wahnhaften Störungen vom 17. Januar. 2019; Gemeinsamer Bundesausschuss 2019; Im Internet: https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3660/2019-01-17_Qesue-RL_Freigabe-Veroeffentlichung-Schizophrenie-IQTiG.pdf

[68] IQTIG. Aufruf zur Teilnahme an der Machbarkeitsprüfung für das Qualitätssicherungsverfahren gemäß § 137a SGB V „Versorgung von volljährigen Patienten und Patientinnen mit Schizophrenie, schizotypen und wahnhaften Störungen“. 2020; Im Internet: https://iqtig.org/dateien/dasiqtig/bewerbung/2020/2020-06-03-IQTIG_Aufruf_Machbarkeitspruefung_Schizophrenie.pdf

[69] Becker T, Kilian R, Kösters M et al. Ethische Implikationen der psychiatrischen Versorgungsforschung. In Helmchen H , Hrsg. Ethik psychiatrischer Forschung. Berlin, Heidelberg: Springer; 2013: 103–114. doi:10.1007/978-3-642-35055-9_7

[70] Priebe S, Burns T, Craig TKJ. The future of academic psychiatry may be social. The British Journal of Psychiatry 2013; 202: 319–320. doi:10.1192/bjp.bp.112.116905

[71] Gruebner OA. Rapp M, Adli M et al. Cities and Mental Health. Dtsch Arztebl Int 2017; 114: 121–127. doi:10.3238/arztebl.2017.0121

[72] Glass RM. Psychiatric Megatrends and the Elderly. JAMA 1987; 257: 527–528. doi:10.1001/jama.1987.03390040143035

[73] VicHealth & CSIRO. Bright Futures: Megatrends impacting the mental wellbeing of young Victorians oder the coming 20 years. Victorian Health Foundation, Melbourne. 2015; Im Internet: https://www.vichealth.vic.gov.au/~/media/ResourceCentre/PublicationsandResources/Mental%20health/Youth%20Megatrends%20Report.pdf

[74] Burkhart S, Hanser F. Einfluss globaler Megatrends auf das digitale Betriebliche Gesundheitsmanagement. Digitales Betriebliches Gesundheitsmanagement 2018; 37–55. doi:10.1007/978-3-658-14550-7_2

[75] Frommer J. Psychische Störungen durch globale gesellschaftliche Veränderungen. Fortschr Neurol Psychiatr 2002; 70: 418–428. doi:10.1055/s-2002-33060

[76] Franz M, Kuns M, Schmitz N. Der Zusammenhang von sozialer Schicht und psychogener Erkrankung im Langzeitverlauf. Zeitschrift für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie 2000; 46: 140–165

[77] Schomerus G, Angermeyer MC. Stigma and its impact on help-seeking for mental disorders: what do we know? Epidemiology and Psychiatric Sciences 2008; 17: 31–37. doi:10.1017/S1121189X00002669

[78] Schomerus G. Steine auf dem Weg – Stigma und Hilfesuchverhalten. Psychiat Prax 2009; 36: 53–54. doi:10.1055/s-0028-1090202

[79] Rüsch N, Corrigan PW, Wassel A et al. Self-stigma, group identification, perceived legitimacy of discrimination and mental health service use. The British Journal of Psychiatry 2009; 195: 551–552. doi:10.1192/bjp.bp.109.067157

[80] Chandra A, Minkovitz CS. Stigma starts early: Gender differences in teen willingness to use mental health services. Journal of Adolescent Health 2006; 38: 754.e1–754.e8. doi:10.1016/j.jadohealth.2005.08.011

[81] Earnshaw VA, Rosenthal L, Carroll-Scott A et al. Everyday discrimination and physical health: Exploring mental health processes. J Health Psychol 2016; 21: 2218–2228. doi:10.1177/1359105315572456

Heruntergeladen von: Universität Potsdam. Urheberrechtlich geschützt.

[82] Davies SJC, Iwajomo T, de Oliveira C et al. The impact of psychiatric and medical comorbidity on the risk of mortality: a population-based analysis. Psychol Med 2019; 1–9. doi:10.1017/S003329171900326X

[83] DE Hert M, Correll CU, Bobes J et al. Physical illness in patients with severe mental disorders. I. Prevalence, impact of medications and disparities in health care. World Psychiatry 2011; 10: 52–77. doi:10.1002/j.2051-5545.2011.tb00014.x

[84] Schneider* F, Erhart* M, Hewer W et al. Mortality and Medical Comorbidity in the Severely Mentally Ill. Dtsch Arztebl Int 2019; 116: 405–411. doi:10.3238/arztebl.2019.0405

[85] Rosenbaum L. Closing the Mortality Gap — Mental Illness and Medical Care. New England Journal of Medicine 2016; 375: 1585–1589. doi:10.1056/NEJMms1610125

[86] Weinmann S. Die Vermessung der Psychiatrie: Täuschung und Selbsttäuschung eines Fachgebiets. 1. Edition. Köln: Psychiatrie Verlag; 2019

[87] Druss BG, von Esenwein SA, Compton MT et al. A randomized trial of medical care management for community mental health settings: the Primary Care Access, Referral, and Evaluation (PCARE) study. Am J Psychiatry 2010; 167: 151–159. doi:10.1176/appi.ajp.2009.09050691

[88] Sander LB, Paganini S, Terhorst Y et al. Effectiveness of a Guided Web-Based Self-help Intervention to Prevent Depression in Patients With Persistent Back Pain: The PROD-BP Randomized Clinical Trial. JAMA Psychiatry 2020; 77: 1001–1011. doi:10.1001/jamapsychiatry.2020.1021

[89] Jorzig A, Sarangi F. E-Health-Gesetz.In Jorzig A, Sarangi F , Hrsg. Digitalisierung im Gesundheitswesen: Ein kompakter Streifzug durch Recht, Technik und Ethik. Berlin, Heidelberg: Springer; 2020: 95–103. doi:10.1007/978-3-662-58306-7_9

[90] Geirhos A, Klein JP, Ebert DD et al. Onlinetherapie verringert bestehende Lücken in der Versorgung. InFo Neurologie 2019; 21: 36–45. doi:10.1007/s15005-019-0170-7

[91] Ebert DD, Cuijpers P, Muñoz RF et al. Prevention of Mental Health Disorders Using Internet- and Mobile-Based Interventions: A Narrative Review and Recommendations for Future Research. Front Psychiatry 2017; 8: 116. doi:10.3389/fpsyt.2017.00116

[92] Andersson G, Carlbring P, Cuijpers P. Internet interventions: Moving from efficacy to effectiveness. E-Journal of Applied Psychology 2009; 5: 18–24

[93] Etzelmueller A, Vis C, Karyotaki E et al. Effects of Internet-Based Cognitive Behavioral Therapy in Routine Care for Adults in Treatment for Depression and Anxiety: Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of Medical Internet Research 2020; 22: e18100. doi:10.2196/18100

[94] Domhardt M, Geßlein H, von Rezori RE et al. Internet- and mobile-based interventions for anxiety disorders: A meta-analytic review of intervention components. Depress Anxiety 2019; 36: 213–224. doi:10.1002/da.22860

[95] Domhardt M, Steubl L, Boettcher J et al. Mediators and mechanisms of change in internet- and mobile-based interventions for depression: A systematic review. Clinical Psychology Review 2020; 101953. doi:10.1016/j.cpr.2020.101953

[96] Baumeister H. Implementationsforschung in der Klinischen Psychologie, Rehabilitationspsychologie und Psychotherapie. Psychologische Rundschau 2014; 65: 150–158. doi:10.1026/0033-3042/a000217

[97] Baumeister H, Grässle C, Ebert DD et al. Blended Psychotherapy – verzahnte Psychotherapie: Das Beste aus zwei Welten? PiD - Psychotherapie im Dialog 2018; 19: 33–38. doi:10.1055/a-0592-0264

[98] Klein JP, Knaevelsrud C, Bohus M et al. Die Nadeln im Heuhaufen finden: Qualitätskriterien für den Einsatz von internetbasierten Selbstmanagement-Interventionen in Prävention und Behandlung psychischer Störungen. Fortschr Neurol Psychiatr 2019; 87: 187–191. doi:10.1055/a-0849-9902

[99] Bendig E, Erb B, Schulze-Thuesing L et al. The Next Generation: Chatbots in Clinical Psychology and Psychotherapy to Foster Mental Health – A Scoping Review. VER 2019; 1–13. doi:10.1159/000501812

[100] Nahum-Shani I, Smith SN, Spring BJ et al. Just-in-Time Adaptive Interventions (JITAIs) in Mobile Health: Key Components and Design Principles for Ongoing Health Behavior Support. Ann Behav Med 2018; 52: 446–462. doi:10.1007/s12160-016-9830-8

[101] Digital Phenotyping and Mobile Sensing: New Developments in Psychoinformatics. Springer International Publishing 2019, doi:10.1007/978-3-030-31620-4

[102] Goffman E. Asyle: Über die soziale Situation psychiatrischer Patienten und anderer Insassen. 1. Edition. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag; 1973

[103] Foucault M. Die Geburt der Klinik: Eine Archäologie des ärztlichen Blicks. 10. Edition. Frankfurt am Main: FISCHER Taschenbuch. 1988

[104] von Kardorff E. Zur Diskriminierung psychisch kranker Menschen.In Hormel U, Scherr A , Hrsg. Diskriminierung: Grundlagen und Forschungsergebnisse. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften; 2010: 279–305. doi:10.1007/978-3-531-92394-9_13

[105] von Peter S. Partizipative und kollaborative Forschungsansätze in der Psychiatrie. Psychiat Prax 2017; 44: 431–433. doi:10.1055/s-0043-120241

[106] Peter von S, Bär G, Behrisch B et al. Partizipative Gesundheitsforschung in Deutschland – quo vadis? Gesundheitswesen 2020; 82: 328–332. doi:10.1055/a-1076-8078

[107] Oades LG, Law J, Marshall SL. Development of a consumer constructed scale to evaluate mental health service provision. Journal of Evaluation in Clinical Practice 2011; 17: 1102–1107. doi:https://doi.org/10.1111/j.1365-2753.2010.01474.x

[108] Kösters M, Staudigl L, Picca A-C et al. Qualitätsindikatoren für die Behandlung von Menschen mit Schizophrenie – Ergebnisse einer Anwendungsstudie. Psychiatr Prax 2017; 44: 163–171. doi:10.1055/s-0042-112300

[109] Rose D. Service user/survivor-led research in mental health: epistemological possibilities. Disability & Society 2017; 32: 773–789. doi:10.1080/09687599.2017.1320270

[110] Sweeney A, Beresford P, Faulkner A et al. This is Survivor Research. New ed Edition. Ross-on-Wye: PCCS Books; 2009

[111] Baumann W, Pfaff H. Theorien in der Versorgungsforschung. Dtsch Med Wochenschr 2012; 137: A18. doi:10.1055/s-0032-1323181

[112] Deutsche Forschungsgemeinschaft. Versorgungsforschung in Deutschland: Stand – Perspektiven – Förderung 2010; Im Internet: https://www.dfg.de/download/pdf/dfg_im_profil/reden_stellungnahmen/2010/stellungnahme_versorgungsforschung.pdf

Heruntergeladen von: Universität Potsdam. Urheberrechtlich geschützt.

View publication stats

TOP 32 Verschiedenes